

Resolución TP3:

Ejercicio 1 - m

Calcular el limite doble para $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^x-1)(e^{2y}-1)}{xy}$ usando propiedades:

Para empezar:

- Al tratarse de una función de 2 variables $f(x, y)$ el limite existe si existen tanto por derecha, izquierda, y el resto de las infinitas direcciones y trayectorias.
- El postulado anterior se comprueba usando propiedades de limite sustentadas por la definicion de limite.
- El postulado anterior se refuta con solo encontrar un caso en que el limite de un valor distinto.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^x-1)(e^{2y}-1)}{xy}$$

Se resuelve con la Propiedad:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x) \cdot h(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \lim_{y \rightarrow y_0} h(y)$
2. L'Hopital (valido solo de a una variable y en $\frac{\rightarrow 0}{\rightarrow 0}$)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^x-1)(e^{2y}-1)}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)}{x} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(e^{2y}-1)}{y}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)}{x} \simeq \frac{\rightarrow 0}{\rightarrow 0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)}{x} \stackrel{L'}{\cong} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{(e^{2y}-1)}{y} \simeq \frac{\rightarrow 0}{\rightarrow 0} \rightarrow \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(e^{2y}-1)}{y} \stackrel{L'}{\cong} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2e^{2y}}{1} = 2$$

Finalmente:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^x-1)(e^{2y}-1)}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x-1)}{x} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(e^{2y}-1)}{y} = 1 \cdot 2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^x-1)(e^{2y}-1)}{xy} = 2$$