


TP 7, ejercicio 25 b

b) $\iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$



Utilizando coordenadas esféricas.

$$\begin{cases} x = \rho \cdot \cos(\theta) \cdot \text{sen}(\phi) \\ y = \rho \cdot \text{sen}(\theta) \cdot \text{sen}(\phi) \\ z = \rho \cdot \cos(\phi) \end{cases}$$

Siendo

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \rho^2 \cdot \text{sen}(\phi)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \rho$$

$$1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq \phi \leq \pi$$

$$1 \leq \rho \leq 2$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\phi \int_1^2 \frac{\rho^2 \sin(\phi)}{\rho} d\rho$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin(\phi) \, d\phi \left(\frac{\rho^2}{2} \Big|_1^2 \right)$$

$$I = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \, (-\cos(\phi)|_0^\pi)$$

$$I = 6\pi$$