

## Resolución TP10:

### Ejercicio 6 - a

Dado el campo vectorial  $F$  y la superficie  $S$ , calcular el flujo correspondiente con la normal que apunta hacia arriba.

$$F(x, y, z) = (x^2y, xz, y^2z)$$

$S$ : es el triángulo determinado por la intersección del plano de ecuación  $x + y + z = 1$  y los planos coordenados.

Resolviendo:


$$I = \iint_S F \cdot dS = \iint_{R_\Phi} F(\Phi) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v) du dv$$


Considerando que se trata solo del triángulo podemos nombrar a la superficie con la siguiente descripción:

$$S: \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases}$$

Dibujamos calculando las trazas y los vertices:

$$\begin{aligned} S \xrightarrow{x=0} \begin{cases} y + z = 1 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases} & \xrightarrow{y=0} \begin{cases} z = 1 \\ A = (0,0,1) \end{cases} \\ S \xrightarrow{y=0} \begin{cases} x + z = 1 \\ x \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases} & \xrightarrow{z=0} \begin{cases} x = 1 \\ B = (1,0,0) \end{cases} \\ S \xrightarrow{z=0} \begin{cases} x + y = 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} & \xrightarrow{x=0} \begin{cases} y = 1 \\ C = (0,1,0) \end{cases} \end{aligned}$$





$$\Phi_x = (1, 0, -1)$$


$$\Phi_y = (0, 1, -1)$$

$$\Phi_x X \Phi_y = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \left( \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$\Phi_x X \Phi_y = ((0 - (-1)), -(-1 - 0), (1 - 0))$$

$$\Phi_x X \Phi_y = (1, 1, 1)$$

" calcular el flujo correspondiente con la normal que apunta hacia arriba "



$$\begin{cases} \Phi(x, y) = (x, y, 1 - x - y) \\ F(x, y, z) = (x^2y, xz, y^2z) \end{cases} \rightarrow F(\Phi)$$

$$F(\Phi) = (x^2y, x(1 - x - y), y^2(1 - x - y))$$

$$F(\Phi) = (x^2y, x - x^2 - xy, y^2 - xy^2 - y^3)$$

$$F(\Phi) \cdot (\Phi_x \times \Phi_y) = (x^2y, x - x^2 - xy, y^2 - xy^2 - y^3)(1, 1, 1)$$

$$F(\Phi) \cdot (\Phi_x \times \Phi_y) = x^2y + x - x^2 - xy + y^2 - xy^2 - y^3$$

$$I = \iint_S F \cdot dS = \iint_{R_\Phi} F(\Phi) \cdot (\Phi_x \times \Phi_y) du dv$$

$$I = \iint_{R_\Phi} (x^2y + x - x^2 - xy + y^2 - xy^2 - y^3) dR = \frac{3}{40}$$

*recomendado verificar por Tipo I y Tipo II, ver C/A*

### Resolución Tipo I

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2y + x - x^2 - xy + y^2 - xy^2 - y^3) dy dx$$

$$I = \int_0^1 \left[ \frac{x^2y^2}{2} + xy - x^2y - \frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{xy^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^{1-x} dx$$

$$I = \int_0^1 \frac{x^2(1-x)^2}{2} + x(1-x) - x^2(1-x) - \frac{x(1-x)^2}{2} + \frac{(1-x)^3}{3} - \frac{x(1-x)^3}{3} - \frac{(1-x)^4}{4} dx$$

$$I = \int_0^1 \frac{7}{12}x^4 - \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{12} dx$$

$$I = \left[ \frac{7}{12} \left( \frac{1}{5} x^5 \right) - \frac{5}{6} \left( \frac{1}{4} x^4 \right) + \frac{1}{6} \left( \frac{1}{2} x^2 \right) + \frac{x}{12} \right]_0^1$$

$$I = \left[ \frac{7}{60} x^5 - \frac{5}{24} x^4 + \frac{1}{12} x^2 + \frac{x}{12} \right]_0^1$$

$$I = \left( \frac{7}{60} - \frac{5}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right) = \frac{3}{40}$$

### Resolución Tipo II

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-y} (x^2y + x - x^2 - xy + y^2 - xy^2 - y^3) dx dy$$

$$I = \int_0^1 \left[ \frac{x^3y}{3} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2y}{2} + xy^2 - \frac{x^2y^2}{2} - xy^3 \right]_0^{1-y} dy$$

$$I = \int_0^1 \left( \frac{(1-y)^3y}{3} + \frac{(1-y)^2}{2} - \frac{(1-y)^3}{3} - \frac{(1-y)^2y}{2} + (1-y)y^2 - \frac{(1-y)^2y^2}{2} - (1-y)y^3 \right) dy$$

$$I = \int_0^1 \frac{y^4}{6} - \frac{y^3}{6} - \frac{y}{6} + \frac{1}{6} dy$$

$$I = \left[ \frac{y^5}{30} - \frac{y^4}{24} - \frac{y^2}{12} + \frac{y}{6} \right]_0^1$$

$$I = \frac{1}{30} - \frac{1}{24} - \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{3}{40}$$