

T P 04 Ej. 2-d

Utilizando la definición, calcular (si existen) las derivadas parciales de la siguiente función en el punto indicado:

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \cdot \sin\left(\frac{y}{x}\right) & \text{sí } x \neq 0 \\ 0 & \text{sí } x = 0 \end{cases} \quad \text{en } (0, 0)$$

Para una introducción a la manera en que se resuelve este tipo de ejercicios, referirse al ejercicio 2-a

$$\dot{f}_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

$$\dot{f}_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

$$\dot{f}_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0^2 \cdot \sin\left(\frac{0}{h}\right) - 0}{h}$$

$$\dot{f}_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h}$$

$$\dot{f}_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$$

$$\dot{f}_y(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h}$$

$$\dot{f}_y(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h}$$

$$\dot{f}_y(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h}$$

$$\dot{f}_y(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Las derivadas parciales en (0,0) existen y valen cero.