

T P 04 Ej. 5-b

Calcular la derivada direccional de la siguiente función en el punto p y la dirección  $\vec{v}$  especificados.

$$f(x, y) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad P = (1, 0) \quad \vec{v} = \left( \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

*Para una explicación del procedimiento que se va a aplicar a continuación, referirse al ejercicio 5-a donde está explicado en detalle.*

1. Definir la función  $g(t) = f(P + t\vec{v})$ :

$$g(t) = f\left((1, 0) + t\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right)$$

$$g(t) = f\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}t, 0 + \frac{1}{\sqrt{5}}t\right)$$

$$g(t) = \ln\left(\sqrt{\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}t\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}t\right)^2}\right)$$

Dejamos esta expresión tal como está porque es sencilla de derivar

2. Derivar la función respecto de su variable:  $g'(t)$ .

$$g'(t) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}t\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}t\right)^2}} * \frac{1}{2\sqrt{\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}t\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}t\right)^2}} * \left[2\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}t\right)\frac{2}{\sqrt{5}} + 2\left(\frac{1}{\sqrt{5}}t\right)\frac{1}{\sqrt{5}}\right]$$

Dejamos esta expresión tal y como está porque al evaluarla en 0, la mayor parte de los términos se van a anular.

3. Evaluar la función derivada en 0:  $g'(0)$ .

$$g'(0) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}0\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}0\right)^2}} * \frac{1}{2\sqrt{\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}0\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}0\right)^2}} \\ * \left[ 2\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}0\right)\frac{2}{\sqrt{5}} + 2\left(\frac{1}{\sqrt{5}}0\right)\frac{1}{\sqrt{5}} \right]$$

$$g'(0) = \frac{1}{\sqrt{(1+0)^2 + 0}} * \frac{1}{2\sqrt{(1+0)^2 + (0)^2}} * \left[ 2(1+0)\frac{2}{\sqrt{5}} + 0 \right]$$

$$g'(0) = 1 * \frac{1}{2} * \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Por lo tanto, la derivada direccional de la función  $f$  en el punto  $P$  en el sentido del vector  $\vec{v}$  es

$$f_{\vec{v}}(P) = \frac{2}{\sqrt{5}}$$