

# Solution exercice récapitulatif - Q1

$E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^3$ , donc un espace vectoriel contenant  $E_1$  et  $E_2$  est  $\mathbb{R}^3$ .

# Solution exercice récapitulatif - Q2 (Méthode 1)

Il y a deux méthodes, voici la première (la méthode astucieuse) :

$$\begin{aligned} E_1 &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax = Bx\} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax - Bx = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (A - B)x = 0\} = \ker(A - B) \end{aligned}$$

donc  $E_1$  est un EV inclus dans  $\mathbb{R}^3$ , c'est donc un SEV de  $\mathbb{R}^3$ .

## Solution exercice récapitulatif - Q2 (Méthode 2)

La méthode 2 est plus conventionnelle, pour prouver que  $E_1 \subseteq \mathbb{R}^3$  est un SEV, montrons les 3 propriétés :

- $0 \in E_1 : A0 = B0 \implies 0 \in E_1.$
- $x, y \in E_1 \implies x + y \in E_1 :$

Soit  $x, y \in E_1$ , alors  $A(x + y) = Ax + Ay = Bx + By = B(x + y)$  donc  $x + y \in E_1$ .

- $\lambda \in \mathbb{R}, x \in E_1 \implies \lambda x \in E_1 :$

Soit  $x \in E_1, \lambda \in \mathbb{R}$ , alors  $A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda(Bx) = B(\lambda x)$ . donc  $\lambda x \in E_1$

$E_1$  est donc un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

# Solution exercice récapitulatif - Q3

Pour prouver que  $E_2$  n'est pas un SEV :

- Prenons  $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in E_2$  car  $1^2 = 1$ .

- Considérons  $2x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$  :

$$(2)^2 = 4 \neq 2 \implies 2x \notin E_2.$$

Donc  $E_2$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ .

## Solution exercice récapitulatif - Q4

$$\begin{aligned} A - B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & -4 & -8 \end{bmatrix} &\xrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2]{\sim} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow -L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & -8 \end{bmatrix} . \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -10 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + 5L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} . \end{aligned}$$

Colonnes pivots : 1ère, 2ème, et 3ème colonnes Attention à bien prendre les colonnes de la matrices initiale.

$$\text{Im}(A - B) = \text{Vect} \left( \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix} \right) = \mathbb{R}^3.$$

# Solution exercice récapitulatif - Q5

Reprenons le pivot de Gauss de la matrice  $A - B$  :

$$A - B \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_2 \leftarrow \frac{L_2}{2}]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} .$$
$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow \frac{L_3}{-3}]{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} .$$

$$\text{Ainsi } x \in \ker(A - B) \Leftrightarrow (A - B)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

$$\ker(A - B) = \{0\} \quad (\text{Singleton nul}).$$

## Solution exercice récapitulatif - Q6

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$Bx = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = x_3. \end{cases} \Leftrightarrow x = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Donc une base de  $\ker(B) = Vect \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$  et une base est  $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

## Solution exercice récapitulatif - Q7

On remarque que :

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ainsi,  $v_1 = v_2$ , donc la famille n'est pas libre.

Conclusion : La famille ne forme pas une base de  $\mathbb{R}^3$ .



# Solution exercice récapitulatif - Q8

Nous vous proposons deux méthodes, voici la première (la plus astucieuse) :

$$\det(C) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 7 \end{vmatrix}.$$

Développement selon la 3ème colonne :

$$\det(C) = 0 \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 7 \cdot \det \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\det(C) = 0 - 2 \cdot (3 - 0) + 7 \cdot (0 + 1) = -6 + 7 = 1.$$

$\det(C) \neq 0 \implies$  les colonnes de  $C$  forment une base de  $\mathbb{R}^3$  car  $C$  est inversible.

## Solution exercice récapitulatif - Q8

Nous vous proposons une deuxième méthode, basée sur le pivot de Gauss :

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{3}L_1} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Les pivots sont présents dans chaque ligne, et il y a 3 pivots. Ainsi, les colonnes de  $C$  sont linéairement indépendantes.

Dans  $\mathbb{R}^3$ , une famille de 3 vecteurs linéairement indépendants forme une base.

Conclusion : Les colonnes de  $C$  forment une base de  $\mathbb{R}^3$ .

## Solution exercice récapitulatif - Bonus

$$\ker(\mathbf{0}) = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \{x \in \mathbb{R}^3\} = \mathbb{R}^3.$$