

手作りエンタングル

2025 年 3 月 5 日 (2025 年 3 月 4 日更新)

目次

なぜ線形代数？

ヒルベルト空間って？

ベクトル

内積

完備性

ヒルベルト空間

ヒルベルト空間から \mathbb{C}^N へ

同型

表現行列

量子力学の公理

量子系の状態

目次 (つづき)

測定とは？

基底測定

状態の時間発展

波束の収縮

多体系の量子力学

スピン系

テンソル積

量子テレポーテーション

なぜ線形代数？

量子力学の基本方程式といえば？

量子力学の基本方程式

量子力学の基本方程式といえば？

(時間に依存しない) シュレーディンガー方程式

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (*1)$$

量子力学の基本方程式

量子力学の基本方程式といえば？

(時間に依存しない) シュレーディンガー方程式

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (*1)$$

(*1) の解を $\psi(\mathbf{r}), \xi(\mathbf{r})$ とすると、任意の複素数 a, b に対して、

$$\eta(\mathbf{r}) := a\psi(\mathbf{r}) + b\xi(\mathbf{r}) \quad (a, b \text{ は複素数})$$

は (*1) の解になっている。

量子力学の基本方程式

量子力学の基本方程式といえば？

(時間に依存しない) シュレーディンガー方程式

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (*1)$$

(*1) の解を $\psi(\mathbf{r}), \xi(\mathbf{r})$ とすると、任意の複素数 a, b に対して、

$$\eta(\mathbf{r}) := a\psi(\mathbf{r}) + b\xi(\mathbf{r}) \quad (a, b \text{ は複素数})$$

は (*1) の解になっている。

⇒ (*1) は線型方程式。

方程式 (*1) の解 $\psi(\mathbf{r})$ 全体は、ベクトル空間をなす.

ヒルベルト空間って？

状態はヒルベルト空間のベクトルとしてあらわされる．

ではヒルベルト空間とは何か？

状態はヒルベルト空間のベクトルとしてあらわされる．

ではヒルベルト空間とは何か？

ヒルベルト空間の定義

内積をもつベクトル空間であって，内積から導かれるノルムに関して完備なものをヒルベルト空間という．

ヒルベルト空間って？

ベクトル

ベクトルの性質

そもそもベクトルとは？

ベクトルの性質として

- ベクトル同士の和 $x + y$
- ベクトルの複素数倍（スカラー倍） cx

の2つ（線形演算）が定義できる．

→ 2つの計算を合わせた線形結合 $ax + by$ が基本．

ユークリッド空間の例

3次元ユークリッド空間 \mathbb{R}^3 の縦ベクトル

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (x_1, x_2, x_3 \text{ は複素数})$$

とする.

このとき,

$$a\boldsymbol{x} + b\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 \\ ax_2 + by_2 \\ ax_3 + by_3 \end{pmatrix}$$

もベクトル.

ユークリッド空間の例

3次元ユークリッド空間 \mathbb{R}^3 の縦ベクトル

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (x_1, x_2, x_3 \text{ は複素数})$$

とする.

このとき,

$$a\mathbf{x} + b\mathbf{y} = \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 \\ ax_2 + by_2 \\ ax_3 + by_3 \end{pmatrix}$$

もベクトル.

\mathbf{x} はある意味シュレーディンガー方程式の解 ψ に似ている.

ベクトル空間の定義

ふつうの縦ベクトルについて考えれば当たり前のこと：

ベクトル空間の公理

集合 V の元 ψ, φ, ξ を **ベクトル**， a, b, c を **スカラー**（複素数）とする．

$$1. (\psi + \varphi) + \xi = \psi + (\varphi + \xi)$$

$$2. \psi + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \psi = \psi$$

$$3. \psi + (-\psi) = \mathbf{0}$$

$$4. \psi + \varphi = \varphi + \psi$$

$$5. c(\psi + \varphi) = c\psi + c\varphi$$

$$6. (a + b)\psi = a\psi + b\psi$$

$$7. (ab)\psi = a(b\psi)$$

$$8. 1\psi = \psi$$

ベクトル空間の定義

ふつうの縦ベクトルについて考えれば当たり前のこと：

ベクトル空間の公理

集合 V の元 ψ, φ, ξ を**ベクトル**， a, b, c を**スカラー**（複素数）とする．

$$1. (\psi + \varphi) + \xi = \psi + (\varphi + \xi)$$

$$2. \psi + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \psi = \psi$$

$$3. \psi + (-\psi) = \mathbf{0}$$

$$4. \psi + \varphi = \varphi + \psi$$

$$5. c(\psi + \varphi) = c\psi + c\varphi$$

$$6. (a + b)\psi = a\psi + b\psi$$

$$7. (ab)\psi = a(b\psi)$$

$$8. 1\psi = \psi$$

逆に，1-8 を満たすすものは，ぜんぶ「**ベクトル**」ということにする．

このとき，集合 V を**ベクトル空間**という．

⇒ 5 ページで考えた ψ もベクトル．

- N 次の縦ベクトル ${}^t(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_N)$
- N 次多項式 $p(x) = a_N x^N + a_{N-1} x^{N-1} + \cdots + a_1 x + a_0$
- 線形方程式の解 $\varphi(x_1, \dots, x_N) \leftarrow$ **シュレーディンガー方程式の解！**

これらはすべてベクトル空間の公理を満たすベクトル.

ベクトル空間の基底と次元

このように定義されたベクトル空間には必ず**基底**と呼ばれるベクトルの組が存在する.

ベクトル空間 V の基底を構成するベクトルの数を**次元**という.

ヒルベルト空間って？

内積

なぜ内積が必要か？

ベクトル空間の定義（9 ページ）だけでは，

- ベクトル ψ の長さ
- ベクトル ψ と ξ が直交すること

（幾何的な性質）を定義できない．

なぜ内積が必要か？

ベクトル空間の定義（9 ページ）だけでは，

- ベクトル ψ の長さ
- ベクトル ψ と ξ が直交すること

（幾何的な性質）を定義できない．

つまり，正規直交基底（完全正規直交系）が定義できない！

→ベクトル空間に幾何的な性質を導入しよう．

ユークリッド内積

縦ベクトルがもっている重要な性質：**内積**の復習.

ユークリッド内積

縦ベクトルがもっている重要な性質：**内積**の復習.

縦ベクトルの内積

$\mathbf{x}, \mathbf{y} : N$ 次元ベクトル

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \sum_{i=1}^N x_i^* y_i \quad (*2)$$

を**内積**という.

ベクトルの長さ (**ノルム**) は,

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sum_{i=1}^N |x_i|^2 \quad (*3)$$

注意

(*3) の右辺の $\sqrt{\quad}$ の中身 ≥ 0 になるように, (*2) の x_i を複素共役にしてある.

内積の定義

(*2) は次の性質を満たす.

内積の公理

ベクトル ψ, φ, ξ とスカラー (複素数) a, b について

1. $\langle \psi, a\varphi + b\xi \rangle = a\langle \psi, \varphi \rangle + b\langle \psi, \xi \rangle$ (線形性)
2. $\langle \psi, \varphi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle^*$
3. $\langle \psi, \psi \rangle \geq 0$ であり, $\langle \psi, \psi \rangle = 0 \iff \psi = \mathbf{0}$ (正定値性)

内積の公理

ベクトル ψ, φ, ξ とスカラー（複素数） a, b について

1. $\langle \psi, a\varphi + b\xi \rangle = a\langle \psi, \xi \rangle + b\langle \psi, \varphi \rangle$ （線形性）
2. $\langle \psi, \varphi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle^*$
3. $\langle \psi, \psi \rangle \geq 0$ であり, $\langle \psi, \psi \rangle = 0 \iff \psi = \mathbf{0}$ （正定値性）

上の条件を満たす計算 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ を改めて「**内積**」と呼ぶことにする。

内積をもつベクトル空間を、**内積空間**と呼ぶ。

内積の定義

内積の公理

ベクトル ψ, φ, ξ とスカラー（複素数） a, b について

1. $\langle \psi, a\varphi + b\xi \rangle = a\langle \psi, \xi \rangle + b\langle \psi, \varphi \rangle$ （線形性）
2. $\langle \psi, \varphi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle^*$
3. $\langle \psi, \psi \rangle \geq 0$ であり, $\langle \psi, \psi \rangle = 0 \iff \psi = \mathbf{0}$ （正定値性）

上の条件を満たす計算 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ を改めて「**内積**」と呼ぶことにする。

内積をもつベクトル空間を, **内積空間**と呼ぶ。

注意

1と2をあわせると, $\langle a\psi + b\varphi, \xi \rangle = a^*\langle \psi, \xi \rangle + b^*\langle \varphi, \xi \rangle$ （**反線形性**）である。

内積空間はベクトル空間なので、基底をもつ.

特に、内積空間では**正規直交基底**という良い基底をとれる（ことがある）：

基底 (φ_i) が正規直交基底である条件：

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

シュレーディンガー方程式の解はベクトル $\psi(\mathbf{r})$ (関数)。

では、関数 $\psi(\mathbf{r})$ と $\xi(\mathbf{r})$ の内積は？

シュレーディンガー方程式の解はベクトル $\psi(\mathbf{r})$ (関数)。

では，関数 $\psi(\mathbf{r})$ と $\xi(\mathbf{r})$ の内積は？

$$\langle \psi, \xi \rangle := \iiint \psi^*(\mathbf{r}) \xi(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \quad (*4)$$

とすれば，前のページの性質を満たす．

ヒルベルト空間って？

完備性

「収束しそうなベクトルの列」の極限が存在する内積空間を、**完備**であるという。

有限次元の内積空間はすべて完備であるから、あまり気にしなくてよい。

参考までに、ベクトルの列が収束することの定義は以下のとおり。

(参考) ベクトルの列の収束

ベクトルの列 ψ_1, ψ_2, \dots が ψ_* に収束するとは、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_* - \psi_n\| = 0$$

となることをいう。

(参考) 完備性の定義

内積空間 V に属するベクトルの列 ψ_1, ψ_2, \dots が**コーシー列**であるとは,

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} \|\psi_m - \psi_n\| = 0$$

コーシー列は, 番号が大きくなるにつれて 1 点に収束するように見える. その 1 点が V に含まれているかが問題である.

V のすべてのコーシー列が収束する, つまり

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\psi_* - \psi_n\| = 0$$

となる V のベクトル ψ_* が存在するとき, V は**完備**であるという.

ヒルベルト空間って？

ヒルベルト空間

ヒルベルト空間の定義

内積をもつベクトル空間であって，内積から導かれるノルムに関して完備なものをヒルベルト空間という．

ヒルベルト空間から \mathbb{C}^N へ

ヒルベルト空間から \mathbb{C}^N へ

同型

同型（どうけい）とは：ベクトル空間の同型

9 ページのベクトル空間の定義に出てくるのは3つだけ：

- ベクトル (ψ, ξ, \dots)
- ベクトルの和 (+)
- スカラー倍 (\cdot)

同型（どうけい）とは：ベクトル空間の同型

9 ページのベクトル空間の定義に出てくるのは3つだけ：

- ベクトル (ψ, ξ, \dots)
- ベクトルの和 (+)
- スカラー倍 (\cdot)

よって、2つのベクトル空間の

- それぞれのベクトルが **1対1に対応**
- **線形構造**（和とスカラー倍）が同じ

なら、2つは（ある意味）同じ空間と見なせる。

このとき、2つは（ベクトル空間として）**同型**（どうけい）であるという。

(参考) 線形構造が同じ？

ベクトル空間 V (上) と W (下) の 1 対 1 対応について,

$$\begin{array}{ccc} \psi & + & \xi = \eta, \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ x & + & y = z \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} c \psi & = & \psi' \\ \parallel \updownarrow & & \updownarrow \\ c x & = & x' \end{array}$$

対応 \leftrightarrow が成立すれば, 対応 \Leftrightarrow が必ず成立する.

同型とは：内積空間の同型

2つの内積空間が，ベクトル空間として同型であり，さらに

- **内積構造**が同じ

なら，内積空間として同型であるといえる．

N 次元ベクトル空間どうしは同型

定理

2つの N 次元内積空間 (or ベクトル空間) は同型である.

空間 V の (正規直交) 基底 $\{\varphi_i\}$, W の (正規直交) 基底 $\{\varphi'_i\}$ をそれぞれ

$$\varphi_1 \leftrightarrow \varphi'_1, \quad \dots, \quad \varphi_N \leftrightarrow \varphi'_N$$

のように対応させれば簡単に証明できる.

N 次元ベクトル空間どうしは同型

定理

2つの N 次元内積空間（or ベクトル空間）は同型である．

空間 V の（正規直交）基底 $\{\varphi_i\}$ ， W の（正規直交）基底 $\{\varphi'_i\}$ をそれぞれ

$$\varphi_1 \leftrightarrow \varphi'_1, \quad \dots, \quad \varphi_N \leftrightarrow \varphi'_N$$

のように対応させれば簡単に証明できる．

同型の意味

結局， N 次元ヒルベルト空間は実質1つだけ！

⇒ 一番簡単な \mathbb{C}^N を考えればよい．

ヒルベルト空間から \mathbb{C}^N へ

表現行列

多項式関数 $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ を微分する線形演算子 $\hat{D} := \frac{d}{dx}$.

もちろん,

$$(\hat{D}f)(x) = \frac{df}{dx} = 2a_2x + a_1$$

表現行列の導入

多項式関数 $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ を微分する線形演算子 $\hat{D} := \frac{d}{dx}$.

もちろん,

$$(\hat{D}f)(x) = \frac{df}{dx} = 2a_2x + a_1$$

ところで, 対応 $f \leftrightarrow (a_2 \ a_1 \ a_0)$ を考えると, これは次のように書ける

$$(\hat{D}f) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 2a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\hat{D}} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

表現行列の導入

多項式関数 $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ を微分する線形演算子 $\hat{D} := \frac{d}{dx}$.

もちろん,

$$(\hat{D}f)(x) = \frac{df}{dx} = 2a_2x + a_1$$

ところで, 対応 $f \leftrightarrow (a_2 \ a_1 \ a_0)$ を考えると, これは次のように書ける

$$(\hat{D}f) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 2a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_D \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$$

D を**表現行列**という.

表現行列の形式的な定義

形式的には次のとおり.

N 次元ベクトル空間 V から V 自身への線形写像 (線形演算子) f について,

1. ベクトル空間 V は, \mathbb{C}^N と同型.
2. V の基底 φ_i は, \mathbb{C}^N の基底 $\mathbf{e}_i = {}^t(0 \ \cdots \ 1 \ \cdots \ 0)$ と対応.
3. V 上の線形写像 f は, \mathbb{C}^N 上の線形写像 A に対応.
4. \mathbb{C}^N 上の線形写像 A は, 行列 A に対応.

A を f の表現行列という.

表現行列の形式的な定義

形式的には次のとおり.

N 次元ベクトル空間 V から V 自身への線形写像 (線形演算子) f について,

1. ベクトル空間 V は, \mathbb{C}^N と同型.
2. V の基底 φ_i は, \mathbb{C}^N の基底 $\mathbf{e}_i = {}^t(0 \ \cdots \ 1 \ \cdots \ 0)$ と対応.
3. V 上の線形写像 f は, \mathbb{C}^N 上の線形写像 A に対応.
4. \mathbb{C}^N 上の線形写像 A は, 行列 A に対応.

A を f の**表現行列**という.

表現行列の力

線形写像 f を考える代わりに, 行列 A を考えればよい!

量子力学の公理

ここでは量子系の**有限次元である状態**について扱う。

有限次元 (N 次元) ヒルベルト空間 \mathcal{H} は \mathbb{C}^N と同型だった (23 ページ)。

よって, $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ 上のベクトルと線形写像を使って議論すればよい。

つまり, **数ベクトルと行列**を使って議論すればよい。

量子力学の公理

量子系の状態

量子系の状態とは？

量子力学的な系の状態は，次のような公理によって定義される．

公理：量子系の状態

量子系の状態は，系に対応するヒルベルト空間 \mathcal{H} のベクトル $|\psi\rangle$ であらわされる．ただし $|\psi\rangle$ は単位ベクトル：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

である．また，位相のみが異なる 2 つのベクトル

$$|\psi'\rangle, e^{i\theta}|\psi\rangle \quad (\theta \text{ は実数})$$

は同じ状態とみなす．

量子力学の公理

測定とは？

オブザーバブルとエルミート行列

観測可能な物理量のことを**オブザーバブル**という。

公理：オブザーバブルとエルミート行列

オブザーバブルには，対応する \mathcal{H} 上の自己共役演算子（**エルミート行列**） A が存在する．

A の固有ベクトル $|\varphi_i\rangle$ は \mathcal{H} の正規直交基底になっている（ \because エルミート行列の性質）．

よって， \mathcal{H} のすべての状態 $|\psi\rangle$ は，

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\varphi_i\rangle \quad (*5)$$

と展開できる．

オブザーバブルの測定

以下、**A の固有ベクトルに縮退がない場合**を考える。

公理：オブザーバブルの測定

状態 $|\psi\rangle$ にある系に対してオブザーバブル A を観測すると、行列 A の固有値のいずれか 1 つが得られる。

固有値 a が得られる確率は

$$\langle\psi|\hat{P}_a\psi\rangle \quad (*6)$$

である。ただし \hat{P}_a は**射影演算子**であり、縮退がない場合は

$$\hat{P}_a := |\varphi_a\rangle\langle\varphi_a|$$

(ただし $|\varphi_a\rangle$ は A の固有値 a に属する固有ベクトル)。

固有値 a が得られる確率 (*6) に, (*5) を代入すれば,

$$\langle \psi | \hat{P}_a \psi \rangle = |c_a|^2$$

という, なじみ深い式が得られる.

量子力学の公理

基底測定

オブザーバブルとエルミート行列の関係

オブザーバブル A の固有状態系 $|\varphi_i\rangle$ は，ヒルベルト空間 \mathcal{H} の正規直交基底をなす．

オブザーバブル $A \implies$ エルミート行列 $A \implies$ 正規直交基底 $|\varphi_i\rangle$

オブザーバブルとエルミート行列の関係

オブザーバブル A の固有状態系 $|\varphi_i\rangle$ は、ヒルベルト空間 \mathcal{H} の正規直交基底をなす。

オブザーバブル $A \implies$ エルミート行列 $A \implies$ 正規直交基底 $|\varphi_i\rangle$

逆に、 \mathcal{H} の正規直交基底 $|\varphi_i\rangle$ に対して、それらを固有状態系にもつオブザーバブル A は存在するか？

つまり、**任意のエルミート行列 A に、対応するオブザーバブル A が存在するか？**

量子力学の公理では、任意のエルミート行列 A に対して、オブザーバブル A が存在するとは限らない。

しかし、ここでは次のように仮定する。

公理ではない仮定：基底測定

\mathcal{H} の任意の正規直交基底 $|\varphi_i\rangle$ を固有状態系にもつオブザーバブル A が存在する。

\mathcal{H} の正規直交基底 $|\varphi_i\rangle$ に対応するオブザーバブル A の測定を、（その基底に対する）**基底測定**ということにする。

量子力学の公理

状態の時間発展

公理：状態の時間発展

量子系の状態の時間発展は，ユニタリ行列 U で表される：

$$|\psi\rangle \rightarrow U|\psi\rangle$$

時間発展には，実験者による操作も含まれる．

つまり，実験者が行える操作は（測定を除き）すべてユニタリ的である．

公理：状態の時間発展

量子系の状態の時間発展は、ユニタリ行列 U で表される：

$$|\psi\rangle \rightarrow U|\psi\rangle$$

時間発展には、実験者による操作も含まれる。

つまり、実験者が行える操作は（測定を除き）すべてユニタリ的である。

ここでは逆に、すべてのユニタリ的な操作が可能であると**仮定**する。

公理ではない仮定：ユニタリ操作

実験者は量子系に対して、任意のユニタリ行列 U で表される操作を行うことができる。

量子力学の公理

波束の収縮

状態 $|\psi\rangle$ にある量子系のオブザーバブル A を測定しよう．

A の固有ベクトル系を $|\varphi_i\rangle$ とする．

公理：波束の収縮

オブザーバブル A の測定により，固有状態 $|\varphi_a\rangle$ に対応する値を得たとする．

この測定によって，系の状態は

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\varphi_i\rangle \longrightarrow |\varphi_a\rangle$$

と変化する．（固有ベクトルに縮退はないとした）

多体系の量子力学

多体系の量子力学

スピン系

スピン

スピン 1/2 をもつ粒子のスピン状態：

$|\uparrow\rangle$ ：アップスピン
 $|\downarrow\rangle$ ：ダウンスピン

} ヒルベルト空間 \mathcal{H} の正規直交基底

スピン

スピン $1/2$ をもつ粒子のスピン状態：

$$\left. \begin{array}{l} |\uparrow\rangle : \text{アップスピン} \\ |\downarrow\rangle : \text{ダウンスピン} \end{array} \right\} \text{ヒルベルト空間 } \mathcal{H} \text{ の正規直交基底}$$

\mathcal{H} は 2 次元ヒルベルト空間なので、

$$|\uparrow\rangle \leftrightarrow {}^t(1 \ 0), \quad |\downarrow\rangle \leftrightarrow {}^t(0 \ 1)$$

という対応によって、 \mathbb{C}^2 と同型である (23 ページ) .

スピン

スピン 1/2 をもつ粒子のスピン状態：

$$\left. \begin{array}{l} |\uparrow\rangle : \text{アップスピン} \\ |\downarrow\rangle : \text{ダウンスピン} \end{array} \right\} \text{ヒルベルト空間 } \mathcal{H} \text{ の正規直交基底}$$

\mathcal{H} は 2 次元ヒルベルト空間なので、

$$|\uparrow\rangle \leftrightarrow {}^t(1 \ 0), \quad |\downarrow\rangle \leftrightarrow {}^t(0 \ 1)$$

という対応によって、 \mathbb{C}^2 と同型である (23 ページ)。

スピンの重ね合わせ：

$$a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

と簡潔に表現できる。

多体系の量子力学

テンソル積

多粒子系の扱い方：テンソル積

スピン 1/2 を持つ 2 粒子の状態 $|\psi\rangle = {}^t(a \ b)$, $|\xi\rangle = {}^t(c \ d)$ とする.

2 状態をあわせた $|\psi\rangle|\xi\rangle$ はどう表現する？

多粒子系の扱い方：テンソル積

スピン 1/2 を持つ 2 粒子の状態 $|\psi\rangle = {}^t(a \ b)$, $|\xi\rangle = {}^t(c \ d)$ とする.

2 状態をあわせた $|\psi\rangle|\xi\rangle$ はどう表現する？

答え：テンソル積

$$|\psi\rangle \otimes |\xi\rangle := \begin{pmatrix} a|\xi\rangle \\ b|\xi\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix} \quad (*7)$$

多粒子系の扱い方：テンソル積

スピン 1/2 を持つ 2 粒子の状態 $|\psi\rangle = {}^t(a \ b)$, $|\xi\rangle = {}^t(c \ d)$ とする.

2 状態をあわせた $|\psi\rangle|\xi\rangle$ はどう表現する？

答え：テンソル積

$$|\psi\rangle \otimes |\xi\rangle := \begin{pmatrix} a|\xi\rangle \\ b|\xi\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix} \quad (*7)$$

3 つ以上のテンソル積も, $|\psi\rangle \otimes (|\xi\rangle \otimes |\xi\rangle)$ のようにして定義できる.

テンソル積空間 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ の基底は、たとえば

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (*8)$$

の4つ。あるいは、これらを計算して、

$${}^t(1 \ 0 \ 0 \ 0), \quad {}^t(0 \ 1 \ 0 \ 0), \quad {}^t(0 \ 0 \ 1 \ 0), \quad {}^t(0 \ 0 \ 0 \ 1)$$

つまり、

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$$

行列のテンソル積

行列のテンソル積も，

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \otimes \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}}_B = \begin{pmatrix} aB & bB \\ cB & dB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha & a\beta & b\alpha & b\beta \\ a\gamma & a\delta & b\gamma & b\delta \\ c\alpha & c\beta & d\alpha & d\beta \\ c\gamma & c\delta & d\gamma & d\delta \end{pmatrix}$$

さらに，2 スピン系 $|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle$ に作用する演算子は，それぞれのスピンの作用する演算子（行列） \hat{O}_1, \hat{O}_2 を使うと

演算子のテンソル積の作用

$$(\hat{O}_1 \otimes \hat{O}_2)(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle) = \hat{O}_1|\psi\rangle \otimes \hat{O}_2|\varphi\rangle$$

テンソル積で表せないテンソル積

$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$ のベクトル

$${}^t(0 \ 1 \ 1 \ 0) = \{ {}^t(1 \ 0) \otimes {}^t(0 \ 1) \} + \{ {}^t(0 \ 1) \otimes {}^t(1 \ 0) \} \quad (*9)$$

は, \mathbb{C}^2 の 2 つのベクトルを使って

$${}^t(0 \ 1 \ 1 \ 0) = {}^t(a \ b) \otimes {}^t(c \ d) = {}^t(ac \ ad \ bc \ bd)$$

という形で書くことができない.

(*9) をスピン状態で書き換えれば

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B \right) \quad (*10)$$

この状態は、 $|\psi\rangle \otimes |\xi\rangle$ と書くことができない。

そのような状態を、**エンタングル状態**という。

エンタングル状態の測定

2つのスピン A, B のエンタングル状態

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B) \quad (*10)$$

に対し，粒子 A のスピンの向きを測定する．

エンタングル状態の測定

2つのスピン A, B のエンタングル状態

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B) \quad (*10)$$

に対し，粒子 A のスピンの向きを測定する．

たとえば A のスピン上向き（↑）を観測したら，状態は

$$|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B$$

に収束する．

つまり，A のスピンの向きを測定すると，B のスピンの向きも確定する．

量子テレポーテーション

量子テレポーテーションの導入

Alice が遠方にいる Bob に，自身が持っている状態

$$|\xi\rangle_X = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

を転送したいとする．

$|\xi\rangle_X$ は未知．つまり，Alice は a, b の値を知らない．

Alice は a, b を知らないまま，Bob に $|\xi\rangle_X$ を転送することができる．

量子テレポーテーションの導入

Alice が遠方にいる Bob に、自身が持っている状態

$$|\xi\rangle_X = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

を転送したいとする.

$|\xi\rangle_X$ は未知. つまり, Alice は a, b の値を知らない.

Alice は a, b を知らないまま, Bob に $|\xi\rangle_X$ を転送することができる.

もちろん状態 $|\xi\rangle_X$ にある粒子が Bob の居場所へテレポートするわけではなく, $|\xi\rangle$ を Bob の手元で再現できるということ.

とはいえ, 状態が同じ 2 つの粒子は区別できないので, 粒子がテレポートしたのと同じである.

$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ の正規直交基底として, (*8) の代わりに, **ベル基底**

$$|\Phi^+\rangle_{A,B} := \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B)$$

$$|\Phi^-\rangle_{A,B} := \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B)$$

$$|\Psi^+\rangle_{A,B} := \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B)$$

$$|\Psi^-\rangle_{A,B} := \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B - |\downarrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B)$$

をとれる.

量子テレポーテーションの手順①-1

量子テレポーテーションを実行するためには、事前に両者がエンタングル状態を共有している必要がある。

Alice と Bob が、エンタングル状態

$$|\Phi^+\rangle_{A,B} := \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_A \otimes |\uparrow\rangle_B + |\downarrow\rangle_A \otimes |\downarrow\rangle_B)$$

を所持しているとする。

これを使って、Alice が持っている未知状態

$$|\xi\rangle_X = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

を Bob に転送する。

X, A, B を合わせた系の状態は

$$\begin{aligned} |\xi\rangle_X \otimes |\Phi^+\rangle_{A,B} &= \frac{1}{2} |\Phi^+\rangle_{X,A} \otimes (a|\uparrow\rangle_B + b|\downarrow\rangle_B) \\ &+ \frac{1}{2} |\Phi^-\rangle_{X,A} \otimes (a|\uparrow\rangle_B - b|\downarrow\rangle_B) \\ &+ \frac{1}{2} |\Psi^+\rangle_{X,A} \otimes (b|\uparrow\rangle_B + a|\downarrow\rangle_B) \\ &+ \frac{1}{2} |\Psi^-\rangle_{X,A} \otimes (-b|\uparrow\rangle_B + a|\downarrow\rangle_B) \end{aligned} \quad (*11)$$

と書ける.

量子テレポーテーションの手順②

Alice は系 XA に対し，ベル基底による測定を行う．

すると，状態 $|\Phi^+\rangle_{X,A}, |\Phi^-\rangle_{X,A}, |\Psi^+\rangle_{X,A}, |\Psi^-\rangle_{X,A}$ のどれかをそれぞれ $1/4$ の確率で観測する．

量子テレポーテーションの手順②

Alice は系 XA に対し、ベル基底による測定を行う。

すると、状態 $|\Phi^+\rangle_{XA}, |\Phi^-\rangle_{XA}, |\Psi^+\rangle_{XA}, |\Psi^-\rangle_{XA}$ のどれかをそれぞれ $1/4$ の確率で観測する。

(*11) より、Alice が観測した系 XA の状態によって、Bob のもつ系 B の状態が確定する。

Alice (XA)	Bob (B)
$ \Phi^+\rangle$	$a \uparrow\rangle + b \downarrow\rangle$
$ \Phi^-\rangle$	$a \uparrow\rangle - b \downarrow\rangle$
$ \Psi^+\rangle$	$b \uparrow\rangle + a \downarrow\rangle$
$ \Psi^-\rangle$	$-b \uparrow\rangle + a \downarrow\rangle$

このとき、一瞬で（光速を超えて）Bob の状態が収束する。

量子テレポーテーションの手順③-1

Alice は何らかの手段（**古典通信**）によって、自分がどの状態を観測したか Bob に伝える。

Bob は系 B に対して、次のような操作を行う。

1. Alice が $|\Phi^+\rangle$ を観測した場合、何もしない。
2. Alice が $|\Phi^-\rangle$ を観測した場合、 $|\downarrow\rangle$ の符号を反転する。
3. Alice が $|\Psi^+\rangle$ を観測した場合、 $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の係数を入れ替える。
4. Alice が $|\Psi^-\rangle$ を観測した場合、 $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の係数を入れ替え、さらに $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の係数を入れ替える。

この操作により、系 B の状態が $|\xi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$ になる。

具体的には，Bob は

1. Alice が $|\Phi^+\rangle$ を観測した場合，何もしない．
2. Alice が $|\Phi^-\rangle$ を観測した場合，系 B にユニタリ変換 σ^z を施す．
3. Alice が $|\Psi^+\rangle$ を観測した場合，系 B にユニタリ変換 σ^x を施す．
4. Alice が $|\Psi^-\rangle$ を観測した場合，系 B にユニタリ変換 $\sigma^z\sigma^x = i\sigma^y$ を施す．

ただし， σ^i はパウリ行列として表される：

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (*12)$$

量子テレポーテーションに関する注意

- Alice が持っていた状態 $|\xi\rangle_X$ は、手順の途中（Alice による系 XA の測定）で破壊されている。
- また、その測定によって、Alice は $|\xi\rangle_X$ の状態について何の情報も得ることができない。
確率 $1/4$ ずつでベル基底のどれかを観測するだけである。
- **超光速で Alice から Bob に情報が伝わるわけではない。**
Bob が状態 $|\xi\rangle$ を得ることができるのは、Alice から観測結果を古典通信によって（**光速以下の速度で**）伝えられた後である。

量子クローン不可能定理

量子テレポーテーションでは，もともと Alice が持っていた状態 $|\xi\rangle_X$ は破壊されて残らない．

では，Alice が持つ状態 $|\xi\rangle_X$ を残しながら，Bob に $|\xi\rangle$ を転送することは可能か？

量子クローン不可能定理

量子テレポーテーションでは、もともと Alice が持っていた状態 $|\xi\rangle_X$ は破壊されて残らない。

では、Alice が持つ状態 $|\xi\rangle_X$ を残しながら、Bob に $|\xi\rangle$ を転送することは可能か？

それは不可能である。

より一般に、以下の定理が成り立つ。

量子クローン不可能定理

一般の、未知の状態 $|\xi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$ を複製するのは不可能である。

ご清聴ありがとうございました.



This file is licensed under CC-BY-SA 4.0.

Want you get PDF or $\text{T}_\text{E}\text{X}$ file? Visit
<https://github.com/scasc1939/nusotsu>.