
(a) Exchange model
J_1
J_2
J_c
c
(b) $(H\,H\,2)$, $E_f = 14.7$ meV
ΔE (meV)
H (r.l.u.)
(c) $(0\,0\,L)$, $E_f = 28$ meV
ΔE (meV)
L (r.l.u.)
Spin-wave modes
10 meV scan path
Resolution (2σ)
(d) $(H\,H\,2)$
$\Delta E = 8$ meV, $E_f = 28$ meV
Intensity (counts / 10^3 monitor)
$H = K$ (r.l.u.)
(e) $(H\,H\,3)$
$\Delta E = 10$ meV, $E_f = 14.7$ meV
$H = K$ (r.l.u.)
(f) $(H\,H\,2)$
$\Delta E = 2$ meV, $E_f = 14.7$ meV
$H = K$ (r.l.u.)
(g) $(0\,0\,L)$
$\Delta E = 5$ meV, $E_f = 28$ meV
Intensity (counts / 10^3 monitor)
L (r.l.u.)
(h) $(0\,0\,L)$
$\Delta E = 9$ meV, $E_f = 28$ meV
L (r.l.u.)
(i) $(0\,0\,L)$
$\Delta E = 10$ meV, $E_f = 28$ meV
L (r.l.u.)
Data (1σ errors)
Resolution-convolved model + background
Fixed background