

15. 진정간호

1. 목적

저혈압, 호흡 기능 억제 등 진정 치료 부작용의 발생을 예방하기 위해 적절한 자가 진정 전 환자의 상태를 평가하고 안전하게 진정 치료를 수행하기 위함이다.

2. 규정, 지침

- 인증 규정 - 5장. 수술/마취/진정 - 04-01. 성인 진정 치료 규정
- 인증 규정 - 5장. 수술/마취/진정 - 04-02. 소아 진정 치료 규정

3. 대상

- 1) 성인 : 입원하여 시행함을 원칙으로 한다. 단, 의사의 판단 하에 필요시 외래에서 시행할 수 있다.
- 2) 소아 : 만 12세 이하의 소아, 외래에서 시행 시 소아 진정실에서 시행하여 회복 후 퇴실한다.
 - 단, 19세 미만의 경우 담당의 의사의 판단에 따라 소아 진정 규정을 적용할 수 있다.

4. 범위

- 적용 : 의식 수준의 저하가 동반되는 중등도 또는 깊은 진정하에 시행되는 검사(수면내시경, EEG, MRI, CT, Echocardiogram 등) 처치 및 시술
- 적용되지 않는 경우 : ICU, OR, RR에서의 진정치료와 같이 지속적으로 심혈관계 및 호흡기계 감시가 가능한 경우, 의사의 판단 하에 응급치료가 필요한 경우

5. 진정 대상 의약품 목록

성인					
성분명	용법	용량	기타사항	발현 시간	작용시간
[Benzodiazepines]					
Midazolam	IV	0.05-0.1 mg/kg, 일반 용량 <5 mg 60세 이상 또는 만성질환자: 0.01 mg/kg		IV 1-5분	30분-2시간
Diazepam	IV	1.25-2.5 mg, 최대 0.1-0.2 mg/kg까지 5분 간격으로 반복 투여할 수 있다	최대 1~2mg/min	IV 5분	6-8시간
Lorazepam	IV	0.5-2 mg, 최대 4 mg		IV 15-30분	6-12시간
Remimazolam	IV	전신마취 유도 시 6~12mg/kg/h 진정유도 시 5mg 진정 유지 필요 시 추가로 2.5mg	0.9% 생리식염주사액으로 1mg/ml로 조제 후 사용 Bolus 투여 시 1분에 걸쳐 서서히 투여	IV 진정 시 3-3.5분	IV 진정 시 투여중단 11~14분 후 완전 회복
[Barbiturate]					
Thiopental	IV	2-4 mg/kg 60세 이상 또는 만성질환자: 1-3 mg/kg	고령자에게 저혈압 주의	IV 1분 이내 PR 10-15분	IV 10-60분 PR 60-120분
Pentobarbital	PO IV	100 mg, 최대 400 mg	10-30분 이상 서서히 투여 (50 mg/min 이하) 최고농도 50 mg/mL	IV 1분 PO 15분	IV 15분 PO 3-4시간
기타약제					
Etomidate	IV	0.05-0.1 mg/kg, 반복 투여 가능		IV 20초-1분	4-10분
Propofol	IV	전신마취 유도 시 1-2.5 mg/kg	진정 유지용량 25-75 μ g/kg/min	90-100초	5-10분 (1회 투입 시)
Remifentanyl	IV	0.05-0.3 mcg(μ g)/kg/min	지속적 주입 추천	1.5분	투여 중단 5-10분 후 약효 소멸
Dexmedetomidine	IV	0.5-1.0 mcg(μ g)/kg 유도용량 0.1-1.0 mcg(μ g)/kg/h 유지용량	0.9% 생리식염주사액 48 mL에 넣어 50 mL로 조제 후 사용		

소아					
성분명	용법	용량	기타사항	발현 시간	작용시간
[Benzodiazepines]					
Midazolam	IV	0.05-0.1 mg/kg		IV 1-5분	30분-2시간
Diazepam	IV	0.05-0.1 mg/kg, 최대 5 mg		IV 5분	6-8시간
Lorazepam	PO IV	0.01-0.04 mg/kg		IV 15-30분	6-12시간
[Barbiturate]					
Thiopental (Pentotal)	IV	3-5 mg/kg	20분 이내 진정이 안 되면 추가 투여 : 15 mg/kg	IV 1분 이내	IV 10-60분
	PR	25 mg/kg(3개월 이하 15 mg/kg)	3개월 이하 7.5 mg/kg	PR 10-15분	PR 60-120분
Pentobarbital	IV	1-3 mg/kg, 최대 100-200 mg	10-30분 이상 서서히 투여 (50 mg/min 이하), 최고 농도 50 mg/mL	IV 1분	IV 15분
기타약제					
Chloral Hydrate	PO PR	25-75 mg/kg, 최대 0.5-1 mg		PO 30-60분	4-8시간
Ketamine	IV	1 mg/kg, 최대 4 mg/kg	분비물 과다와 과민반응을 예방하기 위해 콜린역제나 긴 작용시간의 벤조디아제핀을 병용할 수 있다	IV 2-4분	20-60분

6. 진정 절차

금식 지침

구분	음식	물, 맑은 음료
신생아 - 36개월 미만	모유 : 4시간 분유 및 고형식 : 6시간	2시간
36개월 - 성인	8시간	

1) 진정 QSED 처방을 확인한다.

성인	QSED	 진정관리 (Sedation treatment)	☐	1	-	*	1
소아	QSED AC302	 진정관리 (Sedation treatment) 소아 진정 관리료 [종합병원]	☐	1	-	*	1
			☐	1	-	*	1

2) 진정 치료를 수행하는 의사는 진정 치료 전

진정 전 환자 평가서를 이용하여 환자 상태를 평가하고 모니터링하여 적합한 진정 치료를 계획한다.

* 의사가 작성한 진정 전 환자평가서 확인 방법

의무기록	청구/재고 기본정보
의무기록조회	
APACHE II 조회	
동의서 및 기타 출력서식	
동의서 및 기타 출력서식 반납	
다직종간 Care Plan	
환자교육 통합기록	
제증명조회	
사본/제증명 기본정보	
사본발행신청	
사본발급조회	
차트 이력조회	
서신시청	

진정 전 환자 평가서(소아)

검사/시술일		
추진 진단명		
검사/시술명		
의학적 병력	☐ 없음 ☐ 고혈압 ☐ 당뇨병 ☐ 결핵 ☐ 알러지 ☐ 간질환 ☐ 심장질환 ☐ 요질환 ☐ 기타 _____ 흡연 ☐ 무 ☐ 유 _____ pyr 음전 ☐ 무 ☐ 유 _____	
	기도 및 식도의 변형 ☐ 무 ☐ 유 _____	
	진행요법 부작용 과거력 및 가족력 ☐ 무 ☐ 유 _____ ☐ 무 ☐ 유 _____	
환문고개 및 환형진재 복출	☐ 무 ☐ 유 _____	
악을 알레르기	☐ 무 ☐ 유 _____	
검사소견	Lab. Chest X-ray, ECG이상 확인 (☐ 무 ☐ 유 _____)	
신체등급	[ASA Class] ☐ 1. 건강한 환자 ☐ 2. 경도의 전신질환이 있느냐? ☐ 3. 고도의 전신질환이 있느냐? ☐ 4. 생명을 위협하는 심한 전신질환을 가진자? ☐ 5. 수술에 관계없이 사망율이 50%인 사망한기 환자? ☐ 6. 죽음을 선언되고 장기기증을 목적으로 수술받는 환자	
	Mental Status ☐ Alert ☐ Drowsy ☐ Stupor ☐ Semicoma ☐ Coma	
	진정계급 ☐ Minimal ☐ Moderate ☐ Deep	
	악을 두어 경로 ☐ IV ☐ IM ☐ Oral	
	지시응답 ☐ 양호 ☐ 의지저거 ☐ 혼동됨 ☐ 해당없음	
	구식환인 ☐ 예 ☐ 아니오	

진정 전 환자 평가서(성인)

검사/시술일	
추정 진단명	
검사/시술명	
의학적 병력	☐ 앓음 ☐ 고혈압 ☐ 당뇨 ☐ 결핵 ☐ 알러지 ☐ 간질환 ☐ 심장질환 ☐ 암질환 ☐ 기타 : _____ 흡연 ☐ 무 ☐ 유 _____ Day 흡연 ☐ 무 ☐ 유 _____
기도 및 식도의 변형	☐ 무 ☐ 유 _____
진정모양 부진음 과거력 및 가족력	과거력 ☐ 무 ☐ 유 _____ 가족력 ☐ 무 ☐ 유 _____
항응고제 및 항혈전제 복용	☐ 무 ☐ 유 _____
약물알레르기	☐ 무 ☐ 유 _____
검사조건	Lab, Chest X-ray, EGG이상 확인 (☐ 무 ☐ 유 _____)
산체등급	[ASA Class] ☐ 1. 건강한 환자 ☐ 2. 경도의 전신질환이 있는 자 ☐ 3. 고도의 전신질환이 있는 자 ☐ 4. 생명을 위협하는 심한 전신질환을 가진 자 ☐ 5. 수술에 관계없이 사망률이 50%인 사망전환자 ☐ 6. 죽음이 선연되고 장기기증을 목적으로 수술 받는 환자
Mental Status	☐ Alert ☐ Drowsy ☐ Stupor ☐ Semicoma ☐ Coma
진정제폭	☐ Minimal ☐ Moderate ☐ Deep
약물 투여 경로	☐ IV ☐ IM ☐ Oral
치어상태	☐ 양호 ☐ 외치격인 ☐ 혼동됨 ☐ 해동없음
급식확인	☐ 예 ☐ 아니요

3) 계획한 진정 치료에 대해 설명하고 진정 동의서를 받는다.

성인	소아										
진정(수면)동의서	진정 동의서(소아)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">진단명</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">수술/처치/검사</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">환자병력 (기초정보조사)</td> <td style="padding: 5px;"> ★최종으로 조사된 환자병력을 참고하여 작성해 주시기 바랍니다. 고혈압: / 심장질환: / 당뇨병: / 알러지: / 임신여부: / 수술여부: / 약물복용력: </td> </tr> </table>	진단명		수술/처치/검사		환자병력 (기초정보조사)	★ 최종으로 조사된 환자병력을 참고하여 작성해 주시기 바랍니다. 고혈압: / 심장질환: / 당뇨병: / 알러지: / 임신여부: / 수술여부: / 약물복용력:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">진단명</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">수술/처치/검사</td> <td></td> </tr> </table>	진단명		수술/처치/검사	
진단명											
수술/처치/검사											
환자병력 (기초정보조사)	★ 최종으로 조사된 환자병력을 참고하여 작성해 주시기 바랍니다. 고혈압: / 심장질환: / 당뇨병: / 알러지: / 임신여부: / 수술여부: / 약물복용력:										
진단명											
수술/처치/검사											
1. 환자의 현재 상태 ☐ 고혈압 ☐ 저혈압 ☐ 당뇨병 ☐ 알레르기 ☐ 흡연 ☐ 특이소견 없음 ☐ 특이체질 _____ ☐ 출혈소인 _____ ☐ 투약사고 _____ ☐ 기도이상 _____ ☐ 수술력 _____ ☐ 약물복용력 _____ ☐ 기타질환(심장, 호흡기, 신장질환 등) _____	1. 환자의 현재상태 ☐ 고혈압 ☐ 저혈압 ☐ 당뇨병 ☐ 알레르기 ☐ 흡연 ☐ 특이소견 없음 ☐ 특이체질 _____ ☐ 출혈소인 _____ ☐ 투약사고 _____ ☐ 기도이상 _____ ☐ 수술력 _____ ☐ 약물복용력 _____ ☐ 기타질환(심장, 호흡기, 신장질환 등) _____										

4) 진정 치료를 수행하는 의료인은 '진정 평가 기록지' 또는 '간호기록' 등을 통해 진정 전·중·후 환자 상태를 평가하고 모니터링하여 기록한다.

* 진정 중 서면 기록지 출력 방법

(출력물을 지참하여 검사실에서 수기로 작성 후 '진정 평가 기록지' 또는 'EMR 진정 기록지' 입력한다.)

[illegible]

진정 평가 기록지

진정 전 환자 감시										
검사/시술일 : 20 년 월 일					검사 및 시술용 :					
시간	BP(mmHg)		PR/RR(회/분)		SpO ₂ (%)		서명			
:										
진정 중 환자 감시										
산소투여 ()L/min ☐ Mask ☐ Cannula	투여시간	약제	음식/음물	BP (mmHg)	PR/RR (회/분)	SpO ₂ (%)	MOAA/S Scale	서명		
	:	:	/	/	/					
	:	:	/	/	/					
	:	:	/	/	/					
	:	:	/	/	/					
	:	:	/	/	/					
	:	:	/	/	/					
※ 의식상태 (MOAA/S Scale)	진정 환자 반응								점수	
	중상적인 통증의 복소리로 이물음 부를 때 반응함 (Hert)								5	
	중상적인 통증의 복소리로 이물음 부를 때 반응이 없음								4	
	반복적으로 복음은 복소리로 이물음 부를 경우에만 반응함								3	
	가볍게 두드리거나 음을 살짝 흘리는 경우에 반응함								2	
	고정된 음의 음을 자극에만 반응함								1	
음들 자극에도 반응하지 않음								0		
의료인(의사/간호사) 서명 :										
진정 후 환자 감시										
회복평가	기준 (Modified Aldrete Score)				점수	시간	BP (mmHg)	PR/RR (회/분)	SpO ₂ (%)	호흡기
활동	걸음 또는 자발적으로 4개의 사지를 움직일 수 있음				2	:	/	/		
	걸음 또는 자발적으로 2개의 사지를 움직일 수 있음				1	:	/	/		
	걸음 또는 자발적으로 사지를 움직이지 못함				0	:	/	/		
호흡	심호흡 및 기침이 가능				2	:	/	/		
	호흡근력 또는 호흡의 저하없음				1	:	/	/		
	무호흡				0	:	/	/		
순환 (소아는 맥박으로 대신)	진정 전 혈압의 ±20% 미만				2	:	/	/		
	진정 전 혈압의 ±20% ~ 48%				1	:	/	/		
	진정 전 혈압의 ±50% 이상				0	:	/	/		
의식	충진히 깨어 있음				2	· 퇴실 시 동반자 ☐ 보호자 ☐ 이송요원 ☐ 의뢰진	· 진정 후 고통 시험 ☐ 유 ☐ 무	· 탈상 할 수 있는 증상 및 징후, 보상에만 가능한 일상생활을 할 수 있음		
	자극에 깨어 날 수 있음				1					
	반응 없음				0					
산소 포화도	산소 투여 없이 산소포화도 92% 이상				2	· 기타 특이(외계)사항 :				
	산소 투여 후 산소포화도 90% 이상				1					
	산소 투여 후 산소포화도 90% 미만				0					
★ 진정 후 회복상태 평가 기준 9점 시 퇴실 가능						의료인(의사/간호사) 서명 :				

진정 기록지 작성 방법 [성인]

① 진정 치료 전

활력징후와 산소포화도를 평가하고 모니터링하여 기록한다.

② 진정 약물 투여

처방 받은 약물을 투약하고 약품명, 용량, 용법을 기록하고 서명한다.

③ 진정 치료 중

15분 간격으로 호흡수, 맥박, 산소포화도, 의식상태 (MOAA/S scale)를 평가하고 모니터링하여 기록한다.

- 혈압은 진정 치료 중, 후 필요시 (산소포화도 95%미만, 정상 심박수 범위를 벗어날 때) 해당과 의사의 판단 하에 기록한다.

④ 진정 치료 후

회복 시까지 활력징후와 회복 상태를 **15분 간격**으로 평가하고 모니터링하여 기록한다.

⑤ 회복실이 없는 검사실에서 검사를 진행한 입원환자는 입원실로 이동하여 평가하고 모니터링하여 기록한다.

진정 기록지 작성 방법 [소아]

① 진정 치료 전

활력징후와 산소포화도를 평가하고 모니터링하여 기록한다.

② 진정 약물 투여

처방 받은 약물을 투약하고 약품명, 용량, 용법을 기록하고 서명한다.

③ 진정 치료 중

10분 간격으로 호흡수, 맥박, 산소포화도, 의식상태 (MOAA/S scale)를 평가하고 모니터링하여 기록한다.

- 필요시 해당과 의사의 판단 하에 5분 간격으로 평가, 기록한다.
- 혈압은 진정 치료 중, 후 필요시 (산소포화도 95%미만, 정상 심박수 범위를 벗어날 때) 해당과 의사의 판단 하에 5분 간격으로 평가하고 기록한다.

④ 진정 치료 후

회복 시까지 호흡수, 맥박, 산소포화도와 회복상태를 **10분 간격**으로 평가하고 모니터링하여 기록한다.

⑤ 회복실이 없는 검사실에서 검사를 진행한 입원환자는 입원실로 이동하여 평가하고 모니터링하여 기록한다.

공통사항

- 진정 치료 진행 시 Patient Monitor를 연결하지 못하는 경우 Oxymetry를 통해 맥박과 산소포화도를 확인하여 기록한다. 검사 중으로 호흡수 측정하지 못할 경우 '검사 중'으로 기록한다.
- 퇴실 기록 : 퇴실 장소(검사실), 퇴실 시간(검사실 퇴실 시간)
- 진정 회복 후 퇴실 기준은 Modified Aldrete Score 9점 이상일 때 의사 또는 간호사가 결정

회복 평가	기준(Modified Aldrete Score)	점수
활동	명령에 의해 4개의 사지를 움직일 수 있음	2
	명령에 의해 2개의 사지를 움직일 수 있음	1
	명령에 의해 사지를 움직이지 못함	0
호흡	심호흡 및 기침이 가능	2
	호흡곤란 또는 호흡의 제한성	1
	무호흡	0
순환 (소아 : 맥박)	진정 전 혈압의 $\pm 20\%$ 차이	2
	진정 전 혈압의 $\pm 20\% \sim 50\%$ 차이	1
	진정 전 혈압이 $\pm 50\%$ 이상 차이	0
의식	완전 깨어 있으며 지남력이 있음	2
	음성으로 부르면 눈을 뜨고 일어남	1
	아무런 반응이 없음	0
산소 포화도	산소 투여 없이 산소포화도 92% 이상	2
	산소 투여 후 산소포화도 90% 이상	1
	산소 투여 후 산소포화도 90% 미만	0

- 필요 시 퇴실 기준을 만족하지 못해도 의사의 판단에 따라 퇴실할 수 있으며 퇴실 기록에 그 사유를 기록한다.

퇴실 시 교육

- 주의해야 할 주요증상 및 징후
- 식사, 약물복용, 일상 활동
- 발생할 수 있는 합병증
- 응급상황 발생 시 일차적인 처치 방법 및 연락처 등

진정 기록 [진정 중]

[진정기록지]

진정 중/후 기록지

> 등록번호 > 이름 > 성별/나이 > 주민번호
> 진료과 > 주치의 > 병동/병실

진정 중(비작성) | 진정 후(비작성) | 초기화(F5) >

기본정보

1. 진정이 필요한 검사/시술 선택, 2가지 이상인 경우에는 각각의 검사/시술명에 따라 진정기록 작성 필요

검사/시술명: 해당없음 | 기록번호:

시술하는 경우에는 시술의 이름 작성, 검사인 경우(CT, MRI 등)는 '해당없음' 체크

Time-Out: ☒ 환자확인 ☒ 검사/시술명 확인 ☒ 검사/시술 부위 확인 ☒ 멸균 차후 확인 ☒ 검사/시술 장비, 물품 확인

V/S 기록

2. > 입력주기: 10분 | 15분 > 시작시간: 종료시간:

3. 성안: 검사 및 시술 종료까지 15분 간격으로 활력징후와 산소포화도, 의식상태(MOASS/S scale) 평가 및 기록
소아: 검사 및 시술 종료까지 10분 간격으로 호흡수, 맥박, 산소포화도, 의식상태(MOASS/S scale) 평가 및 기록

진정 중 환자 반응(MOAA/S)

0	무반응
1	통증에 반응
2	해당기 어렵고 흔들면서 호명 시 눈을 뜬다
3	불러하나 반복 호명 시 눈을 뜬다
4	불러하나 쉽게 깨며 호명 시 눈을 뜬다 눈을 뜨고 지남력 있음
5	호명 시 즉시 눈을 뜨고 지남력 있음

> O2투여장비:

검사 시술 기록

구분	약제명	수량	단위	회수	용법	투약일시	투약자
1							

4. 투여하는 진정제 약물 기록, 투약 기록한 시간/이름과 동일해야 함

진정 중 특이사항

5. 퇴실장소: 검사실/퇴실시간: 검사실에서 출발한 시간

퇴실

퇴실시간: 퇴실방법: ☐ 도보 ☐ 휠체어 ☐ 침대 ☐ Stretcher-car ☐ 의료진동반

작성자: | 인쇄 | 전송서장(F1) >

[간호기록]

예시 ①

MRI / MRA 진	D	진정 C-spine MRI c CE 예정임
	P:	검사 목적, 내용, 필요성 설명한다
	A	검사 동의서 확인함 검사 가기 전 반지, 시계, 목걸이 등의 장신구를 제거함 의치 제거함 조영제 부작용 설명함 IV line 확보함 검사 동의서 확인함 검사 가기 전 반지, 시계, 목걸이 등의 장신구를 제거함
	R	교육내용 만족해 함

해당되는 진정 검사와 관련된 DPAR 기록을 입력한다.

예시 ②

S	진정 전 V/S BP: 90/60mmHg, HR:150회/분 RR:26회/분, SpO2 97% 측정됨 T-PCRA 6ml 경구 복용함
S	T-PCRA 6ml 경구 복용 후 진정 상태로 간호사 000 동행하여 S-Car 타고 MRI실 내려감

진정 기록 [진정 후]

[진정기록지]

진정 중/후 기록지

> 등록번호 > 이름 > 성별/나이 > 주민번호
 > 진료과 > 주치의 > 병원/명칭

☐ 진정 중(머작성) **진정 후(머작성)**

☒ **도착**
 도착시간
 낙상예방활동 ☒ Schenck 활동 ☒ 침대고정 ☒ 낙상 예방교육 받 ☒ **간접 안내문출력**

☒ **V/S 기록**
 > +입력주기 ☐ 10분 ☒ 15분 > V/S CNTL

③ 성안: 회복까지 15분 간격으로 활력징후 및 회복상태 평가 및 기록
 소아: 회복까지 10분 간격으로 호흡수, 맥박, 산소포화도 및 회복상태를 평가 및 기록

> O2투여장비

④ 퇴실 평가 (M-Aldrete Scale)
 점수 점 9점 이상 시 퇴실가능
 의식 호흡 혈압
 활동성 산소포화도

☒ Modified Aldrete Score 점으로 의사 에게 보고함 ☒ ☐ 도발 ☐ 통제어 ☐ 보조자동반
☒ 퇴실교육 시행 (낙상예방, 응급구조, 의사, 약물복용, 추후방문, 연락처) ☒ 의료진 동반 ☐ 유 ☐ 무
☒ 퇴실안내문 제공 ☐ 유 ☐ 무(입원)

☒ **진정 후 퇴실사항** **①** 퇴실 기준은 M-Aldrete scale 9점 이상, 필요 시 의사 판단 하에 퇴실 가능

작성자 :

[간호기록]

예시 ①

MRI / MRA 후	D	진정 C-spine MRI c CE 검사 마침
		의식수준: Drowsy
		검사 후 S-car 올라옴
	A	검사 후 가능한 합병증 설명하고 관찰함
		검사 후 주의사항 교육함
		의식상태 사정함
	R	이상 증상 있을 시 알리도록 격려함
		특이사항 없음

해당되는 진정 검사와 관련된 DPAR 기록을 입력한다.

예시 ②

S	MRI 검사 종료 후 간호사 000 동행하여 S-Car 타고 병실로 돌아옴 진정된 상태로 V/S HR:108회/분, RR: 24회/분, SpO2 97% 측정됨. 진정 후 안내문 보호자(모)에게 제공하며 교육함
---	---

[실제 예시]

진정 중(각성완료) 진정 후(미작성) 작성일: 2025-05-12 처방일: 2025-05-08 검사명: [기타 MRI] Brain 6 | 초기해(F5) >

진정 중(각성완료) 진정 후(미작성) 작성일: 2025-05-12 처방일: 2025-05-08 검사명: [기타 MRI] Brain 6 | 초기해(F5) >

0 기본정보

진단명 (주)Status epilepticus (부)Febrile seizure

검사/시술명 [진정][기타 MRI] Brain 6 Diffusion

시술의 ☒ 해당없음 **Ex) CT, MRI 해당 없음 체크** 해당없음

낙상예방활동 ☒ Siderail 롤링 ☒ 침대고정 ☒ 낙상 예방교육 함

Time-Out ☒ 환자확인 ☒ 검사/시술명 확인 ☒ 검사/시술 부위 확인 ☒ 영상 자료 확인 ☒ 검사/시술 장비, 물품 확인

0 V/S 기록

> 입력주기 10분 15분 > 시작시간 2025-05-12 06:50 > 종료시간 2025-05-12 08:35

날짜	2025년 05월 12일											
시	6시		7시		8시		9시		10시		11시	
분	50분	55분	00분	05분	10분	15분	20분	25분	30분	35분	40분	45분
SpO2(%)	98	97	96	95	96	97	97					
SBP(mmHg)	100	100	110	110	110	검사중	검사중	100				
DBP(mmHg)	60	60	70	70	70	검사중	검사중	60				
Pulse(회/min)	99	101	76	85	82	87	87	86				
RR(회/min)	24	27	26	26	26	검사중	검사중	26				
MOAA/S	5	5	4	1	1	1	1					
O2 L/min												
작성자												

> 02투여장비

0 회복평가 (M-Aldrete Scale)

점수 9 % 이상 이상 시 퇴실가능

의식 1.음성으로 부르면 눈 ☒ 1 호흡 2.심호흡 및 기침이 ☒ 2 혈압 2.진정 전 비교 혈압 ☒ 2

활동성 2.명명해 의제 내 ☒ 2 산소포화도 2.분홍색, 산소포화도 ☒ 2

0 퇴실

☒ Modified Aldrete Score 9 점으로 의사 (담당의 이름)에게 보고함 ☒ 도뇨 ☒ 발치 ☒ 보호자동반

☒ 퇴실교육 시행 (낙상예방, 온전금지, 식사, 약물복용, 추위방문, 면학제) ☒ 의료진동반 ☒ 유 ☒ 무(입원)

☒ 퇴실안내문 제공 ☒ 유 ☒ 무(입원)

0 진정 후 특이사항

회실시간 2025-05-12 08:37 회실유형 ☒ 도뇨 ☐ 복제어 ☐ 침대 ☒ Stretcher-car ☒ 의료진동반

회실장소 MRI실

작성자: 삭제 > 인증서명(F12) >

진정 후 안내문

의무기록 청구/제고 기본정보

의무기록조회

APACHE II 조회

동의서 및 기타 출력서식

동의서 및 기타 출력서식 반납

다직종간 Care Plan

환자교육 통합기록

제증명조회

동의서 및 기타 출력서식

등록번호 성명

>> OCR서식리스트 ☒ OCR반납확인

서식 처방 옮겨찾기 출력리스트 **찾기**

> OCR 진정 후 안내문 Q 조회

☐ 전자동의서

OCR서식명

1	진정 후 안내문_성인
2	진정 후 안내문_소아

- 구두 및 서면으로 교육한다.
- 소아진정 시 필요에 따라 보호자의 도움을 받을 수 있으며, 퇴실 시 보호자 또는 대리인이 동행한다.

성인	소아
진정 후 안내문_성인 회 활동 1. 환자와 의식이 회복되고 전신상태가 충분히 회복될 때까지 휴식을 취하신 후 귀가 하셔야 합니다. 2. 회복 후에도 몇 시간 동안은 졸음이 오거나 어지러울 수 있습니다. 3. 검사 당일에는 운전은 하거나 기계를 다루거나 중요한 결정을 내리는 일은 삼가 하십시오. 4. 검사 당일에는 자전거, 보드, 스케이팅 등 고도의 조정능력이 필요한 운동은 피하십시오. 5. 가능하면 하루정도는 집에서 휴식을 취하시는 것이 바람직합니다.	진정 후 안내문_소아 아이에게 두어졌던 약은 _____입니다. 진정제가 투여되었던 아이는 깨어난 후에도 일시적으로 어지러움을 느끼거나 졸음을 잘 참지 못하거나 판단력이 흐려질 수 있으므로 정상적인 활동을 하는데 어려움을 겪을 수 있습니다. 따라서 보호자께서는 다음을 유의 하여 주시기 바랍니다. 회 활동: 몇 시간 동안은 졸려하거나 어지러울 수 있습니다. 1. 잔물효과가 없어질 때까지 (약어도 4~6시간) 아이를 혼자 거거나 굳게 하지 않습니다. 2. 긴장 요법 시행일은 자전거, 보드, 스케이팅, 수영 등의 고도의 집중과 운동 조정능력이 필요한 활동은 안전 사고의 위험이 있으므로 하지 않습니다.

7. 응급상황 발생 시 대처 방안

- 1) 진정 치료는 응급 장비(환자 모니터 기기, 산소 공급 장치, Ambu bag, 마스크, 기관 삽관 기구, 흡인 시설, 응급약품 등)를 구비한 장소에서 시행하며, 3분 이내에 제세동기가 도착할 수 있어야 한다.
- 2) 진정치료 중(시술 중, 회복 시 동일 적용) 산소포화도가 95%이하로 저하 시 환자 모니터링 및 상태를 재평가하고 산소포화도가 95%이하로 지속 시 즉시 산소를 공급한다.
- 3) 과다진정으로 인해 산소를 투여함에도 산소포화도가 95%이하로 지속되면(시술 중이면 시술을 중지) 각성자극을 주면서 즉각 가역제를 투여한다.

※ 환자의 활력징후가 불안정하고 깊은 진정 상태가 될 때 마취통증의학과에서 의뢰할 수 있다

8. 소아 진정치료 절차

