

## DS3 d'informatique (durée : 1h)

Le sujet vous demande d'écrire des fonction ou morceaux de programmes en Python, attention à indenter correctement votre code, vous pouvez marquer les différents niveaux d'indentation par des lignes verticales.

Si la syntaxe Python vous gêne pour répondre à certaines questions, vous pouvez écrire la partie de programme qui pose problème en pseudo-code, c'est-à-dire en langue française, par exemple :

Si  $a$  est entier, alors ..., sinon ...

Pour  $i$  allant de 1 à 100 faire...

### Exercice 1 : LA DICHOTOMIE

On souhaite résoudre numériquement une équation du type  $f(x) = 0$ , où  $f$  est une fonction continue. Plus précisément on cherche un nombre réel  $x_0$  tel que  $f(x_0) = 0$ .

La méthode de dichotomie consiste à partir d'un intervalle  $[a_0; b_0]$  sur lequel la fonction  $f$  change de signe et qui contient donc nécessairement une solution  $x_0$ . On coupe ensuite l'intervalle en deux et on conserve la partie  $[a_1; b_1]$  sur laquelle la fonction  $f$  change de signe. En répétant cette opération on réduit progressivement la taille de l'intervalle contenant  $x_0$ . L'algorithme s'arrête lorsque la longueur de l'intervalle  $[a_n; b_n]$  est inférieure à la précision  $\varepsilon$  souhaitée sur le résultat.

1. Compléter la fonction python suivante qui détermine la valeur de  $x_0$  par la méthode de dichotomie.

```
def zeroDichotomie(f, a, b, eps):
    while ....:
        c = ...
        if f(a)*f(c) < 0 :
            ....
        else:
            ....
    return (a+b)/2
```

2. Montrer par récurrence que la longueur de l'intervalle  $[a_n; b_n]$  vaut  $\frac{b_0 - a_0}{2^n}$ .
3. En déduire l'expression du nombre d'itérations nécessaire en fonction de  $a_0, b_0$  et  $\varepsilon$ .

On souhaite résoudre l'équation

$$\sin(\cos(x)) = x^2$$

4. Écrire une fonction python  $f1(x)$  que l'on pourrait utiliser pour déterminer une solution de cette équation en utilisant la fonction `zeroDichotomie` ci-dessus. On supposera que toutes les fonctions de la bibliothèque `math` ont été importées.

5. Déterminer un intervalle de départ  $[a_0; b_0]$  adéquat (On justifiera précisément pourquoi l'intervalle choisi convient). En déduire une estimation du nombre d'itérations nécessaire pour trouver une solution à  $10^{-10}$  près.

### Exercice 2 : QUELQUES FONCTIONS

Soit  $L$  une liste de  $n$  nombres entiers.

1. Écrire une fonction `plusGrand(L)` qui renvoie le plus grand élément de la liste  $L$ . Quelle est sa complexité en fonction de  $n$  ?
2. Écrire une fonction `somme(L)` qui renvoie la somme de tous les éléments de  $L$ . Quelle est la complexité en fonction de  $n$  ?

On donne la fonction suivante :

```
def truc(L, S):
    for i in range(len(L)):
        for j in range(len(L)):
            if L[i] + L[j] == S:
                return [i, j]
    return -1
```

3. Expliquer en quelques mots ce que fait la fonction `truc`.
4. Quelle est, en fonction de  $n$ , la complexité de la fonction `truc` dans le meilleur des cas ? Dans le pire des cas ?

### Exercice 3 : ALGORITHME D'EUCLIDE ET PGCD

Le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) de deux nombres  $a$  et  $b$  est le plus grand entier qui divise  $a$  et  $b$  simultanément. Par exemple le  $\text{PGCD}(20, 30) = 10$ ,  $\text{PGCD}(3, 8) = 1$  et  $\text{PGCD}(4, 12) = 4$ . On se propose d'étudier dans cet exercice l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de deux nombres.

On commence par écrire une fonction qui effectue la division euclidienne de  $a$  par  $b$  et qui en renvoie le reste  $r$ . On supposera que  $a \geq b > 0$ .

```
def reste(a, b):
    r = a
    n = 0
    while r >= b:
        r = r - b
        n = n + 1
    return r
```

1. Montrer que  $r$  est un *variant de boucle* et en déduire que la fonction se termine forcément.

2. Que représente la variable  $n$  dans ce programme ?
3. Montrer que  $a = bn + r$  est un invariant de boucle, en déduire que la fonction précédente renvoie bien le reste de la division de  $a$  par  $b$ .

On traduit maintenant l'algorithme d'Euclide dans la fonction suivante :

```
def PGCD(A, B):  
    a = A  
    b = B  
    r = reste(a, b)  
    while r != 0:  
        a = b  
        b = r  
        r = reste(a, b)  
    return b
```

4. Décire le déroulement de l'appel de PGCD(21, 15). On indiquera notamment les valeurs de  $a$ ,  $b$  et  $r$  à la fin de chaque itération de la boucle.
5. Montrer que, dans la fonction précédente,  $r$  est un *variant de boucle*. En déduire que la fonction se termine.
6. Montrer que si un nombre  $c$  divise simultanément  $a$  et  $b$ , il divise également  $b$  et  $a - qb$ . En déduire qu'un diviseur commun à  $a$  et  $b$  est aussi un diviseur commun à  $b$  et  $r$ .
7. En déduire que  $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(a, b)$  est un invariant de boucle.
8. En utilisant la condition de sortie de la boucle, montrer que cette fonction renvoie effectivement  $\text{PGCD}(A, B)$ .