

## DM4 : Cinétique chimique – corrigé

Problème : DIMÉRISATION DU BUTA-1,3-DIÈNE. (D'APRÈS ENS ULM 1992).

1. Pour une réaction d'ordre 2 on a :

$$\frac{1}{c_B(t)} = \frac{1}{c_0} + \alpha kt = \frac{1}{c_0} + 2kt$$

2. Le tableau d'avancement est le suivant :

	B	D
État initial	$n_0$	0
État interm.	$n_0 - 2\xi$	$\xi$


3. D'après la loi des gaz parfaits :  $PV = nRT$ , on a  $c_B = \frac{n_B}{V} = \frac{n_0 - 2\xi}{V} = \frac{n_0}{V} - 2\frac{\xi}{V}$ .

À un instant quelconque la pression totale dans l'enceinte est donnée par

$$P = \frac{n_t RT}{V} = \frac{(n_0 - \xi)RT}{V} = \frac{n_0 RT}{V} - \frac{\xi RT}{V} = P_0 - \frac{\xi RT}{V} \text{ donc } \frac{\xi}{V} = \frac{P_0 - P}{RT}$$

En combinant ces deux équations on obtient bien :  $c_B = \frac{2P - P_0}{RT}$

4. On trace  $\frac{1}{c_B}$  en fonction de  $t$ , on obtient :



On trouve bien une droite dont le coefficient directeur est  $2k$  (question 1). Une régression linéaire donne la valeur  $k = 1,20 \times 10^{-2} \text{ l mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$

5. Le temps de demi-réaction est  $\tau_{1/2} = \frac{1}{2kc_0} = 2088 \text{ s}$ . À  $\tau_{1/2}$  la concentration  $c_B$  vaut  $c_B(\tau_{1/2}) = c_0/2 \simeq 10^{-2} \text{ mol/l}$ .

À  $\tau_{1/2}$   $c_B$  est divisée par 2, donc  $c_B(\tau_{1/2}) = c_B(0)/2 = \frac{P_0}{2RT}$ . On trouve la pression totale dans l'enceinte en résolvant :  $\frac{P_0}{2RT} = \frac{2P - P_0}{RT}$  on trouve  $P = \frac{3P_0}{4} \simeq 0,76 \text{ bar}$ .


6. Lorsque le volume est variable, la vitesse volumique de disparition de B est

$$v = \frac{1}{V} v_D(B) = -\frac{1}{V} \frac{dn_B}{dt} \neq -\frac{dc_B}{dt} = \frac{dn_B/V}{dt} \text{ L'équation de la question 1 n'est plus valable.}$$

7. On utilise à nouveau la loi des gaz parfaits en considérant cette fois que la pression est constante égale à  $P_0$ . D'après le tableau d'avancement, on a  $P_0 V = (n_0 - \xi)RT = n_0 RT - \xi RT = P_0 V_0 - \xi RT$ . Donc  $\xi = \frac{P_0 V_0 - P_0 V}{RT} = n_0 - n_0 \frac{V}{V_0}$ . Et


$$n_B = n_0 - 2\xi = n_0 \left( 2\frac{V}{V_0} - 1 \right)$$

8. On obtient le graphique suivant :



9. On détermine graphiquement la vitesse de disparition de B en déterminant le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point considéré. La vitesse de réaction est  $v_r = -\frac{1}{2} \frac{dn_B}{dt}$  et la vitesse volumique est  $v = \frac{v_r}{V}$ .

10. Le graph représentant  $\ln(v)$  en fonction de  $\ln(c_B)$  est :



On obtient une droite de coefficient directeur  $a \simeq 1.9 \simeq 2$  ce qui confirme que la réaction est bien d'ordre 2. Et l'ordonnée à l'origine qui vaut  $\ln(k)$  donne la valeur  $k \simeq 0,6 \times 10^{-2} \text{ Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$ .

11. Ces valeurs sont assez concordantes avec celles trouvées à la question 4., en tout cas la valeur de  $k$  est du même ordre de grandeur.