

KOSTENLOSER SELBSTCHECK

5 Zeichen, dass dein Blutzucker stärker schwankt, als du denkst

Für alle, die nachmittags einbrechen, ständig Hunger haben oder trotz Disziplin nicht weiterkommen.

Das findest du darin

- Die 5 Zeichen für Schwankungen im Alltag
- Was den Blutzucker wirklich beeinflusst
- Der Versuch über drei Tage, mit Vorlage
- Die 3 Blutwerte für dein nächstes Labor
- 14 Tage selbst messen, Schritt für Schritt
- Wann sich ein genauerer Blick lohnt



Warum das früher anfängt, als die meisten denken

Blutzucker ist kein Thema, das erst mit einer Diagnose beginnt. Lange bevor ein Wert auffällig wird, schwankt er oft schon stärker als gedacht. Der Körper gleicht das aus, und genau dieses Ausgleichen kostet Kraft.

Diese Schwankungen spürst du oft Jahre, bevor ein Laborwert auffällig wird. Auf Dauer zeigt sich das dann an anderer Stelle: Bauchfett, Blutdruck, Verspannungen.

Die folgenden fünf Zeichen sind keine Diagnose. Es sind Beobachtungen aus dem Alltag, die zusammengenommen ein Muster ergeben können.

Die 5 Zeichen

1

Du wirst nach dem Essen müde

Besonders nach größeren, kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Ein kurzer Durchhänger ist normal. Regelmäßige, deutliche Müdigkeit ist ein Hinweis.

2

Zwei bis drei Stunden später meldet sich wieder Hunger

Obwohl die Mahlzeit von der Menge her ausreichend war.

3

Nachmittags brauchst du Kaffee oder etwas Süßes

Der klassische Leistungseinbruch am frühen Nachmittag.

4

Abends kommt starker Appetit

Vor allem auf Kohlenhydrate, Snacks oder Süßes.

5

Deine Konzentration verändert sich mit dem Essen

Vor dem Essen gereizt oder unkonzentriert, danach zunächst besser, anschließend wieder müde.

GUT ZU WISSEN

Ein einzelnes Zeichen sagt wenig. Erst wenn du dich in mehreren wiederer kennst, lohnt sich der genauere Blick auf die Seiten danach.

Was den Blutzucker beeinflusst

Nicht nur Zucker. Wie stark dein Blutzucker nach einer Mahlzeit steigt und wie schnell er wieder fällt, hängt an deutlich mehr Faktoren als am reinen Zuckergehalt.

● Zusammensetzung der Mahlzeit

● Protein

● Ballaststoffe

● Bewegung

● Muskelmasse

● Schlaf

● Stress

● Essenszeitpunkt

● Insulinsensitivität

Der Versuch über drei Tage

Beobachte drei Tage lang, ohne etwas zu ändern. Noch keine Kalorien zählen, noch keine Umstellung. Es geht nur darum, Zusammenhänge zu sehen. Notiere in Stichworten: Müdigkeit, Heißhunger, Konzentration, innere Unruhe.

Tag	Uhrzeit	Was gegessen	nach 30 Min	nach 60 Min	nach 120 Min

Die 3 Blutwerte für dein nächstes Labor

Der Nüchternblutzucker allein zeigt Schwankungen kaum. Er ist eine Momentaufnahme an einem einzigen Morgen. Diese drei Werte zeigen mehr. Du kannst sie beim nächsten Blutbild mitbestimmen lassen.

1

HbA1c · der Langzeitwert

Zeigt den durchschnittlichen Blutzucker der letzten acht bis zwölf Wochen. Gut für den Rückblick, gleicht Spitzen und Täler aber aus. Ein unauffälliger HbA1c schließt starke Schwankungen deshalb nicht aus.

2

HOMA-Index · wie gut wirkt dein Insulin

Wird aus Nüchternblutzucker und Nüchterninsulin berechnet. Er gibt einen Hinweis darauf, wie gut dein Körper auf Insulin anspricht. Dieser Wert verändert sich oft, lange bevor der Blutzucker selbst auffällt. Wichtig: Dafür muss das Nüchterninsulin mitbestimmt werden, das passiert im Standardlabor meist nicht automatisch.

3

C-Peptid · wie viel Insulin wird produziert

Entsteht zusammen mit Insulin und zeigt, wie viel Insulin deine Bauchspeicheldrüse tatsächlich herstellt. Hilft einzuordnen, ob dein Körper viel Insulin aufwenden muss, um den Blutzucker zu halten.

SO FRAGST DU DANACH

„Ich möchte beim nächsten Blutbild den HbA1c, das Nüchterninsulin für den HOMA-Index und das C-Peptid mitbestimmen lassen.“ Nicht alle Werte sind Kassenleistung. Frag vorher nach den Kosten. Die Ergebnisse besprichst du am besten mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, mit deinem behandelnden Therapeuten oder mit uns in der Praxis.

14 Tage selbst messen

Am meisten lernst du, wenn du deinen eigenen Verlauf siehst. Dafür gibt es kleine Sensoren, die kontinuierlich messen. Du trägst sie am Oberarm, sie übertragen die Werte an dein Handy. Ein Sensor läuft rund 14 Tage, und diese Zeit nutzt du von Anfang an: beobachten und gleich ausprobieren.

Zwei verbreitete Anbieter:



FreeStyle Libre · Abbott

freestyle.abott



Dexcom

dexcom.com

So gehst du vor

1

Notiere jede Mahlzeit mit Uhrzeit

Ohne diese Notizen lassen sich die Ausschläge später nicht zuordnen. Ein Stichwort pro Mahlzeit reicht.

2

Achte auf vier Dinge

Wie hoch geht es nach welcher Mahlzeit? Wie lange dauert es, bis der Wert zurück ist? Wie sieht die Nacht aus? Wie unterscheiden sich gleiche Mahlzeiten an verschiedenen Tagen?

3

Verändere gezielt einzelne Dinge

Immer nur eine Sache auf einmal: Gemüse und Protein zuerst essen, nach dem Essen zehn Minuten gehen, die Mahlzeit anders zusammenstellen. So siehst du direkt, was bei dir wirkt.

WICHTIG

Die Werte solcher Sensoren weichen von Laborwerten ab. Sie eignen sich dafür, Verläufe zu beobachten, nicht für eine Diagnose. Wenn bei dir eine Diabetes-Erkrankung bekannt ist oder du Medikamente nimmst, die den Blutzucker beeinflussen, sprich vorher mit deiner Ärztin, deinem Arzt oder mit uns.

Wie es weitergeht

Dieser Check zeigt dir ein Muster. Er beantwortet aber nicht, warum dein Körper in diesem Muster steckt. Blutzucker, Blutdruck, Blutfette, Bauchfett und sogar Verspannungen hängen zusammen und verstärken sich gegenseitig. Deshalb bringt es selten etwas, nur an einer Stellschraube zu drehen.

DEIN NÄCHSTER SCHRITT

Kostenloses Informationsgespräch, 15 Minuten

Telefonisch, unverbindlich und ohne Druck. Wir ordnen deine Beobachtungen ein und sagen dir ehrlich, ob und wie wir dir weiterhelfen können.

emrich-gesundheitspraxis.de/stoffwechsel

Wer dahintersteht



Tobias Emrich führt die Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen gemeinsam mit seiner Frau. Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut, drei Fachrichtungen in einer Hand. In rund 30 Jahren hat er mehrere tausend Menschen mit chronischen und komplexen Beschwerden begleitet, mit dem Blick auf das ganze System statt auf den einzelnen Wert.

WICHTIGER HINWEIS

Diese Unterlage dient der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Einzelne Beobachtungen erlauben keine Diagnose. Bei anhaltenden Beschwerden oder auffälligen Werten wende dich bitte an deine Ärztin oder deinen Arzt. Bestehende Medikamente werden ausschließlich in ärztlicher Absprache verändert.