🎧 **Képben vagy?** · *Az erő vetületei: a ferdén húzott szánkótól a kötélen lógó gerendáig* (5:50)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás




## Az erő vetületei és előjelei

🔖 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13. és 16. oldal

> ⚡ **Röviden**
>
> - Síkban négy adat határoz meg egy erőt: hatásvonala egy pontjának két koordinátája, a nagysága és az irányszöge.
> - A statikában az $x$ tengely jobbra, az $y$ tengely lefelé pozitív; az $\alpha$ irányszöget a pozitív $x$ iránytól az óramutató járásával egyezően mérjük.
> - Az erő vetületei (komponensei) előjeles mennyiségek: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$.
> - A két vetületből az erő nagysága $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$; a nagyság sosem negatív.
> - Az erő irányát csak a két vetület előjele együtt határozza meg; az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

Egy ferde erővel nehéz közvetlenül számolni. Ha egy kötél ferdén húz egy gerendát, az erő egy része felfelé emeli, más része oldalra húzza. Ezért a ferde erőt egy vízszintes és egy függőleges részre bontjuk; ezekkel a részekkel már egyszerű összeadni, kivonni és egyensúlyt vizsgálni. Ez az oldal azt mutatja meg, hogyan adjuk meg egy erő helyét és irányát, hogyan bontjuk fel, és milyen előjelet kapnak a részek. A felbontás alapja az erő mint vektor: nagysága, iránya és hatásvonala van.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Az erő helye és iránya

🗓️ Óra: szept. 10.


A statikai feladatokban az erőkkel számolunk. Egy síkban fekvő erő legalább négy adattal adható meg egyértelműen:

- **két adat:** a hatásvonal egy pontjának $(x; y)$ koordinátái - ezek mondják meg, hol fut a hatásvonal;
- **egy adat:** az erő nagysága, például $F = 26\ \mathrm{kN}$;
- **egy adat:** az erő iránya, vagyis egyetlen szög: a vízszintessel bezárt szög, az óramutató járásával egyező irányban mérve.

> Miért elég a hatásvonal *egy* pontja? Merev testen az erő a saját hatásvonala mentén eltolható úgy, hogy a testre gyakorolt hatása nem változik (lásd az erő mint vektor oldalt). A hatásvonalat pedig egy pontja és az iránya már meghatározza. A pont koordinátái helyet adnak meg, ezért hosszúságegységük van (például méter); az erő nagyságát erőegységben (N, kN) adjuk meg. A két adatfajtát ne keverd: az erő vízszintes és függőleges részének kiszámításához csak a nagyság és az irányszög kell, a pont helye nem.
>
> 💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Az erő irányának megadása




Az irányszöget a vízszintestől, az óramutató járásával egyezően mérjük; értéke 0° és 360° között bármekkora lehet. Itt az y tengely felfelé mutat.

*Az irányszöget a vízszintestől, az óramutató járásával egyező irányban mérjük; értéke $0°$ és $360°$ között bármekkora lehet. Ezen a bevezető rajzon a függőleges tengely még a matematikaórán megszokott módon felfelé mutat; a statikai számításokban a következő szakasz koordináta-rendszerét használjuk.*

## Az erő vetületei

🗓️ Óra: szept. 10.

Egy adott $F$ erő **vetületein** az erőnek a derékszögű koordináta-rendszer tengelyeire vetített, előjeles vetületeit értjük. Jelük $F_x$ (a vízszintes $x$ tengelyre vetítve) és $F_y$ (a függőleges $y$ tengelyre vetítve). A vetítés merőleges: a nyíl két végéből merőlegest állítunk a tengelyre, és a két talppont közötti szakasz a vetület. Ugyanezt a két részt az erő **komponenseinek** (összetevőinek) is nevezzük.

**A statikában szokásos koordináta-rendszer:** az $x$ tengely jobbra, az $y$ tengely **lefelé** pozitív; balra és felfelé haladva negatív értékeket kapunk.

> Miért lefelé pozitív az $y$? Az épületeket terhelő legtöbb erő, például az önsúly és a hóteher, lefelé hat. Lefelé pozitív $y$ mellett ezek függőleges komponense pozitív szám lesz. A matematikaórán megszokott felfelé pozitív $y$ tengely helyett itt mindig nézd meg a tengelynyilakat a rajzon.
>
> 💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Felbontás derékszögű háromszöggel

🗓️ Óra: szept. 10., 15., szept.

Ha az erő nyila ferde, a nyíl és a két vetület egy derékszögű háromszöget alkot: a nyíl az **átfogó**, a vízszintes és a függőleges vetület a két **befogó**. Ezért a **Pitagorasz-tétel** szerint az erő nagysága a két vetületből:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}.$$

Szövegesen: az erő nagysága a két vetület négyzetösszegének négyzetgyöke.

A második lépés a szög. Legyen $\alpha$ az erő hatásvonalának a vízszintessel bezárt szöge; a jobbra-lefelé mutató erőnél ez egyben az irányszög is (más irányoknál lásd az előjeleket). Az $(x; y)$ pontban, ahol az erő hat, húzzunk vízszintes egyenest: ez párhuzamos az $x$ tengellyel, ezért a hatásvonal ugyanakkora $\alpha$ szöget zár be vele is. Az ilyen szögeket **egyállású szögeknek** nevezzük. Így a háromszögben az $\alpha$ szög melletti befogó a vízszintes, a szemközti befogó a függőleges vetület, és a szögfüggvények:

$$\sin\alpha = \frac{F_y}{F} \;\Rightarrow\; F_y = F \cdot \sin\alpha, \qquad \cos\alpha = \frac{F_x}{F} \;\Rightarrow\; F_x = F \cdot \cos\alpha.$$

Szövegesen: a függőleges vetület az erő nagysága szorozva a szög szinuszával, a vízszintes vetület az erő nagysága szorozva a szög koszinuszával.


A harmadik szögfüggvény a **tangens**: a szöggel szemközti befogó osztva a szög melletti befogóval. Itt:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{F_y}{F_x}.$$

Ezzel a két vetületből közvetlenül kiszámítható a szög; a kidolgozott példák a számításos feladatok oldalán vannak.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Erő és előjeles vetületei




*Az $F$ erő nyila a derékszögű háromszög átfogója, $F_x$ és $F_y$ a két befogó. A ferde hatásvonal az $x$ tengellyel és a támadáspontbeli vízszintessel egyállású, azonos $\alpha$ szöget zár be.*

> Ebben a példában az erő jobbra-lefelé mutat, ezért lefelé pozitív $y$ mellett mindkét vetület pozitív. A befogók *hossza* mindig pozitív; a vetületek *előjelét* a következő szakasz szerint a nyíl iránya adja. Ha a feladat a szöget nem a vízszintestől, hanem a függőlegestől adja meg, a szinusz és a koszinusz szerepe felcserélődik: előbb mindig nézd meg, melyik befogó van a szög mellett. Ellenőrzésként minden vetület abszolút értéke legfeljebb akkora, mint maga az erő.
>
> 💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Előjelek és irányszög

🗓️ Óra: szept. 15.


Egy vetület előjele azt mondja meg, a tengely pozitív vagy negatív irányába mutat-e. Jobbra mutató vízszintes vetület pozitív, balra mutató negatív; lefelé mutató függőleges vetület pozitív, felfelé mutató negatív. A négy lehetséges ferde irány:

| **Az erő nyila** | **A vetületek előjele** |
|---|---|
| 1. jobbra-lefelé ($\boldsymbol{F_1}$) | $\boldsymbol{F_{1x} > 0, F_{1y} > 0}$ |
| 2. balra-lefelé ($\boldsymbol{F_2}$) | $\boldsymbol{F_{2x} < 0, F_{2y} > 0}$ |
| 3. balra-felfelé ($\boldsymbol{F_3}$) | $\boldsymbol{F_{3x} < 0, F_{3y} < 0}$<br>⚠️ gépi javítás |
| 4. jobbra-felfelé ($\boldsymbol{F_4}$) | $\boldsymbol{F_{4x} > 0, F_{4y} < 0}$ |



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Nyílirányok és komponensek

### A négy alapirány előjelei




### Gyakorlat: nyolc erő




*Felül a négy alapirány előjelei, alul a következő gyakorlat nyolc ereje. Az $y$ tengely lefelé pozitív, ezért minden felfelé mutató komponens negatív.*

Az erő irányát csak a két vetület **előjelének együttes ismeretében** határozhatjuk meg pontosan. Az egyik előjel önmagában kevés: $F_x > 0$ igaz a jobbra-lefelé és a jobbra-felfelé mutató erőre is. A tangens sem dönt egyedül: a jobbra-lefelé $(+,+)$ és a balra-felfelé $(-,-)$ mutató erőnél a $\operatorname{tg}\alpha = F_y/F_x$ hányados egyaránt pozitív.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ha az irányszöget a pozitív $x$ iránytól, az óramutató járásával egyezően $0°$ és $360°$ között mérjük, akkor lefelé pozitív $y$ mellett az $F_x = F\cos\alpha$ és $F_y = F\sin\alpha$ képlet az előjelet is magától adja. Az óramutató járása szerinti forgatás ugyanis jobbról lefelé visz, a pozitív $y$ felé:

| Az $\alpha$ irányszög | Az erő nyila | $F_x, F_y$ előjele |
|---|---|---|
| $0°$ és $90°$ között | jobbra-lefelé | $+, +$ |
| $90°$ és $180°$ között | balra-lefelé | $-, +$ |
| $180°$ és $270°$ között | balra-felfelé | $-, -$ |
| $270°$ és $360°$ között | jobbra-felfelé | $+, -$ |

Például $\alpha = 150°$ esetén $\cos 150° < 0$ és $\sin 150° > 0$, tehát az erő balra-lefelé mutat. Visszafelé, két ismert vetületből: számold ki a hegyesszöget a vetületek abszolút értékéből ($\operatorname{tg}\beta = |F_y|/|F_x|$), majd a két előjelből döntsd el a síknegyedet: $(+,+)$ esetén $\alpha = \beta$, $(-,+)$ esetén $\alpha = 180° - \beta$, $(-,-)$ esetén $\alpha = 180° + \beta$, $(+,-)$ esetén $\alpha = 360° - \beta$.

💡 gépi magyarázat

## Gyakorlat: nyolc erő komponenseinek előjele

🗓️ Óra: | szept.

**Feladat:** a fenti ábra alsó részén nyolc erő látható, különböző síknegyedekben. Bontsd fel mindegyiket vízszintes és függőleges komponensre, és írd az előjelet a komponens elé. Az $x$ tengely jobbra, az $y$ tengely lefelé pozitív.

**Megoldás:** csak a nyíl iránya számít, az nem, hogy az erő melyik síknegyedben kezdődik. Például az $F_1$ a jobb alsó síknegyedben kezdődik, mégis balra-felfelé mutat, ezért mindkét komponense negatív.

| Az erő nyila | Komponensek |
|---|---|
| $F_1$ balra-felfelé | $-F_{1x}, -F_{1y}$<br>⚠️ gépi javítás |
| $F_2$ vízszintesen jobbra | $+F_{2x}, F_{2y} = 0$ |
| $F_3$ jobbra-lefelé | $+F_{3x}, +F_{3y}$ |
| $F_4$ balra-lefelé | $-F_{4x}, +F_{4y}$ |
| $F_5$ jobbra-felfelé | $+F_{5x}, -F_{5y}$ |
| $F_6$ balra-felfelé | $-F_{6x}, -F_{6y}$ |
| $F_7$ jobbra-felfelé | $+F_{7x}, -F_{7y}$ |
| $F_8$ jobbra-lefelé | $+F_{8x}, +F_{8y}$ |

A vízszintes $F_2$ erőnek nincs függőleges része, ezért $F_{2y} = 0$; a teljes erő a vízszintes komponensben van: $F_{2x} = F_2 > 0$.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Skalárkomponens és komponensvektor

A képletekben szereplő $F_x$ és $F_y$ **előjeles számok** (skalárkomponensek): van számértékük és erőegységük, például $F_x = -22{,}52\ \mathrm{kN}$. A rajzon a hozzájuk tartozó vízszintes és függőleges nyilak a **komponensvektorok**; ezek összege maga az erővektor. Az előjel azt mondja meg, a komponensvektor a tengely pozitív vagy negatív irányába mutat.

Gyors ellenőrzés minden felbontás után:

- $|F_x| \le F$ és $|F_y| \le F$; ha valamelyik komponens nagyobb az erőnél, számolási hiba van.
- $F_x^2 + F_y^2 = F^2$, kerekítési eltéréssel.
- Az $F$ nagyság nem lehet negatív; az előjel csak a komponenseken jelenik meg.

Vízszintes erőnél $F_y = 0$, függőleges erőnél $F_x = 0$. Függőleges erőnél az $F_y/F_x$ hányadost nem képezhetjük, mert nullával osztanánk; az irány ilyenkor közvetlenül látszik: lefelé $\alpha = 90°$, felfelé $\alpha = 270°$. Fokban megadott szögeknél a számológépet fokos (DEG) üzemmódba állítsd.

💡 gépi magyarázat

A számításos feladatok oldala kidolgozott példákon mutatja meg a felbontást, az előjeleket és a szög meghatározását.

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Melyik négy adattal adunk meg egyértelműen egy síkbeli erőt?

2. A statikában szokásos koordináta-rendszerben merre pozitív az x és az y tengely?

3. Hogyan számolod ki egy F nagyságú, α irányszögű erő két vetületét?

4. Mekkora az erő, ha a vízszintes vetülete 3 kN, a függőleges 4 kN?

5. Milyen előjelű a balra-felfelé mutató erő két vetülete, ha az y lefelé pozitív?

6. Egy erő a jobb alsó síknegyedben kezdődik, és balra-felfelé mutat. Pozitív-e a vízszintes komponense?

7. Miért nem elég a tangens értéke az erő irányának meghatározásához?

8. Mekkora az irányszög, ha az erő függőlegesen felfelé mutat?

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a balra-felfelé mutató $F_3$ erőnél $F_{3x} < 0$ és $F_{3y} < 0$; a nyolc gyakorló erő közül a balra-felfelé mutató $F_1$ vízszintes komponense $-F_{1x}$. Addig is ezeket tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Melyik négy adattal adunk meg egyértelműen egy síkbeli erőt?

A hatásvonal egy pontjának két koordinátájával, az erő nagyságával és az irányszögével.

### 2. A statikában szokásos koordináta-rendszerben merre pozitív az x és az y tengely?

Az $x$ jobbra, az $y$ lefelé pozitív.

### 3. Hogyan számolod ki egy F nagyságú, α irányszögű erő két vetületét?

$F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$, ha $\alpha$ a pozitív $x$ iránytól, az óramutató járásával egyezően mért irányszög; így a képletek az előjelet is megadják.

### 4. Mekkora az erő, ha a vízszintes vetülete 3 kN, a függőleges 4 kN?

$F = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\ \mathrm{kN}$.

### 5. Milyen előjelű a balra-felfelé mutató erő két vetülete, ha az y lefelé pozitív?

Mindkettő negatív: balra a vízszintes, felfelé a függőleges irány negatív.

### 6. Egy erő a jobb alsó síknegyedben kezdődik, és balra-felfelé mutat. Pozitív-e a vízszintes komponense?

Nem, negatív. Az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

### 7. Miért nem elég a tangens értéke az erő irányának meghatározásához?

Mert a $\operatorname{tg}\alpha = F_y/F_x$ hányados két ellentétes irányú erőnél is ugyanaz: például $(+,+)$ és $(-,-)$ előjelpárnál egyaránt pozitív. Az irányt csak a két vetület előjele együtt dönti el.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## 8. Mekkora az irányszög, ha az erő függőlegesen felfelé mutat?

$270°$: a pozitív $x$ iránytól óramutató járása szerint háromnegyed fordulat. Ekkor $F_x = 0$ és $F_y = -F$.

💡 🤓 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---


## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/