



📖 Tankönyv: 1.3. A testekre ható erők és 1.3.1. Az erő jellemzői, 10-11. oldal; 2.1. A mechanika alaptételei és 2.2. Az eredő fogalma, 25-26. oldal

### ⚡ Röviden

- Az erő egy test másik testre gyakorolt hatása; megváltoztathatja a test mozgásállapotát, méretét, alakját és helyét.
- Az erő jele  **$F$** , mértékegysége a newton:  **$1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$** ,  **$1\text{ kN} = 1000\text{ N}$** .
- Az erő vektor: négy jellemzője a támadáspont, a hatásvonal, a nagyság és a működés iránya (a nyíl értelme).
- Több erő együttes hatása egyetlen erővel, az eredővel helyettesíthető. Az erő kötött vektor: nem helyezhető át tetszőleges pontba. Az erőhatás kölcsönös: ha A hat B-re, B is hat A-ra.
- Az erőt léptékekkel rajzoljuk: például  **$1\text{ cm}$**  hosszú nyíl  **$1\text{ kN}$**  erőt jelent.

Ha egy ládát kötéllal húzunk, nem elég tudni, milyen erősen húzzuk: az is számít, hol fogjuk meg, és merre húzzuk. Ezért az erőt nem egyetlen számmal, hanem **vektorral** írjuk le: nagysága és iránya is van, és a rajzon nyíllal ábrázoljuk. Ez az oldal az erő fogalmát, mértékegységét, jellemzőit és rajzi ábrázolását tanítja. A [statika alapjai](#) oldal megmutatja, miért a nyugvó testek erői a statika tárgya.

## Az erőhatás

📅 Óra: szept. 8.

Minden test tehetetlen: a mozgásállapota csak valamilyen külső hatásra változik meg. Ezt a hatást nevezzük **erőnek**. Az erőhatás következtében a test mérete és alakja megváltozhat, és helyváltoztatás is bekövetkezik.

A **mozgásállapot** a test sebességét jelenti: annak nagyságát és irányát. Az álló kiskocsi magától nem indul el; ha meglökjük, elindul, a fal felé guruló pedig a falnál megáll: mindkét változáshoz erő kell. Egy test erőegyensúly mellett is mozoghat egyenletesen, tehát a mozgás önmagában nem bizonyítja, hogy ki nem egyenlített erő hat rá. Az erő a mozgásállapot **megváltozásához** kell.

💡 © gépi magyarázat

## Az erő jele és mértékegysége

📅 Óra: szept. 3.

Az erő jele  **$F$** . Kiszámítása [Newton II. törvényéből](#):  $F = m \cdot a$ , ahol  **$m$**  a test tömege,  **$a$**  a gyorsulása. Ebből adódik a mértékegység:  $[\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2] = [\text{N}]$ , vagyis a newton kilogrammszor méter per szekundum négyzet.

Az  $F = m \cdot a$  összefüggésben a tömeg  **$m$**  kilogrammban, a gyorsulás  **$a$**  méter per szekundum négyzetben, az erő  **$F$**  newtonban szerepel. Ha egy **1 kg** tömegű test gyorsulása **1 m/s<sup>2</sup>**, a rá ható eredő erő nagysága **1 N**. Ez a kapcsolat a mozgás változásáról szól; a statika [egyensúlyi helyzeteiben](#) az eredő erő nulla, ezért ott nincs gyorsulás.

💡 © gépi magyarázat

## Mekkora egy newton?

📅 Óra: szept. 8.

Az erő mértékegységét Isaac Newton angol fizikusról nevezték el. Egy newton az az erő, amely egy **1 kg** tömegű testet **1 m/s<sup>2</sup>** gyorsulással gyorsít:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad 1 \text{ kN} = 100 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \quad 1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}.$$

Szövegesen: egy newton egy kilogramm és egy méter per szekundum négyzet szorzata; egy kilonewton ezer newton.

A középső sorban száz kilogramm és tíz méter per szekundum négyzet szorzata ezer newton. A **10 m/s<sup>2</sup>** közel a Föld nehézségi gyorsulása, ezért a **100 kg** tömegű test súlya nagyjából **1 kN**, egy átlagos ember súlya pedig **0,7-0,8 kN** körül van. Ez nem azt jelenti, hogy a kilogramm erőegység: tömegből erőt csak a gyorsulással szorozva kapunk. A számítást a [mértékegységek oldalán](#) gyakoroljuk.

💡 © gépi magyarázat

# Így olvasd az erőnyilat

 Óra: szept. 8.

Az erőnek négy fontos jellemzője van:

1. **Támadáspont:** az a pont, ahol az erő hat a testre.
2. **Hatásvonal:** az az egyenes, amelyen az erő hat; ez adja meg az erő állását, amelyet gyakran szintén az erő működési irányának mondanak.
3. **Nagyság:** kifejezi, mekkora hatást gyakorolunk a testre.
4. **Az erő működésének iránya:** a hatás irányát adja meg, vagyis azt, hogy a hatásvonal mentén merre hat az erő.

Az "irány" szót tehát kétféle értelemben is használják, és a 2. és a 4. pont mást jelent. A **hatásvonal** állását, például a vízszintessel bezárt szögét a 2. pont adja meg: egy ferde kötélt hatásvonala a kötélt egyenesre. A 4. pont a hatásvonalon belül két lehetőség közül választ: a kötélt húzza a ládát, vagy a láda felé tolja valami. Ezt a nyílhegy mutatja; szakszóval az erő **értelmének** is nevezzük. A támadáspont mindig a hatásvonalon van.

  gépi magyarázat


| Jellemző                            | Mit mutat a rajzon?                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Támadáspont                         | Az a pont, ahol a nyíl a testhez ér. A nyíl kiindulhat innen (húzás), vagy a nyílhegy érkezik ide (nyomás). |
| Hatásvonal                          | A nyilat tartalmazó egyenes, gyakran szaggatottan meghosszabbítva; állását a szöge adja meg.                |
| Az erő működésének iránya (értelme) | A nyílhegy: a hatásvonal mentén melyik irányba hat az erő.                                                  |
| Nagyság                             | A nyíl hossza a megadott léptékben, vagy a mellé írt érték, például $F = 1 \text{ kN}$ .                    |

  gépi magyarázat

A következő ábra egy négyzet alakú testre ható erőket mutat. A vízszintes erő a test bal oldalán támad, és jobbra, a test felé hat; hatásvonala a szaggatott vízszintes egyenes. A ferde erő a test felső élén lévő pontban támad, a nyílhegy ehhez a ponthoz érkezik; hatásvonala a vízszintessel  $60^\circ$ -os szöget zár be, és szaggatottan a testen át folytatódik. A vízszintes erő nagyságát a mellé írt érték adja meg:  $F = 1 \text{ kN}$ . Felül egy függőlegesen lefelé mutató erő is látható.

## Az erő jellemzői


Támadáspont, hatásvonal, működési irány, nagyság



Az erő jellemzői egy testen: támadáspont, hatásvonal, a működés iránya és a nagyság ( $F = 1 \text{ kN}$ ).

A második ábra egyetlen húzóerőn mutatja a négy jellemzőt: a támadáspont a test szélén van, a nyíl a testtől elfelé mutat, a hatásvonal a nyíl egyenesese, a nagyságot pedig a nyíl hossza adja meg a választott léptékben.

## Húzóerő a test szélén



Húzóerő a test szélén: támadáspont, hatásvonal, értelem; a nagyságot a nyílhossz és a lépték adja.

✚☯ gépi kiegészítés

## Eredő és kölcsönösség

 Óra: szept. 8.

Az erő **vektormennyiség**, ezért a testekre ható erők a vektorok összeadásának szabályai szerint összegeezhetők. Több erő egyidejű, együttes hatása egyetlen erővel helyettesíthető. Ezt az erőt az erőhatások **eredőjének** nevezzük.

Ha két ember ugyanazt a ládát ugyanarra húzza **200 N** és **300 N** erővel, az eredő **500 N** ugyanabba az irányba. Ha egymással szemben húzzák, az eredő **100 N** a nagyobb erő irányába. Ferde erőknél a nagyságokat már nem lehet egyszerűen összeadni; ezt az **erő vetületeinél** és az **erőrendszereknél** tanuljuk.

 © gépi magyarázat

Az erőt nem helyezhetjük át a sík vagy a tér tetszőleges pontjába, mert az erő **kötött vektor**.

Merev testen az erő a saját hatásvonala mentén eltolható anélkül, hogy a testre gyakorolt hatása megváltozna. Másik hatásvonalra viszont nem tehető át ugyanilyen következmény nélkül, mert megváltozna a forgató hatása. Ez a merev test modelljére vonatkozik; a test belsejében keletkező alakváltozások szempontjából a támadáspont is számít.

 A tankönyv alapján

Az erő további jellemzője a **kölcsönösség**: ha egy test hatást gyakorol egy másikra, akkor a másik is hatást gyakorol az elsőre.

Az egyetlen helyettesítő erővel való leírásnak korlátja van. Merev testnél a forgató hatást is meg kell őrizni, ezért például egy **erőpár** nem helyettesíthető egyetlen erővel. A kölcsönhatás két ereje pedig két különböző testre hat, ezért nem ugyanannak a testnek az erőit egyensúlyozzák ki.


 © gépi kiegészítés

Ha az A test nyomja a B testet, B is erőt fejt ki A-ra. A két kölcsönhatási erő nagysága egyenlő, értelme ellentétes, de **különböző testekre hatnak**. Az alábbi ábrán a piros nyíl az A-ra, a kék a B-re ható erőt mutatja. Ez nem az egy testre ható **erőpár**: az A test erőinek összegzésébe a B-re ható erőt nem tehetjük bele. Az ábra csak ezt a kölcsönhatást emeli ki, a többi erőt nem ábrázolja.

 © gépi magyarázat

## Hatás-ellenhatás: két külön test

Az A test nyomja a B testet; B visszahat A-ra.



Azonos nagyság, ellentétes értelem,  
**de az egyik erő A-ra, a másik B-re hat.**

### A két testet külön vizsgálva



**Ezek nem ugyanazon testet kiegyenlítő erők.**

Csak a két test közötti kölcsönhatás erőit  
ábrázoljuk; a többi erő itt nem szerepel.

## Erőlépték: az erő rajzolása

 Óra: szept. 8.

A vektorábrák szerkesztéséhez **erőmértékre**, más néven erőléptékre van szükség. A lépték megmondja, mekkora erő tartozik egységnyi rajzi hosszhoz. Például: **1 kN** ↔ **1 cm**, vagyis **1 cm** hosszú nyíl **1 kN** nagyságú erőt ábrázol.

## Erőmérték: a rajz léptéke

Ugyanaz a rajzi hossz: 1 cm, illetve 1 kN



Átméretezve a képen látható szakasz hossza megváltozik.

*Erőlépték: ugyanaz a rajzi hossz 1 cm-t és 1 kN-t jelent. Képernyőn vagy átméretezett nyomaton a szakasz nem feltétlenül pontosan 1 cm hosszú; a lépték a szerkesztett rajzra vonatkozik.*

Ebben a léptékben a 3 cm hosszú nyíl 3 kN nagyságú erőt ábrázol:

$$3 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ kN}}{1 \text{ cm}} = 3 \text{ kN} = 3000 \text{ N.}$$

Fordítva, egy 4,5 kN-os erőt 4,5 cm hosszú nyíllal rajzolunk. A léptéket a rajz méretéhez választjuk: túl kicsi léptékkel a rajz nem fér el, túl nagyval a nyíl hossza nem mérhető le pontosan. Ha a feladat rajzból kér erőt, előbb keresd meg a léptéket, aztán mérd meg a nyilat.

💡 © gépi magyarázat

## Newton törvényei a statikai gondolkodásban

A mechanika alaptörvényeit olyan vonatkoztatási rendszerben használjuk, amelyben egy magára hagyott test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Az építőipari feladatokban a talajhoz rögzített rendszert ilyennek tekintjük.

- **I. törvény (tehetetlenség):** minden test megtartja nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, amíg egy erő ennek megváltoztatására nem kényszeríti. A nyugalom tehát addig marad meg, amíg a testre ható erők egyensúlyban vannak.
- **II. törvény (gyorsulás):** a test gyorsulása a rá ható eredő erő és a tömeg hányadosa,  $\vec{a} = \vec{R}/m$ , vagyis  $\vec{R} = m \cdot \vec{a}$ . A gyorsulás iránya megegyezik az eredő erő irányával.
- **III. törvény (hatás-ellenhatás):** két test kölcsönhatásakor mindkét testre azonos nagyságú, ellentétes irányú erő hat; a két erő különböző testekre hat.

A II. törvényből adódik az erő egysége:  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ . A nyugalomban maradó testre hathat több erő is, de ezek vektori összege nulla.

■ A tankönyv alapján


A vízszintes asztalon nyugvó könyvet lefelé a Föld vonzza, felfelé az asztal támasztja. Ez a két erő ugyanarra a testre, a könyvre hat, és kiegyenlíti egymást: ez egyensúly, nem hatás-ellenhatás. Az asztal felfelé ható erejének ellenhatása a könyv által az asztalra kifejtett, lefelé ható nyomóerő; ezt az asztal erőinek vizsgálatakor rajzolnánk fel.

💡 © gépi magyarázat

## Egyensúly vagy hatás és ellenhatás?


Könyv nyugszik egy vízszintes asztalon.

### 1. A könyvre ható erők



Ugyanarra a testre hatnak, egyenlő nagyságúak:  
**kiegyenlítik egymást, ez egyensúly.**

### 2. Az asztalra ható erő a könyvtől



**Ez a tartóerő ellenhatása: másik testre hat.**

Az asztal többi erejét itt nem ábrázoljuk.

Egyensúlyban lévő erők egy testen, illetve a hatás-ellenhatás pár, amely két testre hat.

A folytatásban az **erőfajtákat**, az **erő vetületeit**, az **erőrendszereket** és a **forgatónyomatékokat** tanulhatod meg.



## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mi az erő, és milyen változásokat okozhat?
2. Mi az erő négy jellemzője?
3. Mi a különbség a hatásvonal és az erő működésének iránya között?
4. Hány newton 2 kN, és mekkora erő gyorsít egy 3 kg-os testet  $2 \text{ m/s}^2$  gyorsulással?
5. Ha 1 cm-hez 1 kN tartozik, mekkora erőt jelent egy 3 cm hosszú nyíl, és milyen hosszú nyíllal rajzolunk 4,5 kN-t?
6. Mit jelent, hogy az erő kötött vektor, és merre tolható el merev testen?
7. Mi az eredő, és mit jelent a kölcsönösség?



[Vissza a tantárgyhoz](#)

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

## 1. Mi az erő, és milyen változásokat okozhat?

Az a külső hatás, amely a test mozgásállapotát megváltoztatja. Méret- és alakváltozást, valamint helyváltoztatást okozhat. Lásd [az erőhatást](#).

## 2. Mi az erő négy jellemzője?

A támadáspont, a hatásvonal, a nagyság és az erő működésének iránya (a nyíl értelme). Lásd [az erőnyilat](#).

## 3. Mi a különbség a hatásvonal és az erő működésének iránya között?

A hatásvonal az az egyenes, amelyen az erő hat; a működés iránya (értelem) azt mondja meg, hogy ezen az egyenesen merre: ezt a nyílhegy mutatja. Lásd [az erőnyilat](#).

💡 ☹ gépi magyarázat

## 4. Hány newton 2 kN, és mekkora erő gyorsít egy 3 kg-os testet $2 \text{ m/s}^2$ gyorsulással?

$2 \text{ kN} = 2000 \text{ N}$ . A gyorsító erő  $F' = m \cdot a = 3 \text{ kg} \cdot 2 \text{ m/s}^2 = 6 \text{ N}$ . Lásd [a newton](#).

## 5. Ha 1 cm-hez 1 kN tartozik, mekkora erőt jelent egy 3 cm hosszú nyíl, és milyen hosszú nyíllal rajzolunk 4,5 kN-t?

$3 \text{ kN} = 3000 \text{ N}$ ; a 4,5 kN-os erőt 4,5 cm hosszú nyíllal. Lásd [az erőléptéket](#).

## 6. Mit jelent, hogy az erő kötött vektor, és merre tolható el merev testen?

Nem helyezhető át a sík vagy a tér tetszőleges pontjába. Lásd [az eredőt és a kölcsönösséget](#).

Merev testen csak a saját hatásvonala mentén tolható el, mert így a hatása nem változik.

■ A tankönyv alapján

## 7. Mi az eredő, és mit jelent a kölcsönösség?

Az eredő az az egyetlen erő, amely több erő együttes hatását helyettesíti. A kölcsönösség szerint ha egy test hat a másikra, a másik is hat az elsőre; a két erő különböző testekre hat. Lásd [az eredőt és a kölcsönösséget](#).

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>