🔖 Tankönyv: 1.4.5. Erő és nyomaték összetétele és 1.4.6. Erő pontra redukálása, 23-24. oldal

> ⚡ **Röviden**
>
> - Egy F erő és egy M nyomaték együtt egyetlen, ugyanakkora és ugyanolyan irányú S erővel helyettesíthető, amelynek hatásvonala $a = M/F$ távolsággal eltolódik; arra az oldalra, ahol S az eredeti pont körül az M forgásirányában forgat.
> - A **pontra redukálás** a fordított művelet: az F erő helyettesíthető egy kiválasztott pontban ható $S = F$ erővel és egy $M = F \cdot a$ nyomatékkal, ahol a a pont és az eredeti hatásvonal merőleges távolsága; M az erő nyomatéka erre a pontra.
> - Több erő redukálásakor S az erők összege (egyirányú párhuzamos erőknél a nagyságuk összege), M az erők nyomatékának előjeles összege a kiválasztott pontra.
> - Példák: $2{,}5\ \mathrm{N}$ és $15\ \mathrm{N \cdot m}$ helyett egyetlen $2{,}5\ \mathrm{N}$-os erő $6\ \mathrm{m}$-rel eltolva; $44\ \mathrm{N}$ a sarokpont fölött $0{,}75\ \mathrm{m}$-rel: $S = 44\ \mathrm{N}$ és $M = +33\ \mathrm{N \cdot m}$ a sarokban; 6 és $2\ \mathrm{N}$ a középpontra: $S = 8\ \mathrm{N}$, $M = -9{,}6\ \mathrm{N \cdot m}$.

A forgatónyomatéknál láttuk, hogy egy erő nyomatéka attól függ, melyik pontra számoljuk, az erőpár nyomatéka viszont minden pontra ugyanaz. Erre a két tényre épül ez a lap: egy erőt és egy nyomatékot össze lehet vonni egyetlen erővé, és egy erőt át lehet vinni egy másik pontba, ha mellé odaírjuk a nyomatékát. A tartószerkezetek számításában így visszük át a terheket egy keresztmetszet sarkára vagy középpontjára.

💡 gépi magyarázat


Erő és nyomaték helyettesítése egyetlen erővel


🗓️ Óra: okt.

Feladat: egy I alakú keresztmetszet szimmetriatengelyén felfelé hat egy $F = 2{,}5\ \mathrm{N}$ erő, és ugyanerre a testre egy $M = 15\ \mathrm{N \cdot m}$ nagyságú, az óramutató járásával ellentétesen forgató nyomaték is hat. Helyettesítsük a kettőt egyetlen S erővel!

Az ötlet. Az M nyomatékot gondolatban egy erőpárral rajzoljuk fel, amelynek mindkét ereje $S = F$ nagyságú: egy lefelé ható S az F hatásvonalán, és egy felfelé ható S tőle a távolságra. Az erőpár nyomatéka $S \cdot a$, ennek kell M-mel egyenlőnek lennie. Az F és a lefelé ható S egy hatásvonalon fekszik, egyenlő nagyságú és ellentétes irányú: kioltják egymást, elhagyhatók. Egyetlen erő marad: a felfelé ható S, a távolsággal eltolva.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket





$$M = F \cdot a = S \cdot a, \qquad a = \frac{M}{F}.$$

Számítás:

$$S = F = 2{,}5\ \mathrm{N}, \qquad a = \frac{M}{F} = \frac{15\ \mathrm{N \cdot m}}{2{,}5\ \mathrm{N}} = 6\ \mathrm{m}.$$

A mértékegység is ellenőriz: $\mathrm{N \cdot m}$ osztva N-nal métert ad.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Melyik oldalra toljuk? Az eltolt S-nek az eredeti tengely körül ugyanabban az irányban kell forgatnia, mint M-nek. Itt M az óramutató járásával ellentétes, S felfelé hat, ezért a tengelytől **jobbra** kell kerülnie: a tengelytől jobbra felfelé toló erő az óramutató járásával ellentétesen forgat. Ha M az óramutató járásával egyezően forgatna, S balra kerülne.

💡 gépi magyarázat

Az egyetlen S erő tehát ugyanakkora erővel tolja a testet ($2{,}5\ \mathrm{N}$ felfelé), és ugyanannyira forgatja az eredeti tengely körül ($2{,}5\ \mathrm{N} \cdot 6\ \mathrm{m} = 15\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$), mint az F és az M együtt. Általánosan: **egy erő és egy nyomaték egy eltolt helyzetű erővel helyettesíthető, azzal egyenértékű.**

📗 A tankönyv alapján

Erő redukálása egy sarokpontra


🗓️ Óra: 🕓 okt.


Az előző művelet fordítottja a **pontra redukálás**: egy erőt egy kiválasztott pontba helyezünk át. Az erő ott változatlan nagyságú és irányú S erőként hat, de mellé egy nyomatékot is oda kell írni, különben elveszne a forgató hatása. Ez a nyomaték az eredeti erő nyomatéka a kiválasztott pontra.

📗 A tankönyv alapján

Feladat: egy $1{,}5\ \mathrm{m}$ széles és $2{,}25\ \mathrm{m}$ magas $ABCD$ téglalap (A a bal felső, D a jobb felső, B a bal alsó, C a jobb alsó sarok) fölött $F = 44\ \mathrm{N}$ vízszintes erő hat jobbra; hatásvonala $0{,}75\ \mathrm{m}$-rel az A sarok fölött halad. Redukáljuk az erőt az A sarokpontra!

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket





Megoldás. Az A pontban ható erő ugyanakkora és ugyanolyan irányú, mint az eredeti: $S = F = 44\ \mathrm{N}$, jobbra. A nyomaték az F erő nyomatéka A-ra; az erőkar a hatásvonal és A távolsága, $a = 0{,}75\ \mathrm{m}$. Az A fölött jobbra húzó erő az óramutató járásával egyezően forgat, ezért a nyomaték pozitív:

$$M = F \cdot a = 44\ \mathrm{N} \cdot 0{,}75\ \mathrm{m} = +33\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}.$$

Szövegesen: az eredeti erő helyett az A sarokban egy $44\ \mathrm{N}$-os, jobbra mutató erő és egy $33\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$-es, az óramutató járásával egyezően forgató nyomaték hat. A téglalap mérete ($1{,}5\ \mathrm{m}$ és $2{,}25\ \mathrm{m}$) ehhez a sarokhoz nem kell; egy másik sarokra redukálva viszont már igen.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Visszafelé is működik:** a $44\ \mathrm{N}$-os S és a $33\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$-es M az előző rész szabályával újra egyetlen erővé vonható össze: $a = M/S = 33/44 = 0{,}75\ \mathrm{m}$. Az óramutató járásával egyező M-hez a jobbra húzó erőnek A **fölé** kell kerülnie, vagyis pontosan vissza az eredeti hatásvonalra.
>
> 💡 gépi magyarázat


Két erő redukálása a középpontra

🗓️ Óra: | okt.

Feladat: egy $3{,}4\ \mathrm{m}$ széles téglalap két oldalán kívül két függőleges, lefelé ható erő hat: $F_1 = 6\ \mathrm{N}$ a bal éltől $0{,}9\ \mathrm{m}$-re balra, $F_2 = 2\ \mathrm{N}$ a jobb éltől $1{,}3\ \mathrm{m}$-re jobbra. Redukáljuk az erőket a téglalap középpontjára!

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Megoldás. Több erőnél a redukált S erő az erők összege; a két erő párhuzamos és egyirányú, ezért a nagyságuk összeadódik:

$$S = F_1 + F_2 = 6\ \mathrm{N} + 2\ \mathrm{N} = 8\ \mathrm{N}\ (\text{lefelé}).$$

A nyomaték a két erő nyomatékának előjeles összege a középpontra. A középpont mindkét éltől $3{,}4 : 2 = 1{,}7\ \mathrm{m}$-re van, így az erőkarok $0{,}9 + 1{,}7 = 2{,}6\ \mathrm{m}$ és $1{,}7 + 1{,}3 = 3\ \mathrm{m}$. A középponttól balra lefelé nyomó F_1 az óramutató járásával ellentétesen forgat (negatív), a jobbra eső F_2 egyezően (pozitív):

$$M = -F_1 \cdot 2{,}6\ \mathrm{m} + F_2 \cdot 3\ \mathrm{m}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$M = -6\ \mathrm{N} \cdot 2{,}6\ \mathrm{m} + 2\ \mathrm{N} \cdot 3\ \mathrm{m}$$

$$M = -15{,}6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} + 6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = -9{,}6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}.$$

Szövegesen: a két erő helyett a középpontban egy $8\ \mathrm{N}$-os, lefelé ható erő és egy $9{,}6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$-es, az óramutató járásával ellentétesen forgató nyomaték hat.

> **Hol van a két erő eredője?** Az első rész szabályával a középpontban ható S és M egyetlen erővé vonható össze: $a = M/S = 9{,}6\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} : 8\ \mathrm{N} = 1{,}2\ \mathrm{m}$. Az óramutató járásával ellentétes nyomatékhoz a lefelé ható erőnek a középponttól **balra** kell kerülnie, tehát az eredő a középponttól $1{,}2\ \mathrm{m}$-re balra hat. Ez érthető: a nagyobb, $6\ \mathrm{N}$-os erő van a bal oldalon, ezért az eredő hozzá esik közelebb.
>
> 💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Egy testre F = 4 N felfelé ható erő és M = 10 N·m nyomaték hat. Mekkora egyetlen erővel helyettesíthetők, és mennyivel kell eltolni?

2. Mit kell a kiválasztott pontba írni, ha egy erőt pontra redukálunk?

3. Egy 20 N-os, jobbra mutató vízszintes erő hatásvonala 0,5 m-rel egy pont fölött halad. Mi az erő redukáltja erre a pontra?

4. Miért kell a nyomatékot is odaírni, ha egy erőt egy másik pontba helyezünk át?

5. Két lefelé ható erő, 6 N és 2 N, egy pont két oldalán, 2,6 m-re balra és 3 m-re jobbra hat. Mekkora a redukált erő és nyomaték erre a pontra?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a két erő középpontra redukálásának feladatában a $2\ \mathrm{N}$-os erő a téglalap jobb élétől $1{,}3\ \mathrm{m}$-re hat, így a középpontra az erőkarja $1{,}7 + 1{,}3 = 3\ \mathrm{m}$. Addig is ezt a méretet használd.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Egy testre F = 4 N felfelé ható erő és M = 10 N·m nyomaték hat. Mekkora egyetlen erővel helyettesíthetők, és mennyivel kell eltolni?

$S = F = 4\ \mathrm{N}$, felfelé, és $a = M/F = 10\ \mathrm{N \cdot m} : 4\ \mathrm{N} = 2{,}5\ \mathrm{m}$-rel kell eltolni; arra az oldalra, ahol az eltolt erő az M irányában forgat. Lásd az összetételt.

2. Mit kell a kiválasztott pontba írni, ha egy erőt pontra redukálunk?

Egy ugyanakkora és ugyanolyan irányú S erőt, és egy M nyomatékot, amely az eredeti erő nyomatéka erre a pontra. Lásd a sarokpontra redukálást.

3. Egy 20 N-os, jobbra mutató vízszintes erő hatásvonala 0,5 m-rel egy pont fölött halad. Mi az erő redukáltja erre a pontra?

$S = 20\ \mathrm{N}$ jobbra, és $M = 20\ \mathrm{N} \cdot 0{,}5\ \mathrm{m} = +10\ \mathrm{N \cdot m}$, mert a pont fölött jobbra húzó erő az óramutató járásával egyezően forgat. Lásd a sarokpontra redukálást.

4. Miért kell a nyomatékot is odaírni, ha egy erőt egy másik pontba helyezünk át?

Mert az áthelyezett erőnek a hatásvonala más, így a forgató hatása megváltozna. A hozzáírt nyomaték pótolja a különbséget, így a test összes külső hatása változatlan marad. Lásd a pontra redukálást.

💡 gépi magyarázat

5. Két lefelé ható erő, 6 N és 2 N, egy pont két oldalán, 2,6 m-re balra és 3 m-re jobbra hat. Mekkora a redukált erő és nyomaték erre a pontra?

$S = 8\ \mathrm{N}$ lefelé, $M = -6 \cdot 2{,}6 + 2 \cdot 3 = -9{,}6\ \mathrm{N \cdot m}$. Lásd a két erő redukálását.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/