



A fejezet két témakörének < Röviden dobozai egy helyen - dolgozat előtti átnézéshez. A részleteket, a példákat és a magyarázatokat a témakör-oldalakon találod.

SI mértékegység-rendszer

- Az **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) a világon egységesen használt mértékegység-rendszer; hét alapmennyiségre épül.
- A hosszúság mért értéke **mérőszám és mértékegység** együtt: **$l = 2,5 \text{ m}$** .
- A hét alapmennyiség: hosszúság (m), tömeg (kg), idő (s), termodinamikai hőmérséklet (K), anyagmennyiség (mol), áramerősség (A), fényerősség (cd).
- A kelvinben kifejezett hőmérséklet mérőszáma a Celsius-fokban kifejezett érték + **273,15**; az órai **273** kerekítés. Fahrenheitre a Celsius-fokban megadott mérőszámot 1,8-del szorozzuk, majd 32-t adunk hozzá.
- A tömeg szokásos jele kis ***m***; a fűzet nagy M-je helyett itt ezt használjuk.

 Codex® magyarázata

 Részletesen: [SI mértékegység-rendszer](#)

Mértékegység-átváltás

- Az egymás többszöröseiként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre **szorzunk**, kisebbről nagyobbra **osztunk**. A hőmérsékleti skálák külön kezelendők.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- **$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$** , és a kelvinben megadott mérőszám a Celsius-fokban megadottnál 273,15-tel nagyobb; az órai 273 kerekítés.
- Az előtag megmondja a szorzót: kilo = 1000-szeres, deci = tized, centi = század, milli = ezred rész.

- A füzet feladattípusa: átváltási sorok. A végén ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

➔ Részletesen: [Mértékegység-átváltás](#)

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
SI	Nemzetközi Mértékegység-rendszer, hét alapmennyiségre épül	SI
fizikai mennyiség	amit mérünk, pl. hosszúság (jele <i>l</i>)	SI
mértékegység	amiben mérünk, pl. méter (jele m)	SI
kelvin (K)	a hőmérséklet SI-egysége; a két skála mérőszáma közötti eltérés 273,15	SI
Fahrenheit (°F)	főként az USA-ban használt skála; a Celsius-mérőszámot 1,8-del szorozzuk, majd 32-t adunk hozzá	SI
előtag	a szorzót mutatja: kilo 1000-szeres, deci tized, centi század, milli ezred	Átváltás
váltószám	az egységek nagyságának aránya; egy tízes hosszúságlépésnél 10, a négyzetes egységeknél 100, a köbösekénél 1000	Átváltás
liter	űrtartalom-egység; $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$	Átváltás

A jegyzet Benedek füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>