


Leszámlálás Hányféleképpen?



Leszámlálás

Tankönyv: 1. lecke: Hányféleképpen lehet?, 6-9. oldal; 4. lecke: Folytatjuk az összeszámlálást, 16-17. oldal; 5. lecke: Gyakorlás, 18-19. oldal.

Röviden

- **Helyek módszere:** minden helyre beírod, hányféle elem kerülhet oda, és a számokat **összeszorozod**. Például 4 futóból az első helyre 4-et választhatsz; bárki lett az első, a második helyre mindig 3 marad. A szorzás feltétele, hogy az adott helyre minden korábbi választás után ugyanannyi lehetőség jusson.

© gépi magyarázat

- **Sorbarendezés:** n az elemek száma. n különböző elem sorrendjeinek száma $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ (" n faktoriális"), például 6 futó célba érése $6! = 720$.
Dobogó: csak az első helyeket töltjük ki, 6 indulóból $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
- **Rögzített hely:** oda csak 1 lehetőség jut, ezt töltsd ki először.
- **Esetekre bontás:** válassz egymást nem fedő eseteket, számold külön, és add össze; vagy számold ki az összeset, és vond le a rossz eseteket.
- A tankönyv alapján
- **Párok, ahol a sorrend nem számít:** kézfogás $\frac{n(n-1)}{2}$, egy n csúcsú sokszög átlói $\frac{n(n-3)}{2}$ (átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz) - 2-vel osztunk, mert minden párt kétszer számoltunk. **A kulcskérdés:** ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény? Ha igen, a sorrend számít. Pároknál akkor osztunk 2-vel, ha mindegyiket kétszer számoltuk.

A fejezet összefoglalója: [Összefoglaló: Leszámlálás](#)

A leszámolási feladatokban azt kérdezzük: **hányféleképpen** lehet valamit megcsinálni? Hányféle sorrendben próbálhatunk ki 4 járművet, hány kézfogás van egy társaságban, hány átlója van egy nyolcszögnek. Ilyen kérdés a hétköznapiakban is van: hányféle összeállítást kérhetsz a menüből, hány meccset kell lejátszani egy bajnokságban.

Számjegyekből képzett számokról és kódokról külön oldal szól: [Számok és kódok képzése](#).

Két módszer: fa-diagram és helyek



Óra: 2026-09-03

A lehetőségeket kétféleképpen számolhatjuk meg:

1. **Fa-diagram:** minden lehetőséget végigrajzolunk ágakként, és megszámloljuk az ágak végét. Kis számoknál jó, és látszik belőle, miért annyi.
2. **Helyek módszere:** annyi "üres helyet" rajzolunk, ahány elemet sorba rakunk, és mindegyik alá beírjuk, hányféle elem kerülhet oda, majd **összeszorozzuk**. Például 4 futónál az első helyre 4, a másodikra mindig 3, a harmadikra 2, az utolsóra 1 választás marad. Akárkit választottunk előbb, az adott hely lehetőségeinek száma ugyanannyi: ezért szorozhatunk.

Melyiket válaszd? A fa-diagram akkor jó, ha kevés a lehetőség, vagy ha nem érted még, mi történik: lerajzolva látszik. Nagyobb számoknál a fa túl nagy lenne (6 futónál már 720 ágvég), ilyenkor a helyek módszere a gyors.




© gépi magyarázat

Miért szorzunk? Az első lépés minden választásához ugyanannyi második lépés tartozik, és ez minden további lépésre is igaz. Hétköznapi példa: ha 3-féle pólód és 2-féle nadrágod van, minden pólóhoz mindkét nadrágot felveheted, ez $3 \cdot 2 = 6$ összeállítás. A fa-diagramon ez úgy látszik, hogy minden ágból ugyanannyi újabb ág nő.



© gépi magyarázat




Példa: négy jármű kipróbálása. Ferrari (F), Ducati (D), Mustang (M) és Tesla (T) közül mindegyiket egyszer próbáljuk ki, és a **Ferrarival kezdünk**. Hányféle lehet a sorrend?

$$\underbrace{1}_{\text{F}} \cdot \underbrace{3}_{\text{2. hely}} \cdot \underbrace{2}_{\text{3. hely}} \cdot \underbrace{1}_{\text{4. hely}} = 6$$

Az első hely kötött; utána 3, majd 2, végül 1 jármű közül választhatunk. Tehát **6 sorrend** lehetséges.

A Ferrari az első



Minden út egy sorrendet ad; a négy szint a négy kipróbálási helyet mutatja.

A teljes sorrendet az F-től egy ágvégig haladva olvassuk le. A fa-diagram 6 ágban végződik: 6-féle sorrend ✓. Ha **bármelyik** járművel kezdhetünk, mind a 4 járműből indul egy ilyen fa, ezért $4 \cdot 6 = 24$; a helyek módszerével $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ✓.

Másik példa: 5 ember köszönt fel valakit, és egy megadott ember biztosan az első. A maradék négy ember sorrendje fa-diagrammal vagy a helyek módszerével számolható meg: $1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

A tankönyv alapján

Sorbarendezés és faktoriális

Óra: 2026-09-03

Jelölje n a különböző elemek számát; először pozitív egész n -nel számolunk. Ha **mindegyik** elemet pontosan egyszer sorba rakjuk, az első helyre n -féle, a másodikra $(n - 1)$ -féle elem kerülhet, és így tovább. n különböző elem összes lehetséges sorrendjének száma:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Kiolvasva: " n faktoriális". Például a $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ szorzatot röviden $4!$ -nak írjuk.

Néhány érték: $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$. Megállapodás szerint $0! = 1$. A faktoriális nagyon gyorsan nő: $10! = 3\,628\,800$.

💡 ☹ gépi magyarázat

Táncpárok kialakítása

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa: táncpárok. 5 fiú és 5 lány párban táncol, mindenkinek pontosan egy párja van, minden párban egy fiú és egy lány. Hányféle teljes párosítás lehet? Az első fiú 5 lány közül választhat, a második a maradék 4 közül, és így tovább:

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$$

Összesen **120 párosítás** lehetséges.

Ez azért sorbarendezés, mert a fiúk sorrendje rögzített, és csak azt döntjük el, melyik lány áll melyik fiú mellé - vagyis az 5 lányt rakjuk sorba.

💡 ☹ gépi magyarázat

Futóverseny

📅 Óra: 2026-09-04

Példa: futóverseny. 6 gyerek hányféle sorrendben érhet célba, ha mindenki célba ér, és nincs holtverseny?

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

Tehát **720 sorrend** lehetséges.

Kiválasztás sorrenddel (dobogó)

📅 Óra: 2026-09-04

Ha nem mindenkit rakunk sorba, csak az első néhány helyet töltjük ki, akkor a szorzás korábban megáll.

Példa: dobogó. 6 induló közül hányféle lehet az arany, ezüst, bronz sorrend, ha nincs holtverseny?

$$\underbrace{6}_{\text{arany}} \cdot \underbrace{5}_{\text{ezüst}} \cdot \underbrace{4}_{\text{bronz}} = 120$$

Tehát **120 dobogós sorrend** lehetséges.

✚ ☹ gépi kiegészítés

Itt a sorrend számít: ha Anna arany és Béla ezüst, az más eredmény, mint ha Béla arany és Anna ezüst. Ezért **nem** osztunk semmivel.

💡 ☹ gépi magyarázat

A dobogó $6 \cdot 5 \cdot 4$ szorzatát röviden $6!/3!$ alakban is felírhatjuk. A következő rész megmutatja, hogyan egyszerűsítjük az ilyen törteket.

💡 ☹ gépi magyarázat

Faktoriálisos törtek

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

A faktoriálisos törtekben a szorzatokat egyszerűsíthetjük. A módszer: a nagyobb faktoriális csak addig bontjuk ki, amíg a kisebb meg nem jelenik benne, és azzal egyszerűsítünk.

$$\frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20$$

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 8 \cdot 7 = 56$$

$$\frac{10!}{7! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120$$

Szövegesen: a három tört értéke rendre **20, 56 és 120**. Ellenőrizheted visszaszorzással:

$20 \cdot 3! = 5!$, $56 \cdot 6! = 8!$, $120 \cdot 7! \cdot 3! = 10!$.

💡 ☹ gépi magyarázat

A nevezőben a két faktoriális külön szorzótényező: $7! \cdot 3! = 5040 \cdot 6 = 30\,240$. Mindkettőt a saját tényezőire bontjuk, majd a számlálóval közös tényezőket egyszerűsítjük.

⚠ ☹ gépi javítás

Így nem kell kiszámolni a nagy számokat ($10! = 3\,628\,800$). Az $\frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4$ pont a dobogós gondolat: 5 elemből 2 helyet töltünk ki sorrendben. Ugyanígy a dobogó: $6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{6!}{3!} = 120$.

💡 ☹ gépi magyarázat

Rögzített helyek

Ha valaki biztosan egy adott helyen áll, arra a helyre csak **1** lehetőség jut. A többi helyre a maradék elemek kerülnek.

Két rögzített futó



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa. Hat induló versenyében az egyik adott futó biztosan az 5., a másik biztosan a 6. helyen ér célba. A többi 4 helyre a maradék 4 futó kerül:

$$\underbrace{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{1-4. \text{ hely}} \cdot \underbrace{1 \cdot 1}_{5-6. \text{ hely}} = 24$$

Tehát **24 sorrend** lehetséges.

✚ ☹ gépi kiegészítés

Autóban és asztalnál



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

A megkötések meghatározzák, kik kerülhetnek az egyes helyekre. A két példa ezt mutatja be.

- **Család az autóban:** egy család autóba ül; elől a két szülő (mindkettőnek van jogosítványa, így bármelyikük vezethet), hátul a három gyerek. Hányféleképpen ülhetnek le? Elöl $2 \cdot 1$, hátul $3 \cdot 2 \cdot 1$ lehetőség: $2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12 \checkmark$.
- **Ültetés az asztalnál:** 8 ember ül egy asztal körül; három megadott ember helye rögzített (az asztalfő és a két szomszédja). Hányféleképpen ülhetnek le? A három rögzített helyre $1 \cdot 1 \cdot 1$, a maradék 5 helyre $5! = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 5! = 120 \checkmark$.

Tipp: mindig a megkötött helyeket töltsd ki először, utána a szabadokat. Így nem felejtet el, hogy a rögzített elem már "elfogyott".



☹ gépi magyarázat

Rögzített táncpár



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Rögzített pár. Ha a táncpárok közül egy megadott pár biztosan együtt táncol, csak a maradék 4 fiút és 4 lányt kell párosítani: $4! = 24 \checkmark$.

Rögzített helyek a köszöntésnél

Óra: 2026-09-10

Rögzített személy. Egy ünnepeltet 7 barátja köszönt fel egymás után. Hányféle lehet a sorrend, ha egy megadott barát a 4. akar lenni? Az ő helyére 1 lehetőség jut, a többi helyre a maradék 6 ember kerül, tetszőleges sorrendben:

A tankönyv alapján

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \underbrace{1}_{4. \text{ hely}} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! = 720$$

Tehát **720 sorrend** lehetséges.

Változtassuk meg a megadott barát helyére vonatkozó feltételt:

- **A megadott barát nem akar első lenni.** Az első helyre a másik 6 közül bárki kerülhet, a második helyre újra 6 ember jut (most már ő is állhat ott), onnan egyesével csökken:
 $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4320 \checkmark$.
- **A 4. vagy az utolsó akar lenni.** Mindkét rögzített helyhez 720 sorrend tartozik.

Összesen $2 \cdot 720 = 1440$ sorrend lehetséges. Két, egymást kizáró esetet adunk össze: amikor a 4. helyen áll (720), és amikor az utolsón (szintén 720). Egy sorrendben a megadott barát nem lehet egyszerre a 4. és az utolsó, ezért egyik esetet sem számoljuk kétszer. A következő szakaszban az [esetekre bontást és a rossz esetek kivonását](#) is összevetjük.

+ © gépi kiegészítés

Esetekre bontás és a rossz esetek kivonása

Mit csinálj, ha a feltétel "vagy-vagy" alakú, vagy ha az a könnyebb, amit **nem** szabad?

Két módszer segít a megkötések kezelésében:

1. **Esetekre bontás (összeadás).** A lehetőségeket olyan csoportokra osztjuk, hogy minden lehetőség pontosan egy csoportba kerüljön. Minden csoportot külön megszámlolunk, és az eredményeket **összeadjuk**. Például: "a 4. vagy az utolsó helyen áll" = két csoport,
 $720 + 720 = 1440$.
2. **A rossz esetek kivonása.** Megszámloljuk az összes lehetőséget, és levonjuk belőle azokat, amelyek nem felelnek meg. Például: 7 ember összes sorrendje $7! = 5040$; ebből azok, ahol a megadott ember az első, $6! = 720$; tehát ahol nem ő az első: $5040 - 720 = 4320$. Ellenőrzésként a helyek módszerével is ugyanezt kaptuk: $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4320$.

A tankönyv alapján

Összeadás vagy szorzás? Ha a választások **egymás után** jönnek (első hely **és** második hely **és** ...), és lépésenként ugyanannyi folytatás választható, szorzunk. Ha **egymást kizáró esetek** közül történik valami (**vagy** ez, **vagy** az), összeadunk. Figyelj: a csoportok ne fedjék egymást, különben valamit kétszer számolsz (ilyenkor a [logikai szita](#) segít).

💡 ☹ gépi magyarázat

Párok számolása: kézfogás, bajnokság, átlók

📅 Óra: 2026-09-04

Itt nem sorba rakunk, hanem **párokat** számolunk, és a pár sorrendje nem számít.

Példa: kézfogás. 10 fős társaságban mindenki mindenkivel pontosan egyszer kezet fog. Hány kézfogás van?

Mindenki 9 emberrel fog kezet (önmagával nem), ez $10 \cdot 9 = 90$. De így minden kézfogást **kétszer** számoltunk (Anna-Béla és Béla-Anna ugyanaz), ezért osztunk 2-vel:

$$\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

A **45 kézfogáshoz** 90 kéznyújtás tartozik: minden kézfogásban két ember vesz részt.

Általánosan n ember esetén $\frac{n(n-1)}{2}$ kézfogás van.

💡 ☹ gépi magyarázat

Bajnokság

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa: bajnokság. 9 csapat röplabdabajnokságában mindenki mindenkivel egyszer játszik. Ez ugyanaz, mint a kézfogás:

$$\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

Tehát **36 mérkőzés** lesz.

A $9 \cdot 8$ szorzatban mindegyik csapatpárt kétszer számoljuk, ezért a nevező 2 : $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$.

⚠ ☹ gépi javítás

Ha van visszavágó is, minden párosítás kétszer játszik, ezért nem osztunk 2-vel:

$$2 \cdot 36 = 9 \cdot 8 = 72 \checkmark.$$

Visszavágóval számít, ki a hazai csapat: a "Győr otthon Pécs ellen" más meccs, mint a "Pécs otthon Győr ellen". Ezért itt a sorrend számít, és nem osztunk.

💡 © gépi magyarázat


Kézilabdatorna

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa: kézilabdatorna. 16 csapat 4 csoportban (csoportonként 4 csapat) körmérkőzést játszik: egy csoportban mindenki mindenkivel egyszer találkozik. Csoportonként 2 csapat jut tovább, utána kieséses szakasz jön: a mérkőzés győztese jut a következő fordulóba. Az elődöntők győztesei döntőt, vesztesei bronzmérkőzést játszanak. Hány mérkőzés van összesen?

Szakasz	Számolás	Mérkőzés
csoportkör	$4 \cdot \frac{4-1}{2} = 4 \cdot 6$	24
negyeddöntő (8 továbbjutó)	8 : 2	4
elődöntő (4 csapat)	4 : 2	2
döntő (I-II. hely) és bronzmeccs (III-IV. hely)	1 + 1	2
összesen		32 ✓

Az elődöntők után két külön helyosztó következik: az I-II. helyért zajló döntő és a III-IV. helyért zajló bronzmérkőzés. Mindkettő egy mérkőzés.



A torna összesen **32 mérkőzésből** áll.

A fordulók mérkőzésszámait összeadjuk: $24 + 4 + 2 + 1 + 1 = 32$. A csoportban mindenki mindenkivel játszik, ez kézfogás-feladat. A kieséses szakaszban minden meccsen 2 csapat játszik, ezért a csapatok számát 2-vel osztjuk.

💡 © gépi magyarázat

A nyolcszög átlói


📅 Óra: 2026-09-03

Példa: a nyolcszög átlói. Hány átlója van egy nyolcszögnek?

Az **átló** a sokszög két nem szomszédos csúcsát összekötő szakasz. A szomszédos csúcsokat összekötő szakasz az oldal, nem átló.

💡 © gépi magyarázat

Átlók egy csúcsból



— 5 átló a nem szomszédos csúcsokhoz

- - - 2 oldal a szomszédokhoz: nem átló

Önmagához nem húzunk vonalat: $8 - 3 = 5$.

Összesen: $8 \cdot 5 : 2 = 20$ átló

Jelölje n a sokszög csúcsainak számát; nyolcszögnél $n = 8$. Egy csúcsból önmagához és a két szomszédjához nem húzható átló, tehát $n - 3 = 5$ átló indul minden csúcsból. n csúcsból $n(n - 3)$ átló-végződés van, de minden átlót a két végéről kétszer számoltunk:


$$\frac{n(n - 3)}{2} = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$$

A nyolcszögnek tehát **20 átlója** van.

Két szomszédos csúcsból is behúzhatjuk az öt-öt átlót. A két bal oldali csúcsot A-val és B-vel jelöljük; A-ból folytonos, B-ből szaggatott vonalak indulnak. Így 10 különböző átlót látunk a 20-ból. A belső kereszteződések nem a nyolcszög csúcsai.

💡 ☹ gépi magyarázat

Átlók két szomszédos csúcsból



A-ból: 5 folytonos átló

B-ből: 5 szaggatott átló

Ez 10 a nyolcszög 20 átlójából.

Két szomszédos csúcsból 10 különböző átlót húztunk be a 20-ból.

A **konvex** sokszögnek nincs befelé nyúló csúcsa: minden átlója az alakzaton belül halad. Ilyen nyolcszögben az egy csúcsból húzott öt átló hat háromszögre bontja az alakzatot. Az egy csúcsból húzott öt átló és a két szomszédos csúcsból húzott tíz átló is csak része az összesen húsz átlónak. Tízszög esetén minden csúcsból 7 átló indul, $\frac{10 \cdot 7}{2} = 35$ átló.

 A tankönyv alapján

A kézfogás és az átló ugyanaz a gondolat: n elemből a párokat számoljuk, és 2-vel osztunk, mert a pár sorrendje nem számít. A kézfogásnál minden pár számít ($\frac{n(n-1)}{2}$), az átlóknál a szomszédos csúcspárok (az oldalak) nem. Ellenőrzés: a nyolcszögnek $\frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ csúcspárja van, ebből 8 az oldal, $28 - 8 = 20$ az átló ✓.

💡 ☹ gépi magyarázat

A szabályos 11-szög átlói

📅 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-15)

Az átlók számát megadó $n(n-3)/2$ képlet a szabályos 11-szögre:

$$\frac{11 \cdot (11 - 3)}{2} = \frac{11 \cdot 8}{2} = 44$$

A szabályos 11-szögnek **44 átlója** van.

✚ ☹ gépi kiegészítés

A szabályosság az átlók számát nem befolyásolja: bármely 11-szögnek 44 átlója van, mert a csúcspárokat számoljuk.

💡 ☹ gépi magyarázat

A párok számolása gráffal is ábrázolható: lásd [Gráfok](#).

Ismétlődő betűk és irányított üzenetek

📅 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-15)

Betűsoroknál először tisztázni kell, mely jelekből hány darabot rendezünk sorba, és megkülönböztetjük-e az azonos betűket.

💡 ☹ gépi magyarázat

Példa az azonos betűkre: két A és két B felhasználásával a különböző betűsorok: AABB, ABAB, ABBA, BAAB, BABA, BBAA. Ha a négy betűpéldányt különbözőnek tekintenénk, $4! = 24$ sorrendet kapnánk. Az A-k cseréje és a B-k cseréje is ugyanazt a betűsort adja, ezért minden betűsort $2 \cdot 2 = 4$ -szer számolnánk. A különböző betűsorok száma $24 : 4 = 6$. További példák: [Számok és kódok képzése](#).

💡 ☹ gépi magyarázat

Példa: üzenetek egy tízfős társaságban. Egy tízfős társaságban (például egy nagy családban) mindenki mindenkinek küld egy üzenetet. a) Hány üzenetet kap egy ember? b) Összesen hány üzenetet küldenek el?

📖 A tankönyv alapján


- a) Mindenki a többi 9 embertől kap egy-egy üzenetet: **9** üzenetet.
- b) Mind a 10 ember 9 üzenetet küld: $10 \cdot 9 = 90$ üzenet. Itt **nem** osztunk 2-vel, mert az üzenetnek iránya van: az A-tól B-nek és a B-től A-nak küldött üzenet két külön üzenet. A kézfogásnál viszont ugyanez a két ember csak egy kézfogás, ott ezért osztunk 2-vel.

+ © gépi kiegészítés

Melyik módszert mikor?

Számít a sorrend? Cseréld fel a két embert!


Dobogó · 6 induló



Más eredmény: a sorrend számít

$$6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$$

Kézfogás · 10 ember



Ugyanaz: a sorrend nem számít

$$10 \cdot 9 : 2 = 45$$

A legfontosabb kérdés mindig ez: **ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény?** Ha igen, a sorrend számít. Ha párokat számolsz, és minden párt mindkét sorrendben felsoroltál, 2-vel kell osztani.

Mit kérdez a feladat?	Képlet (számít a sorrend?)	Példa
mind az n különböző elemet sorba rakjuk	$n!$ (igen)	6 futó célba érése: 720
csak az első néhány helyet töltjük ki	$n \cdot (n - 1) \cdot \dots$, amíg a helyek tartanak (igen)	dobogó 6 indulóból: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$
egy vagy több hely rögzített	a rögzített helyre 1, a többire a maradék (igen)	7 ember, egy középén: $6! = 720$
párokat számolunk	$\frac{n(n-1)}{2}$ (nem)	10 fő kézfogásai: 45
a sokszög átlói	$\frac{n(n-3)}{2}$ (nem)	nyolcszög: 20

💡 © gépi magyarázat

Mire figyelj?

Tipikus hibák.

- **Elfelejtett osztás.** Kézfogásnál, egyszeri körmérkőzésnél, átlóknál minden párt kétszer számoltál, ezért osztani kell 2-vel.
- **Fölösleges osztás.** Dobogónál, sorrendnél, visszavágós bajnokságnál a sorrend számít, ott nem osztunk.
- **Szorzás a feltételek vizsgálatával nélkül.** Ellenőrizd, hogy az adott helyre mindig ugyanannyi választás marad-e. Négy futóból például bárki lett az első, a második helyre mindig 3 marad. Ha a maradék lehetőségek száma attól függ, kit választottál korábban, bontsd a feladatot esetekre.
- **A rögzített elem "kétszer" szerepel.** Ha valaki fix helyen áll, a többi helyre már nélküle kell számolni.
- **Ellenőrzés kis számokkal:** 3 emberre a kézfogás-képlet $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$; ez lerajzolva is 3 (egy háromszög oldalai). A kis eset segíthet hibát találni, de nem bizonyítja az általános képletet. A bizonyítás itt az, hogy minden párt pontosan kétszer számolunk.

💡 © gépi magyarázat

Összefoglalás: a feladatok eredményei

 Óra: 2026-09-03, 2026-09-04, ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10), 2026-09-10, ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-15)

Feladat és feltétel	Eredmény
4 jármű, a Ferrari az első; illetve bárki lehet az első	6; illetve 24 sorrend
6 futó teljes sorrendje	720 sorrend
6 futó, két futó helye külön-külön rögzített	24 sorrend + 🤖 gépi kiegészítés
6 induló első három helyezettje, holtverseny nélkül	120 dobogós sorrend + 🤖 gépi kiegészítés
5 fiú és 5 lány teljes párosítása; egy pár rögzített	120; illetve 24 párosítás
2 szülő elöl, 3 gyerek hátul az autóban	12 elhelyezkedés
8 ember az asztalnál, három megadott ember rögzített helyen	120 ültetés
7 köszöntő, egy megadott ember rögzített helyen	720 sorrend
7 köszöntő, a megadott ember nem lehet első	4320 sorrend
7 köszöntő, a megadott ember a 4. vagy az utolsó	1440 sorrend + 🤖 gépi kiegészítés
Faktoriális törtek	$5!/3! = 20$; $8!/6! = 56$; $10!/(7! \cdot 3!) = 120$
10 ember, minden pár egyszer fog kezét	45 kézfogás
9 csapat, minden pár egyszer játszik; visszavágóval	36; illetve 72 mérkőzés
16 csapatos torna 4 csoporttal, csoportonként 2 továbbjutóval, kieséses folytatással és bronzmérkőzéssel	32 mérkőzés
Nyolcszög	20 átló
Szabályos 11-szög	44 átló + 🤖 gépi kiegészítés
Két azonos A és két azonos B betű sorrendjei	6 betűsor 💡 🤖 gépi magyarázat
10 fős társaság, mindenki mindenkinek küld egy üzenetet	egy ember 9-et kap; összesen 90 üzenet + 🤖 gépi kiegészítés



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből válaszolni, aztán nyisd le a megoldást.

1. Mit jelent az $n!$ jel, és mennyi a $4!$?
2. Miért osztunk 2-vel a kézfogásnál, és miért nem a dobogónál?
3. Hányféle sorrendben ülhet le 5 ember 5 székre?

4. Hány kézfogás van egy 6 fős társaságban, ha minden pár pontosan egyszer fog kezét?
5. Hány átlója van egy hatszögnek?
6. Egy 8 fős versenyen hányféle lehet az első három helyezett sorrendje, ha nincs holtverseny?
7. 5 barát mindegyike mindegyiknek küld egy üzenetet (egy üzenet egy embertől egy másiknak megy). Hány üzenet megy el?
8. 5 ember áll sorba, és egy megadott ember nem állhat az első helyen. Hányféle a sorrend? Oldd meg kétféleképpen!

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a 9 csapatos, visszavágó nélküli bajnokság mérkőzéseinek száma $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$; a faktoriálisos tört nevezője $7! \cdot 3! = 30\,240$. A számolásnál az itt bemutatott helyes lépéseket használd.
2. **Mely betűkből kellett betűsört kirakni az ismétlődő betűs feladatban?** A gyakorló feladat azonos betűket tartalmazó betűsor sorrendjeit kérdezte, de nem olvasható biztosan, mely betűkből hány darab volt. Írd meg a betűket és a darabszámukat; addig a fenti, két A-s és két B-s mintapéldán gyakorolj.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent az $n!$ jel, és mennyi a $4!$?

" n faktoriális": $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$, vagyis n különböző elem sorrendjeinek száma.
 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

2. Miért osztunk 2-vel a kézfogásnál, és miért nem a dobogónál?

A kézfogásnál minden párt kétszer számoltunk (Anna-Béla és Béla-Anna ugyanaz), a pár sorrendje nem számít. A dobogónál a sorrend számít (arany vagy ezüst), ezért nem osztunk.

3. Hányféle sorrendben ülhet le 5 ember 5 székre?

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

4. Hány kézfogás van egy 6 fős társaságban, ha minden pár pontosan egyszer fog kezét?

$$\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

5. Hány átlója van egy hatszögnek?

$$\frac{6 \cdot (6-3)}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$$

6. Egy 8 fős versenyen hányféle lehet az első három helyezett sorrendje, ha nincs holtverseny?

$$\text{A sorrend számít: } 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

7. 5 barát mindegyike mindegyiknek küld egy üzenetet (egy üzenet egy embertől egy másiknak megy). Hány üzenet megy el?

Itt számít, ki küldi és ki kapja, ezért nem osztunk: $5 \cdot 4 = 20$. (Ha kézfogás lenne, $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ lenne.)

8. 5 ember áll sorba, és egy megadott ember nem állhat az első helyen. Hányféle a sorrend? Oldd meg kétféleképpen!

Helyek módszerével: $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 96$. A rossz esetek kivonásával: az összes sorrend $5! = 120$, ebből ő az első $4! = 24$ esetben, így $120 - 24 = 96$. Lásd: [Esetekre bontás és a rossz esetek kivonása](#).

 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>