



Összefoglaló: Leszámlálás

A Leszámlálás fejezet rövid változata: a két témakör-oldal $\nearrow$ Röviden doboza egy helyen, dolgozat előttre. A részletek, a kidolgozott feladatok és a magyarázatok a témakör-oldalakon vannak.

Leszámlálás

- **Helyek módszere:** minden helyre beírod, hányféle elem kerülhet oda, és a számokat **összeszorod**. Az adott hely lehetőségeinek száma ne függjön attól, melyik korábbi megengedett választást tetted.
💡 Groot® magyarázata
- **Sorbarendezés:** n az elemek száma. n különböző elem sorrendjeinek száma $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ (" n faktoriális"), például 6 futó célba érése $6! = 720$.
Dobogó: csak az első helyeket töltjük ki, 6 indulóból $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
- **Rögzített hely:** oda csak 1 lehetőség jut, ezt töltsd ki először.
- **Esetekre bontás:** válassz egymást nem fedő eseteket, számold külön, és add össze; vagy számold ki az összeset, és vond le a rossz eseteket.
📖 A tankönyv alapján
- **Párok, ahol a sorrend nem számít:** kézfogás $\frac{n(n-1)}{2}$, egy n csúcsú sokszög átlói $\frac{n(n-3)}{2}$ (átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz) - 2-vel osztunk, mert minden párt kétszer számoltunk.
- **A kulcskérdés:** ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény? Ha igen, a sorrend számít, nem osztunk; ha nem, párok esetén 2-vel osztunk.

➔ Részletesen: [Leszámlálás](#)

Számok és kódok képzése

- **Helyek módszere:** minden számjegy egy hely; mindegyik alá beírod, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorod.
- **Ismétléssel** (számzár, PIN-kód) minden helyre ugyanannyi jut: a 4 kerekű számzár $10^4 = 10\,000$ -féle; általában n^k , ahol n a választható jelek száma, k a helyek száma, és mindegyik helyen ugyanazok a jelek megengedettek.
 + Opus® kiegészítése
- **Ismétlés nélkül:** a négyjegyű számzárkódban, ahol nulla is állhat elől, helyenként eggyel kevesebb számjegy választható: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$.
- **Többjegyű természetes szám nem kezdődhet 0-val**, ezért az első helyre 9 számjegy jut: négyjegyű szám $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ van. Kódnál a 0 elől is állhat.
- **Tipp:** a megkötött helyet (például az első helyet) töltsd ki először.

➔ Részletesen: [Számok és kódok képzése](#)

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
fa-diagram	minden lehetőséget ágakként rajzolunk le, és megszámloljuk az ágak végét	Leszámlálás
helyek módszere	minden helyre beírjuk, hányféle elem kerülhet oda, és összeszorozzuk	Leszámlálás
faktoriális ($n!$)	$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$, vagyis n különböző elem sorrendjeinek száma	Leszámlálás
rögzített hely	olyan hely, ahová csak 1 lehetőség jut	Leszámlálás
esetekre bontás	a lehetőségeket egymást nem fedő csoportokra osztjuk, külön megszámloljuk és összeadjuk  A tankönyv alapján	Leszámlálás
rossz esetek kivonása	az összes lehetőségből levonjuk azokat, amelyek nem felelnek meg  A tankönyv alapján	Leszámlálás
kiválasztás sorrenddel	csak az első néhány helyet töltjük ki (dobogó), a sorrend számít	Leszámlálás
átló	a sokszög két nem szomszédos csúcsát összekötő szakasz	Leszámlálás
kód	jelek sora (számzár, PIN), a 0 elől is állhat	Számok és kódok képzése
ismétléssel	egy számjegy többször is előfordulhat, minden helyre ugyanannyi jut	Számok és kódok képzése
ismétlés nélkül	a már felhasznált számjegy nem választható újra; az első hely nullára vonatkozó korlátozását külön kell kezelni	Számok és kódok képzése

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>