

# HW2 Report

學號：B05902017 系級：資工四 姓名：王盛立

## 1. 請比較你實作的generative model、logistic regression 的準確率，何者較佳？

我的logistic regression的準確率比generative model的準確率高。在logistic regression中，他的sigmoid function讓比較極端的資料能控制在一定的範圍，因此相較於generative的表現要好一些。

	<i>Accuracy(public)</i>	<i>Accuracy(private)</i>
<i>logistic regression</i>	0.86044	0.85566
<i>generative model</i>	0.85050	0.85368

## 2. 請實作特徵標準化(feature normalization)並討論其對於你的模型準確率的影響

我有測驗過不做任何特徵標準化，和將特徵以 $x - \text{mean}(x)/\text{std}(x)$ 的方式還有 $x - \text{min}(x)/\text{max}(x) - \text{min}(x)$ 兩種方式做特徵標準化。如果不做特徵標準化的話，準確率會下降滿多的，做之後會有顯著的改善。其中 $x - \text{mean}(x)/\text{std}(x)$ 會比較好，可能是因為 $x - \text{min}(x)/\text{max}(x) - \text{min}(x)$ 會把特徵壓到0到1間，反而影響到特徵的影響力。

	<i>Accuracy(public)</i>	<i>Accuracy(private)</i>
<i>without feature normalization</i>	0.83417	0.83104
$x - \text{mean}(x)/\text{std}(x)$	0.86044	0.85566
$x - \text{min}(x)/\text{max}(x) - \text{min}(x)$	0.85672	0.85217

## 3. 請說明你實作的best model，其訓練方式和準確率為何？

我將幾個連續數字的feature，例如age、capital gain等等不是只有0跟1的feature去取2到5次方，還有sin,cos,tan等等。一樣用logistic regression去跑，準確率從0.855上升到了0.865。另外我也有試著用neural network的方式去訓練，但最後結果似乎差不多我就沒有放上來了。

	<i>Accuracy(public)</i>	<i>Accuracy(private)</i>
<i>logistic regression</i>	0.86044	0.85566
<i>best model</i>	0.86339	0.85984

## 4. Refer to math problem

令  $x_n$  屬於class  $C_{x_n}$

Its likelihood function is  $P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N) = \pi_{n=1}^N P(x_n) = \pi_{n=1}^N P(C_{x_n})P(x_n|C_{x_n})$

Its log likelyhood fuction is  $\log P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N) =$

$$\sum_{n=1}^N \log P(C_{x_n}) + \sum_{n=1}^N \log P(x_n|C_{x_n}) = \sum_{k=1}^K N_k \log P(C_k) + \sum_{n=1}^N \log P(x_n|C_{x_n}) =$$

$$\sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + \sum_{n=1}^N \log P(x_n|C_{x_n})$$

最大化log likelyhood function就可得likelihood function的最大值，另外我們已知

$$\sum_{k=1}^K \pi_k = 1$$

令  $f = \log P(x_1, x_2, \dots, x_N)$  and  $g = \sum_{k=1}^K \pi_k = 1$

$$\frac{\partial}{\partial \pi_i} f = \frac{\partial}{\partial \pi_i} (\sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + \sum_{n=1}^N \log P(x_n|C_{x_n})) = \frac{\partial}{\partial \pi_i} \sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + 0$$

$$= \frac{\partial}{\partial \pi_i} N_i \log \pi_i = \frac{N_i}{\pi_i}$$

$$\Rightarrow \nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \pi_1} f \\ \frac{\partial}{\partial \pi_2} f \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial \pi_k} f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{N_1}{\pi_1} \\ \frac{N_2}{\pi_2} \\ \vdots \\ \frac{N_k}{\pi_k} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial \pi_i} g = \frac{\partial}{\partial \pi_i} \sum_{k=1}^K \pi_k = \frac{\partial}{\partial \pi_i} \pi_i = 1$$

$$\Rightarrow \nabla g = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \pi_1} g \\ \frac{\partial}{\partial \pi_2} g \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial \pi_k} g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

若假設  $\nabla f = \lambda \nabla g$ ，得

$$\begin{bmatrix} \frac{N_1}{\pi_1} \\ \frac{N_2}{\pi_2} \\ \vdots \\ \frac{N_k}{\pi_k} \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \pi_i = \frac{N_i}{\lambda} \text{ , 且 } \sum_{k=1}^K \pi_k = \sum_{k=1}^K \frac{N_k}{\lambda} = \frac{N}{\lambda} = 1$$

$$\text{可得 } \lambda = N \text{ , 所以 } \pi_i = \frac{N_i}{N}$$

## 2

$$\frac{\partial \log(\det \Sigma)}{\partial \sigma_{ij}} = \frac{1}{\det \Sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma_{ij}} (\sigma_{i1} c_{i1} + \sigma_{i2} c_{i2} + \sigma_{i3} c_{i3} + \dots + \sigma_{ij} c_{ij} + \sigma_{im} c_{im})$$

$$= \frac{1}{\det \Sigma} C_{ij} = \frac{1}{\det \Sigma} \text{adj}(\Sigma)_{ji} = (\Sigma^{-1})_{ji} = e_j \Sigma^{-1} e_i^T$$

### 3

由第一題知log likelihood function為 $\log P(x_1, x_2, \dots, x_N) =$

$$\sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + \sum_{n=1}^N \log P(x_n | C x_n) = \sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + \sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N \ln k \log P(x_n | C_k)$$

$$= \sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + \sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N \ln k \log N(x_n | \mu_k \Sigma)$$

$$\text{令 } a = \sum_{k=1}^K N_k \log \pi_k + \sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N \ln k \log N(x_n | \mu_k \Sigma)$$

$$\frac{\partial a}{\partial \mu_i} = \frac{\partial}{\partial \mu_i} \sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N \ln k \left( -\frac{1}{2} (\mu_k - x_n)^T \Sigma^{-1} (\mu_k - x_n) - \frac{1}{2} \log \det \Sigma - \frac{m}{2} \log 2\pi \right) =$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu_i} \sum_{n=1}^N \ln i \left( -\frac{1}{2} (\mu_i - x_n)^T \Sigma^{-1} (\mu_i - x_n) - \frac{1}{2} \log \det \Sigma - \frac{m}{2} \log 2\pi \right) =$$

$$\sum_{n=1}^N \ln i \left( -\frac{1}{2} 2 \Sigma^{-1} (\mu_i - x_n) \right) = \Sigma^{-1} \left( \sum_{n=1}^N \ln i x_n - \left( \sum_{n=1}^N \ln i \right) \mu_i \right)$$

$$\Rightarrow \left( \sum_{n=1}^N \ln i x_n^T - \left( \sum_{n=1}^N \ln i \right) \mu_i^T \right) \Sigma^{-1} = 0$$

$$\Rightarrow \mu_i = \frac{1}{N_i} \sum_{n=1}^N \ln i x_n$$

$$\frac{\partial a}{\partial \Sigma^{-1}} = \frac{\partial}{\partial \mu_i} \sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N \ln k \left( -\frac{1}{2} (\mu_k - x_n)^T \Sigma^{-1} (\mu_k - x_n) - \frac{1}{2} \log \det \Sigma - \frac{m}{2} \log 2\pi \right) =$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N \ln k \left( -\frac{1}{2} (\mu_k - x_n) (\mu_k - x_n)^T - \frac{1}{2} (-\Sigma) \right) =$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \sum_{n=1}^N (\ln k \Sigma - \ln k (\mu_k - x_n) (\mu_k - x_n)^T) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \left( \left( \sum_{n=1}^N \ln k \right) \Sigma - N_k S_k \right) =$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K (N_k \Sigma - N_k S_k) = \frac{1}{2} (N \Sigma - \sum_{k=1}^K N_k S_k)$$

$$\Rightarrow \Sigma = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^K N_k S_k = \sum_{k=1}^K \frac{N_k}{N} \mathbf{S}_k$$