

FMC III - Trabalho 12

Alexandre Ribeiro

José Ivo

Marina Leite

28 de novembro de 2025

1. Prove que as fbfs a seguir estão corretas.

i) $\{par(a[i]) \wedge (i = j + 1)\} a[j] := a[i] + 1 \{impar(a[i - 1])\}$

1.	$\{impar(se\ i - 1 = j\ \text{então}\ a[i] + 1\ \text{senão}\ a[i - 1])\} a[j] := a[i] + 1 \{impar(a[i - 1])\}$	AAA
2.	$(par(a[i]) \wedge (i = j + 1))$	P
3.	$i = j + 1$	2 Simp
4.	$i - 1 = j$	T
5.	$(i - 1 = j) \rightarrow (impar(a[i] + 1))$	Pré-condição de 1
6.	$par(a[i])$	2 Simp
7.	$impar(a[i] + 1)$	4,5 MP
8.	$impar(se\ i - 1 = j\ \text{então}\ a[i] + 1\ \text{senão}\ a[i - 1])$	4,5,7 T
9.	$(par(a[i]) \wedge (i = j + 1)) \rightarrow impar(se\ i - 1 = j\ \text{então}\ a[i] + 1\ \text{senão}\ a[i - 1])$	2-8 PC
QED		1,9 Conseq.

ii) $\{a[2] = 2 \wedge a[1] = 1\} a[a[2]] := 1 \{\exists z, (a[z] = 1) \wedge (a[2] = z)\}$

1.	$\{\exists z, ((\text{se } z = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[z]) = 1 \wedge (\text{se } 2 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[2]) = z)\} a[a[2]] := 1 \{\exists z, (a[z] = 1 \wedge a[2] = z)\}$	AAA
2.	$(a[2] = 2 \wedge a[1] = 1)$	P
3.	$a[2] = 2$	2 Simp
4.	$a[1] = 1$	2, Simp
5.	$(\text{se } 2 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[2]) = 1$	3, T
6.	$(\text{se } 1 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[1]) = a[1]$	3, T
7.	$(\text{se } 1 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[1]) = 1$	4, 6 T
8.	$((\text{se } 1 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[1]) = 1 \wedge (\text{se } 2 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[2]) = 1)$	4, 5, Conj
9.	$\exists z, ((\text{se } z = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[z]) = 1 \wedge (\text{se } 2 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[2]) = z)$	8, T
10.	$(a[2] = 2 \wedge a[1] = 1) \rightarrow \exists z, ((\text{se } z = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[z]) = 1 \wedge (\text{se } 2 = a[2] \text{ então } 1 \text{ senão } a[2]) = z)$	2-9 PC
QED		1, 10, Conseq.

2. Use o algoritmo de Skolem para transformar a fbf a seguir em uma forma clausal

.

$$\forall x \exists y \exists z [(\neg p(x, y) \wedge q(x, z)) \vee r(x, y, z)].$$

Utilizando o algoritmo de Skolem, teremos:

$$\forall x \exists y \exists z [(\neg p(x, y) \wedge q(x, z)) \vee r(x, y, z)] \equiv$$

$$\forall x [(\neg p(x, f(x)) \wedge q(x, g(x))) \vee r(x, f(x), g(x))] \equiv$$

$$\forall x [(\neg p(x, f(x)) \vee r(x, f(x), g(x)) \wedge q(x, g(x)) \vee r(x, f(x), g(x)))] \equiv$$

3. Encontre uma prova de resolução para mostrar que o conjunto a seguir de cláusulas proposicionais é insatisfatório:

$$\{p \vee q, \neg p \vee r, \neg r \vee \neg p, \neg q\}.$$

1. $p \vee q$ P
2. $\neg p \vee r$ P
3. $\neg r \vee \neg p$ P
4. $\neg q$ P
5. p 1, 4, R
6. r 2, 5, R
7. $\neg p$ 3, 6, R
8. \square 5, 7, R

QED

Como a resolução produziu a cláusula vazia, o conjunto é insatisfável.

4. Calcule a composição $\theta\sigma$ de cada um dos pares de substituições a seguir

$$\theta = \{x/f(z), y/a\}, \sigma = \{z/b\}.$$

1. Aplique σ aos termos (denominadores) de θ . Resulta em

$$\{x/f(z)\sigma, y/a\sigma\} = \{x/f(b), y/a\}$$

2. Exclua quaisquer ligações no formato x_i/x_i do conjunto do Passo 1. Resulta em

$$\{x/f(b), y/a\}$$

3. Exclua qualquer y_i/s_i de σ se y_i for uma variável em $\text{dom}(\theta) = \{x, y\}$.
O conjunto $\sigma = \{z/b\}$. A variável z não pertence ao domínio $\{x, y\}$ de θ .

$$\{z/b\}$$

4. $\theta\sigma$ é a união dos conjuntos construídos dos Passos 2 e 3

$$\theta\sigma = \{x/f(b), y/a, z/b\}$$

Verificação

Para verificar, usaremos o átomo $p(x, y, z)$, pois x, y e z são as variáveis distintas que ocorrem no domínio e contradomínio de θ e σ .
Primeiro cálculo:

$$(p(x, y, z)\theta)\sigma = p(f(z), a, z)\sigma = p(f(b), a, b)$$

Segundo cálculo:

$$p(x, y, z)(\theta\sigma) = p(f(b), a, b)$$

Assim, como os resultados são os mesmos, isso confirma que a composição está correta.

5. Use o algoritmo de unificação de Robinson para encontrar um unificador geral para o conjunto de átomos a seguir.

$$\{p(x, f(x), y), p(x, y, z), p(w, f(a), b)\}.$$

Vamos aplicar o algoritmo ao conjunto $S = \{p(x, f(x), y), p(x, y, z), p(w, f(a), b)\}$.

1. Defina $k = 0$ e $\theta_0 = \epsilon$ e vá para a Etapa 2

$$\theta_0 = \epsilon$$

2. Calcule $S\theta_k$

$$S\theta_0 = S\epsilon = \{p(x, f(x), y), p(x, y, z), p(w, f(a), b)\} \text{ não é um conjunto unitário}$$

2.2 Seja D_k o conjunto de desacordo de $S\theta_k$ e vá para a Etapa 3.

$$D_0 = \{x, w\}$$

3.1 Se D_k contém uma variável v e um termo t , tal que v não ocorre em t , então calcule a composição $\theta_{k+1} = \theta_k\{v/t\}$, defina $k := k + 1$ e vá para o Passo 2

A variável w não ocorre no termo x de D_0 .

$$\text{Coloque } \theta_1 = \theta_0\{w/x\} = \{w/x\}$$

2. Calcule $S\theta_k$

$$S\theta_1 = \{p(x, f(x), y), p(x, y, z), p(x, f(a), b)\}$$

Não é um conjunto unitário

2.2 Seja D_k o conjunto de desacordo de $S\theta_k$ e vá para a Etapa 3. O desacordo ocorre no segundo argumento:

$$D_1 = \{f(x), y, f(a)\}$$

3.1 Se D_k contém uma variável v e um termo t , tal que v não ocorre em t , então calcule a composição $\theta_{k+1} = \theta_k\{v/t\}$, defina $k := k + 1$ e vá para o Passo 2

A variável y não ocorre no termo $f(a)$ de D_1

Coloque $\theta_2 = \theta_1\{y/f(a)\} = \{w/x, y/f(a)\}$

2. Calcule $S\theta_k$

$$S\theta_2 = \{p(x, f(x), f(a)), p(x, f(a), z), p(x, f(a), b)\}$$

Não é um conjunto unitário

2.2 Seja D_k o conjunto de desacordo de $S\theta_k$ e vá para a Etapa 3.

$$D_2 = \{x, a\}$$

3.1 Se D_k contém uma variável v e um termo t , tal que v não ocorre em t , então calcule a composição $\theta_{k+1} = \theta_k\{v/t\}$, defina $k := k + 1$ e vá para o Passo 2

A variável x não ocorre no termo a de D_2

Coloque $\theta_3 = \theta_2\{x/a\} = \{w/a, y/f(a), x/a\}$

2. Calcule $S\theta_k$

$$S\theta_3 = \{p(a, f(a), f(a)), p(a, f(a), z), p(a, f(a), b)\}$$

Não é um conjunto unitário

2.2 Seja D_k o conjunto de desacordo de $S\theta_k$ e vá para a Etapa 3.

$$D_3 = \{f(a), z, b\}$$

3.1 Se D_k contém uma variável v e um termo t , tal que v não ocorre em t , então calcule a composição $\theta_{k+1} = \theta_k\{v/t\}$, defina $k := k + 1$ e vá para o Passo 2

A variável z não ocorre no termo b de D_3

Coloque $\theta_4 = \theta_3\{z/b\} = \{w/a, y/f(a), x/a, z/b\}$

2. Calcule $S\theta_k$

$$S\theta_4 = \{p(a, f(a), f(a)), p(a, f(a), b)\}$$

Não é um conjunto unitário

2.2 Seja D_k o conjunto de desacordo de $S\theta_k$ e vá para a Etapa 3.

$$D_4 = \{f(a), b\}$$

O conjunto D_4 contém apenas a função composta $f(a)$ e a constante b . Logo, S não é unificável.