
3D Surface: Site fraction of MOO4-2 on sublattice 2 in LIQUID
Site fraction of MOO4-2 on sublattice 2 in LIQUID
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of MOO4-2 on sublattice 2 in LIQUID
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Site fraction of MOO4-2 on sublattice 2 in LIQUID
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of MOO4-2 on sublattice 2 in LIQUID
0.56
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38


3D Surface: Site fraction of CS+ on sublattice 1 in LIQUID
Site fraction of CS+ on sublattice 1 in LIQUID
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of CS+ on sublattice 1 in LIQUID
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Site fraction of CS+ on sublattice 1 in LIQUID
1e−5+9.999e−1
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of CS+ on sublattice 1 in LIQUID
9.4
8.5
7.6
6.7
5.8
4.9
4.0


3D Surface: Mole fraction of LIQUID
Mole fraction of LIQUID
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of LIQUID
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of LIQUID
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Mole fraction of LIQUID
0.90
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0.00


3D Surface: Mole fraction of MOO2
Mole fraction of MOO2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of MOO2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of MOO2
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Mole fraction of MOO2


3D Surface: Mole fraction of CS2MOO4_S2
Mole fraction of CS2MOO4_S2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of CS2MOO4_S2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of CS2MOO4_S2
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Mole fraction of CS2MOO4_S2


3D Surface: Mole fraction of CS2MOO4_S1
Mole fraction of CS2MOO4_S1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of CS2MOO4_S1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of CS2MOO4_S1
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Mole fraction of CS2MOO4_S1


3D Surface: Mole fraction of BCC_A2
Mole fraction of BCC_A2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of BCC_A2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of BCC_A2
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Mole fraction of BCC_A2
0.072
0.060
0.048
0.036
0.024
0.012
0.000


3D Surface: Mole fraction of GAS
Mole fraction of GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Mole fraction of GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Mole fraction of GAS


3D Surface: Mole fraction of O in GAS
Mole fraction of O in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of O in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of O in GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Mole fraction of O in GAS
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55


3D Surface: Mole fraction of Cs in GAS
Mole fraction of Cs in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of Cs in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of Cs in GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Mole fraction of Cs in GAS
0.270
0.225
0.180
0.135
0.090
0.045
0.000


3D Surface: Site fraction of MOO3 on sublattice 1 in GAS
Site fraction of MOO3 on sublattice 1 in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of MOO3 on sublattice 1 in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Site fraction of MOO3 on sublattice 1 in GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of MOO3 on sublattice 1 in GAS
0.32
0.28
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00


3D Surface: Site fraction of CS2MOO4 on sublattice 1 in GAS
Site fraction of CS2MOO4 on sublattice 1 in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of CS2MOO4 on sublattice 1 in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Site fraction of CS2MOO4 on sublattice 1 in GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Site fraction of CS2MOO4 on sublattice 1 in GAS
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0


3D Surface: Mole fraction of Mo in GAS
Mole fraction of Mo in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Mole fraction of Mo in GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Mole fraction of Mo in GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Mole fraction of Mo in GAS
0.24
0.21
0.18
0.15
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00


3D Surface: Fraction of CS2MOO4 in total GAS
Fraction of CS2MOO4 in total GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Fraction of CS2MOO4 in total GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Fraction of CS2MOO4 in total GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Fraction of CS2MOO4 in total GAS


3D Surface: Fraction of MOO3 in total GAS
Fraction of MOO3 in total GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Fraction of MOO3 in total GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Fraction of MOO3 in total GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Fraction of MOO3 in total GAS


3D Surface: Fraction of MO in total GAS
Fraction of MO in total GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Fraction of MO in total GAS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Fraction of MO in total GAS
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
1e−14
1
0
−1
Fraction of MO in total GAS


3D Surface: Fraction of CS+ in total liquid
Fraction of CS+ in total liquid
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Chemical potential of O [kJ/mol]
−100
−80
−60
−40
−20
Fraction of CS+ in total liquid
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Fraction of CS+ in total liquid
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Fraction of CS+ in total liquid
0.90
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0.00


3D Surface: Fraction of MOO4-2 in total liquid
Fraction of MOO4-2 in total liquid
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
Temperature [K]
−100
−80
−60
−40
−20
Chemical potential of O [kJ/mol]
Fraction of MOO4-2 in total liquid
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Contour: Fraction of MOO4-2 in total liquid
Temperature [K]
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
Chemical potential of O [kJ/mol]
Fraction of MOO4-2 in total liquid
0.525
0.450
0.375
0.300
0.225
0.150
0.075
0.000