

Programme de réathlétisation d'un syndrome du piriforme

Le programme que nous vous proposons doit être proposé à votre patient en accord avec les autres professionnels prenant en charge cette pathologie et **ne devra en aucun cas se subordonner aux autres traitements mis en place.**

Phase	Durée estimée	Objectifs	Exercices de Renforcement	Exercices de Mobilité	Temps de maintien & Répétitions	Fréquence
1. Phase aiguë – Soulagement de la douleur et activation douce	Semaine 1–2	- Soulager la douleur - Réduire l'inflammation - Mobilité douce	- Pont fessier (activation du bas du dos et des fessiers) : 3x10 - Mini-squats avec écartement des jambes : 3x10 - Clamshell avec bande de résistance (abducteurs) : 3x12	- Étirement du piriforme en position assise (tenir 30 sec chaque côté) : 3x30 sec - Mobilisation douce de la hanche (cercles avec la jambe) : 2x15	10 sec/maintien pour chaque étirement 10–15 répétitions pour les exercices de renforcement	Quotidien
2. Phase de récupération – Activation et renforcement léger	Semaine 2–4	- Renforcer les muscles de la hanche et du tronc - Prévenir les compensations	- Fente avant avec contrôle du genou (engager le fessier) : 3x10 - Squat unilatéral sur banc : 3x8 /jambe - Exercice de planche sur genoux avec rotation : 3x15 sec	- Étirement des adducteurs en position allongée (maintenir 30 sec de chaque côté) : 3x30 sec - Étirement des ischio-jambiers : 3x30 sec - Rotations de hanche debout : 3x15	30 sec maintien pour chaque étirement 10–15 répétitions pour chaque exercice	4x/sem
3. Phase de renforcement fonctionnel – Stabilité et renforcement dynamique	Semaine 4–6	- Stabiliser la région pelvienne et lombaire - Prévenir les compensations fonctionnelles	- Planche latérale avec levée de jambe : 3x12/ côté - Pont avec une jambe levée (exercice de renforcement fessier) : 3x10 /jambe - Squat avec élastique autour des genoux : 3x10	- Étirement dynamique des fléchisseurs de hanche (genou au sol, étirer doucement les hanches) : 3x30 sec - Mobilisations thoraciques (pour améliorer la mobilité du tronc et du bassin) : 3x10	30 sec maintien pour chaque étirement 8–12 répétitions pour les exercices de renforcement	3–4x/sem
4. Phase de retour au sport – Réintégration fonctionnelle	Semaine 6+	- Optimiser la stabilité pelvienne et la fonctionnalité des muscles fessiers - Réintégrer les mouvements sportifs	- Sauts avec contrôle (atterrissage à genoux légèrement fléchis) : 3x10 - Sprints légers avec changements de direction : 3x15m - Fentes pliométriques (avec une poussée dynamique) : 3x8/jambe	- Étirement des fessiers avec flexion de la hanche (maintenir 30 sec) : 3x30 sec - Mobilisations de la hanche en position de pigeon : 3x15	30 sec maintien pour chaque étirement 10–15 répétitions pour chaque exercice	3x/sem

Conseils spécifiques à la prise en charge d'un syndrome du fessier profond

- **Phase 1** : Commencez avec des exercices doux sans douleur. Utilisez la cryothérapie et le repos relatif pour réduire l'inflammation.
- **Phase 2** : Augmentez progressivement la durée des gainages et le nombre de répétitions. Concentrez-vous sur le renforcement du fessier, du tronc, et des abducteurs.
- **Phase 3** : Mettez l'accent sur les exercices fonctionnels en ajoutant des mouvements unilatéraux et des exercices de stabilité dynamique (ex. : exercices sur une jambe).
- **Phase 4** : Réintégrez les mouvements sportifs progressivement et en contrôle. Assurez-vous que la douleur ne dépasse pas 2/10 avant d'augmenter l'intensité