

Programme de réathlétisation d'une tendinopathie des fibulaires

Le programme que nous vous proposons doit être proposé à votre patient en accord avec les autres professionnels prenant en charge cette pathologie et **ne devra en aucun cas se subordonner aux autres traitements mis en place.**

Phase	Durée	Objectifs	Exercices détaillés	Fréquence
1. Soulagement & repos relatif	Semaine 1-2	◆ Diminuer inflammation ◆ Réduire douleur ◆ Préserver mobilité	◆ Glace (cryothérapie) : 15-20 min, 2-3x/jour, sur la face externe de la cheville ◆ Mobilisations douces : cercles de cheville (10 vers chaque côté) ◆ Étirement passif des fibulaires : jambe croisée, pied en inversion (tirer doucement le pied vers l'intérieur) → 3x30 sec ◆ Isométrie en éversion : pied contre un mur ou une bande, pousser sans bouger, tenir 10 sec x 5 répétitions ◆ Massage transverse profond (si toléré)	Étirements : 2-3x/jour Isométrie : quotidien Mobilité : 2x/jour Glace : après activité
2. Renforcement & proprioception de base	Semaine 3-4	◆ Renforcer fibulaires ◆ Récupérer contrôle latéral ◆ Stimuler équilibre	◆ Éversion assise avec bande élastique : fixer une bande autour de l'avant-pied, tirer latéralement (vers l'extérieur) → 3x15 répétitions ◆ Marche sur talons/puis sur pointes : 10-15 mètres, 3 séries, lente et contrôlée ◆ Équilibre sur un pied (sol plat) : 30 sec/3 séries, yeux ouverts puis fermés ◆ Step-ups latéraux : monter latéralement sur une marche, sans rebond (3x10) ◆ Pompes des orteils en pronation : debout, pousser sur l'extérieur du pied pour travailler l'éversion (3x12)	Renforcement : 5x/semaine Équilibre : quotidien Étirements : quotidien
3. Renforcement dynamique & instabilité contrôlée	Semaine 5-6	◆ Renforcement fonctionnel ◆ Proprioception instable ◆ Préparer aux mouvements latéraux	◆ Éversion debout avec bande : debout, tirer pied latéralement contre résistance → 3x12 répétitions ◆ Balance sur coussin instable ou BOSU : maintenir 30 sec sur 1 pied, 3 fois ◆ Sauts latéraux contrôlés (over tape) : petits sauts droite/gauche sur ligne au sol, sans rebond → 3x10 ◆ Travail sur échelle de rythme : pas chassés, croisements, mouvements latéraux ◆ Montées de mollets en pronation : pieds en légère rotation interne, monter lentement (3x15)	Renforcement : 4-5x/semaine Sauts/échelle : 2-3x/semaine Équilibre : quotidien
4. Retour au sport progressif	Semaine 7+	◆ Réhabituer à l'impact ◆ Améliorer réactivité latérale ◆ Prévenir rechute	◆ Footing progressif sur sol souple : commencer à 5-10 min, augmenter de 5 min tous les 2 jours si aucune douleur ◆ Sauts latéraux dynamiques (sur ligne) : 3x15 ◆ Zigzag autour de plots : travail de changements de direction progressifs ◆ Appuis spécifiques (basket, foot, etc.) : pas chassés, freinages, pivots ◆ Renforcement final : combiner exo excentriques, équilibre, saut unipodal, gainage de pied (ex. : serviette à tirer avec les orteils)	Sport : 2-3x/semaine Renforcement : 3x/semaine Proprio : 2-3x/semaine Étirements : quotidien

Conseils spécifiques fibulaires :

- Éviter toute inversion forcée en début de programme.
- Focus sur les exercices d'éversion résistée et d'appuis latéraux.
- Ne pas dépasser un niveau de douleur $> 3/10$ pendant ou après un exercice.
- Progresser selon tolérance du tendon, pas selon une durée fixe.