

Rééducation par la respiration

Exercice autour du diaphragme

a) Ouverture du plexus solaire :

Le patient est assis sur une chaise la partie interne de ses bras coller sur ses flancs il écoute fléchi à 90°.

1er temps : on demande aux patients d'effectuer une inspiration profonde en poussant le plexus solaire vers l'avant tout en amenant les mains et les avant-bras vers l'extérieur (rotation externe des épaules) et les doigts vers l'arrière.

2^{ème} temps : lors de l'expiration maximale le patient ramène ses mains et ses avant-bras vers le centre du corps (rotation interne des épaules), tout en rentrant le plexus solaire vers l'intérieur du corps.




a) Ouverture dorsale :

Le patient est assis sur une chaise il va effectuer une flexion antérieure du tronc de manière à coller la face antérieure du thorax sur ces quadriceps. Il positionne ses mains derrière la tête pour finaliser la flexion antérieure de l'ensemble du haut du corps.

1er temps : on demande aux patients d'effectuer une inspiration profonde en poussant le dos vers le plafond.

2^{ème} temps : lors de l'expiration maximale le patient imagine ramener son dos vers ses cuisses.



b) Ouverture latérale :

Le patient est debout et place latéralement par rapport au mur. Il effectue une abduction du bras (coude fléchi à 90°) et pose son avant-bras sur le mur. La main controlatérale au mur est placée sur la hanche. La jambe côté mur effectue une adduction de hanche, le bord externe du pied (positionné en inversion) est en contact avec le sol.

1er temps : on demande aux patients d'effectuer une inspiration profonde en laissant aller son haut du corps vers le mur.

2^{ème} temps : lors de l'expiration maximale le patient utilise son avant-bras pour repousser et éloigner légèrement le haut du corps du mur.



c) Ouverture de la poitrine :

Le patient est assis sur une chaise ou debout et va croiser ses bras au niveau du plexus solaire y comprimer la base inférieure du thorax.

1er temps : on demande aux patients d'effectuer une expiration maximale tout en enserrant la partie basse de son thorax à l'aide de ses bras croisés.

2^{ème} temps : Tout en gardant la pression de ses avant-bras au niveau de la partie basse du thorax, le patient va effectuer une inspiration profonde en essayant de gonfler la partie haute du thorax.

