

Rééducation du système mandibulaire

Etirement des muscles masticateurs

1. Étirements des muscles masticateurs

- **Objectif :** Soulager les tensions musculaires des masséters et temporaux.
- **Exécution :**
 1. Placer les doigts sur les masséters (à la hauteur des joues, près de l'angle de la mâchoire).
 2. Appliquer une légère pression tout en ouvrant lentement la bouche jusqu'à sentir un étirement.
 3. Maintenir l'étirement pendant 10 secondes, puis refermer doucement la bouche.
 4. Répéter 5 fois.

2. Mobilité contrôlée de l'ATM

- **Objectif :** Réduquer les mouvements d'ouverture et de fermeture mandibulaire.
- **Exécution :**
 1. Placer la pointe de la langue contre le palais, juste derrière les dents supérieures.
 2. Ouvrir lentement la bouche en maintenant la langue en contact avec le palais.
 3. Refermer doucement la bouche.
 4. Répéter 10 fois, en veillant à des mouvements fluides et sans déviation latérale (idéal face à 1 miroir).

3. Proprioception mandibulaire

- **Objectif :** Améliorer le contrôle neuromusculaire de la mâchoire.
- **Exécution :**
 1. Placer un objet fin (comme un bâtonnet ou une cale) entre les incisives supérieures et inférieures.
 2. Pratiquer des mouvements latéraux ou circulaires contrôlés de la mâchoire, sans perdre le contact avec l'objet.
 3. Répéter pendant 1 minute.
 - 4.

4. Renforcement des muscles de la mâchoire

- **Objectif** : Renforcement musculaire et amélioration de la fonction.
- **Exécution** :
 1. Placer la paume de main sur la partie latérale de la mandibule.
 2. Forcer avec la mâchoire contre résistance de la paume de main (5s)
 3. Répéter 5 à 10 répétitions de 5 s
 4. Changer de côté, puis de zone mandibulaire

Conseils pour intégrer ces exercices dans la prise en charge

1. **Évaluer l'entrée manducatrice** lors de l'examen postural global, notamment en recherchant des tensions musculaires ou des mouvements anormaux.
2. **Adapter les exercices** en fonction des symptômes spécifiques et de la tolérance du patient.
3. **Encourager la régularité** : Les exercices doivent être réalisés quotidiennement pour obtenir des résultats optimaux.
4. **Collaborer avec d'autres professionnels** (dentistes, kinésithérapeutes, ostéopathes) si des perturbations importantes sont identifiées.

Ces exercices permettent d'aborder la rééducation de l'entrée manducatrice de manière simple et efficace. Une mâchoire équilibrée contribue à une posture fonctionnelle optimale, essentielle à la performance et à la prévention des blessures.

