

1、 设随机变量X的分布函数为F(x)

随机变量Y服从两点分布：

$$P\{Y = a\} = p, \quad P\{Y = b\} = 1 - p, \quad (0 < p < 1)$$

并且X与Y相互独立，则随机变量
Z=X+Y的分布函数 $F_Z(z)=$ _____

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\}$$

$$= P\{Y = a, X \leq z - a\} + P\{Y = b, X \leq z - b\}$$

$$= P\{Y = a\} \cdot P\{X \leq z - a\} + P\{Y = b\} \cdot P\{X \leq z - b\}$$

$$= pF(z - a) + (1 - p)F(z - b)$$

2、

一盒内装有5个红球和15个白球,从中不放回取10次,每次取一个球,则第5次取球时得到的是红球的概率是 (B)。

(A) $1/5$

(B) $1/4$

(C) $1/3$

(D) $1/2$

3、设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为两个随机变量的分布函数， $F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$

则下列各组数中能使 $F(x)$ 为某随机变量的分布函数的有——~~(B)~~——

$$(A) \quad a = \frac{2}{3}, \quad b = \frac{2}{3} \qquad (B) \quad a = \frac{3}{5}, \quad b = \frac{2}{5}$$

$$(C) \quad a = \frac{3}{2}, \quad b = \frac{1}{2} \qquad (D) \quad a = \frac{3}{4}, \quad b = \frac{2}{5}$$

4、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ae^{-(x+y)}, & 0 < 2x < y < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1)确定常数 a

(2)求 (X, Y) 关于 X 的边沿概率密度；

(3)求 (X, Y) 关于 Y 的边沿概率密度；

(4)求 $P(X \geq 1, Y \geq 2)$

解 (1) 由 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_{2x}^{+\infty} a e^{-(x+y)} dy$

$$= a \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx = a \left(-\frac{1}{3} e^{-3x} \right) \Big|_0^{+\infty} = a \frac{1}{3}$$

得 $a = 3$

(2) 求(X,Y)关于X的边沿概率密度 ;

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$
$$= \begin{cases} \int_{2x}^{+\infty} 3e^{-(x+y)} dy = 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(3)求(X,Y)关于Y的边沿概率密度；

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \begin{cases} \int_0^{\frac{y}{2}} 3e^{-(x+y)} dx = 3e^{-y} (1 - e^{-\frac{y}{2}}), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad P\{X \geq 1, Y \geq 2\} &= \iint_{x \geq 1, y \geq 2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_2^{+\infty} dy \int_1^{\frac{y}{2}} 3e^{-(x+y)} dx = \int_2^{+\infty} 3e^{-y} (e^{-1} - e^{-\frac{y}{2}}) dy \\ &= 3(-e^{-1}e^{-y} + \frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}y}) \Big|_2^{+\infty} = e^{-3} \end{aligned}$$

5、已知二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2xy, 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

试求：（1） $Z=\max(X,Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)$ ；
（2） $Z=\max(X,Y)$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

解（1） $Z=\max(X,Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\max(X,Y) \leq z\}$$

$$= P\{X \leq z, Y \leq z\}$$

$$= \iint_{\substack{x \leq z \\ y \leq z}} f(x,y) dx dy$$

$$= \iint_{\substack{x \leq z \\ y \leq z}} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

$$\begin{aligned} \text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) &= \int_0^z dy \int_{\frac{y}{2}}^z 2xy dx = \int_0^z y(z^2 - \frac{y^2}{4}) dy \\ &= (z^2 \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{16}) \Big|_0^z = \frac{7}{16} z^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } F_Z(z) &= \int_0^z dy \int_{\frac{y}{2}}^1 2xy dx = \int_0^z y(1 - \frac{y^2}{4}) dy \\ &= (\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{16}) \Big|_0^z = \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{16} \end{aligned}$$

当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$

于是

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{7}{16}z^4, & 0 \leq z \leq 1 \\ \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{16}, & 1 < z \leq 2 \\ 1, & z > 2 \end{cases}$$

$Z=\max(X,Y)$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = [F_Z(z)]' = \begin{cases} \frac{7}{4}z^3, & 0 \leq z \leq 1 \\ z - \frac{z^3}{4}, & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

6、设总体X和Y相互独立且都服从正态分布
 $N(0, \sigma^2)$

而 X_1, X_2, \dots, X_9 和 Y_1, Y_2, \dots, Y_9 分别是来自总体X和Y的简单随机样本,试求:

(1) $\sum_{i=1}^9 X_i$ 服从的分布;

(2) $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 Y_i^2$ 服从的分布;

(3) 统计量 $U = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2}}$ 服从的分布;

(4) U^2 服从的分布;

解 (1) 根据题设条件知

$$\sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 9\sigma^2)$$

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{9}} \sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0, 1)$$

$$(2) \quad \frac{Y_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 Y_i^2 = \sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(9)$$

(3) 由t分布的构造方式,得到

$$U = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2}} = \frac{\frac{1}{\sigma\sqrt{9}} \sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 Y_i^2} / 9} \sim t(9)$$

即统计量U服从自由度为9的t分布；

$$(4) \quad U^2 = \frac{(\sum_{i=1}^9 X_i)^2}{\sum_{i=1}^9 Y_i^2} = \frac{(\frac{1}{\sigma\sqrt{9}} \sum_{i=1}^9 X_i)^2}{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^9 Y_i^2 / 9} \sim F(1,9)$$

7、设总体 $X \sim N(0, 3^2)$, $X_1 X_2 \dots X_n$ 为来自 X 的一个样本,

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值。

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

则 $DS^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$$DS^2 = \frac{2\sigma^4}{(n-1)}$$

解： $\frac{(n-1)}{\sigma^2} Z_n = \frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$

$$DZ_n = D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{\sigma^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]$$

$$= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

另外， $EZ_n = E\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{\sigma^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^2}{n-1} \cdot E\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]$

$$= \frac{\sigma^2}{n-1} \cdot (n-1) = \sigma^2$$

8、

设 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体 $N(\mu, 4^2)$ 的样本.

试求:(1) $U = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)$ 服从的分布;

$$N(0,1)$$

(2) $V = \frac{1}{16} \sum_{j=17}^{32} (X_j - \mu)^2$ 服从的分布;

$$\chi^2(16)$$

(3) 令 $Y = \frac{\sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)}{\sqrt{\sum_{j=17}^{32} (X_j - \mu)^2}}$ 求Y服从的分布

$$t(16)$$

解 由条件知, X_1, X_2, \cdots, X_n 相互独立, 同服从分布 $N(\mu, 4^2)$

$$\frac{X_i - \mu}{4} \sim N(0,1) \quad \left(\frac{X_i - \mu}{4}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$(1) \quad U = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu) = \frac{1}{\sqrt{16}} \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \mu}{4}\right) \sim N(0,1)$$

$$(2) \quad \left(\frac{X_i - \mu}{4}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$V = \sum_{j=17}^{32} \left(\frac{X_j - \mu}{4}\right)^2 \sim \chi^2(16)$$

(3) 因为U与V相互独立，由t分布的定义知，

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)}{\sqrt{\sum_{j=17}^{32} (X_j - \mu)^2}} = \frac{U}{\sqrt{V/16}} \sim t(16)$$

9、设总体X的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} \exp\{-\frac{x^2}{\theta}\}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad (\theta > 0)$$

$x_1 x_2 \dots x_n$ 为一组样本值($x_i > 0, i=1, 2, \dots, n$).
 $X_1 X_2 \dots X_n$ 是来自总体X的样本。求参数
 θ 的极大似然估计值和极大似然估计量。

解：似然函数

$$L = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} \exp\{-\frac{x_i^2}{\theta}\} = \prod_{i=1}^n 2x_i \cdot \frac{1}{\theta^n} \exp\{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}\}$$

$$\ln L = \ln \prod_{i=1}^n 2x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{令 } -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\text{得解 } n\hat{\theta} = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{得参数}\theta\text{的极大似然估计值为 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{得参数}\theta\text{的极大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

10、设 X_1, X_2, \cdots, X_n 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

试求：

(1)求 $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 服从的分布； $\overline{X}_n \sim N(\mu, \frac{1}{n} \sigma^2)$

(2)求 $X_{n+1} - \overline{X}_n$ 服从的分布； $X_{n+1} - \overline{X}_n \sim N(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2)$

(3)写出 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$ 服从的分布； $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

(4)求统计量 $Y = \frac{X_{n+1} - \overline{X}_n}{S_n} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 服从的分布；
 $Y \sim t(n-1)$

11、 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本. μ 已知, 下列几个作为 σ^2 的估计量中, 较优的是(C)

$$(A) \quad \hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(B) \quad \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(C) \quad \hat{\sigma}_3^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$(D) \quad \hat{\sigma}_4^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (X_i - \mu)^2$$

12、 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

$$\text{令 } Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad Z_n = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_n)^2 \quad n = 2, 3, \dots$$

试作： (1) 求 EZ_n

(2) 求 DZ_n

(3) 证明：对任何 $\varepsilon > 0$, 成立

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|Z_n - \sigma^2| < \varepsilon\} = 1$$

解

$$(1) \quad Z_n = S^2 \quad EZ_n = ES^2 = \sigma^2$$

(2) 由条件知 ,

$$\frac{(n-1)}{\sigma^2} Z_n = \frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$$DZ_n = D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \cdot \frac{\sigma^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]$$

$$= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

(3) 由切比雪夫不等式有

$$P\left\{|Z_n - \sigma^2| < \varepsilon\right\} = P\left\{|Z_n - EZ_n| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{DZ_n}{\varepsilon^2}$$

所以

$$1 \geq P\left\{|Z_n - \sigma^2| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{2\sigma^4}{\varepsilon^2(n-1)}$$

上式两边取极限，即得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{|Z_n - \sigma^2| < \varepsilon\right\} = 1$$

证毕

14、设随机变量 X 存在数学期望 EX 和方差 $DX \neq 0$, 则对任意正数 ε ,

下列不等式恒成立的是 (D)

$$(A) \quad P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} > \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$(B) \quad P\{|X - EX| < \varepsilon\} < 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$(C) \quad P\{|X| \geq \varepsilon \sqrt{DX}\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$$

$$(D) \quad P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|X|^k}{\varepsilon^k}, \quad (k > 0)$$

证明：

$$P\{|X| \geq \varepsilon\} = \int_{|x| \geq \varepsilon} f(x) dx$$

$$\leq \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{|x|^k}{\varepsilon^k} f(x) dx$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^k} \int_{|x| \geq \varepsilon} |x|^k f(x) dx$$

$$= \frac{E|X|^k}{\varepsilon^k}$$

15、

四个位置：1,2,3,4，在圆周上逆时针排列. 粒子在这四个位置上随机游动. 粒子从任何一个位置, 以 $2/3$ 概率逆时针游动到相邻位置; 以 $1/3$ 概率顺时针游动到相邻位置; 以 $X(n)=j$ 表示时刻 n 粒子处在位置 j ($j=1,2,3,4$)

(1) 写出齐次马尔可夫链

$\{X(n), n=1,2,\dots\}$ 的状态空间;

(2) 求齐次马尔可夫链

$\{X(n), n=1,2,\dots\}$ 的一步状态转移矩

阵) 求条件概率 $P\{X(n+3)=3, X(n+1)=1 \mid X(n)=2\}$

解.

(1)依题意 ,状态空间 $S=\{1,2,3,4\}$

(2)转移概率矩阵

$$P = (p_{ij})_{4 \times 4} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{aligned}& P\{X(n+3) = 3, X(n+1) = 1 \mid X(n) = 2\} \\&= P\{X(n+1) = 1 \mid X(n) = 2\} \\&\quad \cdot P\{X(n+3) = 3 \mid X(n+1) = 1, X(n) = 2\} \\&= P\{X(n+1) = 1 \mid X(n) = 2\} \\&\quad \cdot P\{X(n+3) = 3 \mid X(n+1) = 1\} \\&= p_{21} p_{13}^{(2)} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^4 p_{1k} p_{k3} \\&= \frac{1}{3} \left(0 \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{27}\end{aligned}$$

16、设随机过程 $Y(t)=e^{-tX}$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 X 是在 $(0,1)$ 上服从均匀分布的随机变量。

试求: (1) X 的概率密度 $f_X(x)$

(2) $E[Y(t)]$, $E[Y(t_1) \cdot Y(t_2)]$, $E[(Y(t))^2]$,

(3) $Y(t)$ 是否为广义平稳过程?

解 (1) 由题设条件, 知 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) $Y(t)$ 的均值函数

$$\mu_Y(t) = E[Y(t)] = E[e^{-tX}]$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = \int_0^1 e^{-tx} dx = \frac{1 - e^{-t}}{t}$$

Y(t)的自相关函数

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1) \cdot Y(t_2)]$$

$$= E[e^{-t_1 X} \cdot e^{-t_2 X}]$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t_1+t_2)x} f(x) dx$$

$$= \int_0^1 e^{-(t_1+t_2)x} dx = \frac{1 - e^{-(t_1+t_2)}}{t_1 + t_2}$$

$$E[(Y(t))^2] = \frac{1 - e^{-2t}}{2t}$$

(3) 由 (2) 知Y(t)不是广义平稳过程