

Lecture 3

多元随机变量与分布

ruanyl@buaa.edu.cn

September 2016, Beihang University

二元分布


定义 假设 X, Y 是随机变量. 那么 (X, Y) 的**联合分布或者二元分布**定义为所有如下形式的概率的集合: $P((X, Y) \in C)$ 对任意 $C \subset \mathbb{R}^2$. 其中 $\{(X, Y) \in C\}$ 是 $\{\omega \in S : (X(\omega), Y(\omega)) \in C\}$ 的简写. ω 通常表示一个样本.

二元离散分布

定义 如果联合分布 (X, Y) 的可能取值范围是有限点集或者无穷可数点集, 那么这个分布被称为**离散分布**.

定理 如果 X, Y 是离散随机变量, 那么 (X, Y) 是一个联合离散分布.

例题 投掷两个骰子, 分别用 X 和 Y 表示每个骰子出现的点数. 那么下图则是 (X, Y) 的联合分布的表示. 颜色区域表示事件 $\{X = Y\}$



与一元情形类似, 离散联合分布也有概率函数

定义 如果 (X, Y) 是一个离散联合分布, 那么下面的函数称为其联合概率函数

$$f(x, y) = P(X = x, Y = y).$$

定理 如果 (X, Y) 是一个离散联合分布, 那么其联合概率函数满足

$$\sum_{x,y} f(x, y) = 1$$

并且对任意 $C \subset \mathbb{R}^2$,

$$P((X, Y) \in C) = \sum_{(x,y) \in C} f(x, y).$$

二元连续分布

定义 随机变量 X, Y 称为具有连续联合分布, 如果存在定义在 \mathbb{R}^2 上的非负函数 $f(x, y)$ 使得下面的等式成立,

$$P((X, Y) \in E) = \int \int_E f(x, y) dx dy$$

其中 E 是 \mathbb{R}^2 上的任意有界, 无界, 开或者闭的实数区域. **非负函数** $f(x, y)$ 则称为该连续分布的**密度函数**.

需要注意的是在这个定义中我们并不假定密度函数 $f(x, y)$ 的连续性, 或是有界性.

定理 由概率公理可知, 密度函数应满足

$$\int \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1.$$

定理 假设随机变量 X, Y 具有连续联合分布. 那么

$$P((X, Y) \in C_0) = 0$$

其中 C_0 是 \mathbb{R}^2 上的任何有限点集, 无穷点列或者函数曲线的图集.

例题 假设随机变量 X, Y 的联合分布具有密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试确定常数 c , 并求出 $P(X \geq Y)$.

■ 密度函数在全空间积分应当为 1,

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2}^1 cx^2y dy \right) dx \\ &= c \int_{-1}^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^2x^4}{2} \right) dx \\ &= c \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) = \frac{4c}{21} \end{aligned}$$

因而 $c = 21/4$.

$$P(X \geq Y) = \frac{21}{4} \int_0^1 \left(\int_{x^2}^x x^2y dy \right) dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{21}{4} \int_0^1 \left(\frac{x^2 x^2}{2} - \frac{x^2 x^4}{2} \right) dx \\ &= \frac{21}{8} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = \frac{3}{20} \end{aligned}$$



二元混合分布

定义 假设 X 是离散随机变量, Y 是连续随机变量, 如果存在 \mathbb{R}^2 上的非负函数 $f(x, y)$ 使得下面的积分对任何 $A, B \subset \mathbb{R}$ 都有意义并且成立

$$P(X \in A, Y \in B) = \int_B \sum_{x \in A} f(x, y) dy.$$

累积分布函数

定义 给定概率空间以及概率 P . 该空间上的随机变量 X, Y 的联合分布函数定义为

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \forall x, y.$$

联合分布函数有如下性质

// 如果 X, Y 的分布函数分别记作 $F_X(x), F_Y(y)$, 那么成立

$$F_X(x) = P(X \leq x, Y < \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y),$$

以及

$$F_Y(y) = P(X < \infty, Y \leq y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y).$$

这里 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 分别称为联合分布关于 X 和 Y 的**边际分布**.

$$\text{// } F(\cdot, -\infty) = F(-\infty, \cdot) = 0, F(\infty, \infty) = 1.$$

下面的定理给出了分布函数与密度函数的关系.

定理 假设 X, Y 的联合分布具有密度函数 $f(x, y)$. 那么 X, Y 的联合分布函数是连续的, 并且在其二阶导数存在时, 联合分布函数

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s, t) ds dt$$

满足以下关系

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial y \partial x}.$$

特别地, 如果 f 在 (x, y) 存在连续, 那么上面的求导关系式在该连续点成立.

定理 假设 X, Y 的联合分布具有密度函数 $f(x, y)$. 那么 X, Y 的联合分布函数关于 X 的分布具有密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy,$$

关于 Y 的分布具有密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

如果 X 或者 Y 或者两者同时是离散随机变量, 那么上面的相应的积分应改写为求和.

例题 本节开始投掷两个骰子的例题中我们给出了其联合分布, 试写出它的两个边际分布.

■ 对 $x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y) = \sum_y P(X = x, Y = y) = \frac{1}{6}$$

$$f_Y(y) = \sum_x f(x, y) = \sum_x P(X = x, Y = y) = \frac{1}{6}$$



这个例题中的联合分布做成一个**各个元素都非负**的矩阵, 其各列和都是相等的. 乘以适当的常数后可使得各列和变为 1, 这一列和为 1 的矩阵被称为**随机矩阵**.

例题 假设 X, Y 的联合分布由下面的矩阵给出

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5/12 & 1/4 & 1/3 \\ 5/12 & 1/4 & 1/3 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

试写出它的两个边际分布.

例题 假设随机变量 X, Y 的联合分布具有密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求出其边际密度函数

■ 由前面的定理

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2}^1 \frac{21}{4}x^2y dy = \frac{21}{8} (x^2 - x^6)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_{-y^{1/2}}^{y^{1/2}} \frac{21}{4}x^2y dx = \frac{7}{2}x^{\frac{5}{2}}$$



多元分布

许多二元分布的概念和相关性质都可以直接地推广到多元情形, 在此不做累述.

例题 在一个临床试验中, 有 n 个病人接受治疗. 用 X_i 表示第 i 个病人在接收治疗后的状态,

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{恢复} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

假设每个病人能痊愈的概率是 p , 各个病人情况是相互独立的, 那么 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的联合密度应该是

$$f(\mathbf{x}) = p^{x_1 + \dots + x_n} (1 - p)^{n - x_1 - \dots - x_n}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

例题 排队系统是一个由客户以及服务组成的系统, 客户排队等待并按照某流程接受服务. 一个简单的情形是所有客户都排队

等待同一个终端提供的服务, (例如客户排队等待从同一台取款机取款). 假设由个客户. 第个客户接受服务所消耗的时间是. 为了描述这个系统中客户等待时间的分布情况, 我们通常假设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的联合密度是

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{c}{(2 + \sum_{i=1}^n x_i)^{n+1}}, & x_i > 0, \forall i \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

确定常数 c .

■ 联合密度 $f(\mathbf{x})$ 应满足

$$I = \int_0^\infty \dots \int_0^\infty f(x_1, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = 1$$

将 $f(\mathbf{x})$ 的表达式代入并做累次积分, 首先对 x_n 积分得到

$$I = \int_0^\infty \dots \int_0^\infty \frac{c}{n \left(2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i \right)^n} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1} = 1$$

然后再依次对 x_{n-1}, \dots, x_1 积分得到

$$I = \frac{c}{n! \cdot 2} = 1$$

因此 $c = 2n!$



随机变量独立性

定义 随机变量 X, Y 称为是独立的, 如果:

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B)$$

对任意 $A, B \subset \mathbb{R}$. 严格地说 A, B 应该是由简单区间（开区间, 闭区间, 或半开闭区间）生成的“可测集”, 这部分内容已超出本课程要求, 在此不做深入讨论. 但我们有如下定理

定理 随机变量 X, Y 是独立的当且仅当对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) P(Y \leq y).$$

定理中 \leq 替换为 $<$ 时仍然成立. 这一定理是告诉我们随机变量 X, Y 独立的充分必要条件是联合分布函数等于边际分布函数乘积. 从而借助于分布函数与密度函数的关系, 我们还有

定理 假设 X, Y 其具有密度函数. 随机变量 X, Y 是独立的当且仅当其联合密度函数 $f(x, y)$ 满足

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \text{ a.e. } x, y.$$

如果 $f(x, y), f_X(x), f_Y(y)$ 都是连续的, 那么独立性等价于

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \forall x, y.$$