PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Atualizado em 29/08/24

Receituário para Profilaxia Pré-Exposição de Risco ao HIV (PrEP)
PrEP DIÁRIA

RECEITUÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS ≥ 15 ANOS

ATENÇÃO: Este receituário deve ser utilizado para orientação do paciente. Para que ocorra a dispensação da PrEP na Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM), é necessário que o prescritor preencha a "FICHA DE ATENDIMENTO PARA PrEP" disponível em http://azt.aids.gov.br/ (aba Documentos) e entregue ao usuário para que o mesmo compareça à UDM portando a ficha e documento de identidade com foto.

Unidade de Saúde: _____

Nome social: _____

Nome civil: _____

Uso oral

1) Tenofovir (TDF) + entricitabina (FTC) 300 mg + 200 mg ---------- **uso contínuo**

Tomar dois comprimidos, uma vez ao dia, no primeiro dia.

A seguir, tomar um comprimido, uma vez ao dia, sempre no mesmo horário.

Belo Horizonte, _____ / _____ / _____.

_____

Nome completo, assinatura e número de registro no conselho de classe

Observações importantes (leia atentamente):

- O medicamento deverá ser retirado na Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM), _____, localizada no endereço _____.
- É muito importante o retorno a este serviço para realizar o controle clínico e sorológico (testes rápidos).
- O seu retorno está agendado para o dia _____ às _____. Não deixe de comparecer!
- Use preservativo masculino (externo) ou feminino (interno) para se proteger e proteger sua(s) parceria(s) sexual(is).
- A cada dispensação de medicamento, você pode retirar na Unidade Dispensadora de Medicamentos até cinco auto testes de HIV para entregar para pares / parcerias sexuais.

Organização da Rede PrEP em Belo Horizonte

Atendimento no Centro de Saúde:

Usuários moradores de BH, preferencialmente aqueles com idade a partir de 18 anos, sem as comorbidades descritas abaixo

Atendimento nos Serviços de Atenção Especializada (SAE) ou Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA):

Esses serviços atenderão preferencialmente:

- Adolescentes (15 a 17 anos);
- Adultos com comorbidades específicas (hipertensão arterial sistêmica, diabetes, história conhecida de doença renal, doença hepática, hepatites B e C, HTLV, histórico de fratura óssea por fragilidade patológica ou fatores de risco significativos para osteoporose);
- Gestantes
- Usuários provenientes da região metropolitana (direcionados ao Hospital Eduardo de Menezes).

OBS: Deverá ser inserida solicitação de primeira consulta no ambulatório "PrEP - PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV" por meio de regulação / SIGRAH

Critérios de indicação para PrEP

Pessoas a partir de 15 anos, com peso corporal igual ou superior a 35 kg, sexualmente ativas e que apresentem contextos de risco aumentado de aquisição da infecção pelo HIV.

Critérios de exclusão para PrEP (Contraindicação)

- Resultado de teste de HIV positivo;
- Clearance de creatinina (ClCr) estimado abaixo de 60 mL/min.

Atendimento de adolescentes (preferencialmente nos SAE / CTA): Deve-se garantir o acesso a serviços, orientações e consultas de saúde sem a necessidade de presença ou autorização de pais ou responsáveis, com direito à privacidade e sigilo, salvo em situações de necessidade de internação ou de risco de vida.

Realização de testes rápidos: Solicitar teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C em todos os atendimentos.

Avaliação de função renal: Solicitar exame de creatinina anual para pacientes jovens sem comorbidades. Solicitar exame de creatinina semestral para usuários com idade acima de 50 anos, com histórico de comorbidades ou com clearance de creatinina < 90 ml/min.

Avaliação de interações medicamentosas: Consultar em https://www.hiv-druginteractions.org/.

Dispensação da PrEP: O formulário de prescrição da PrEP, disponível em http://azt.aids.gov.br/, opção "Documentos", deve ser preenchido em todos os atendimentos e entregue ao usuário para apresentação à UDM. ATENÇÃO: para dispensação da PrEP, o teste de HIV registrado no formulário deve ter sido realizado nos últimos 7 dias. A primeira prescrição deve ser para 30 dias. Após o primeiro retorno, os formulários podem ser preenchidos a cada 120 dias, ou em intervalos menores caso necessário.

Tempo necessário de uso inicial para proteção em uso da PrEP:

- Mulheres cisgênero, pessoas trans ou não binárias designadas como sexo feminino ao nascer, e qualquer pessoa em uso de hormônio a base de estradiol, em uso de PrEP oral diária, devem tomar o medicamento por pelo menos 7 (sete) dias para atingir níveis de proteção;
- Homens cisgêneros, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer, e travestis e mulheres transexuais - que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol - e que usem PrEP, seja ela diária ou sob demanda, devem tomar uma dose de 2 (dois) comprimidos de TDF/FTC de 2 a 24 horas antes da relação sexual para alcançar níveis protetores do medicamento no organismo para relações sexuais anais.