

# Lineare Algebra I

## Woche 02

21.10.2025 und 23.10.2025

# § 4 Mengenlehre

# Was ist eine Menge?

Georg Cantor, Begründer der Mengenlehre, hat 1895 folgenden Versuch der Definition einer Menge angegeben:

## Definition

„Unter einer **Menge** verstehen wir jede Zusammenfassung  $X$  von bestimmten **wohlunterschiedenen** Objekten  $x$  unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die **Elemente** von  $X$  genannt werden) zu einem Ganzen.“

Diese Definition ist aber zu ungenau und lässt zu vieles als Menge zu, siehe Russell-Paradoxon später.

# Angabe von Mengen

- Aufzählung endlicher Mengen:

$$X := \{2, 3, 5\} = \{5, 2, 3, 2\}$$

(Die Elimination doppelter Elemente geschieht bei der Konstruktion. Elemente einer Menge haben keine Reihenfolge.)

- Angabe einiger Elemente und „offensichtliche“ Fortsetzung

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$$

- **Mengenkomprehension** durch Angabe eines **Grundbereichs**  $X$  und einer Aussageform  $A$  auf  $X$ :

$$Y := \{x \in X \mid A(x)\}$$

(Auswahl der Elemente  $x$  von  $X$ , für die  $A(x)$  wahr ist.)

# Zahlbereiche

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$$

natürliche Zahlen

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

natürliche Zahlen mit Null

$$\mathbb{Z} := \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$$

ganze Zahlen

$$\tilde{\mathbb{Q}} := \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$$

rationale Zahlen (vorläufig)

$$\mathbb{R}$$

reelle Zahlen

$$\mathbb{C} := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

komplexe Zahlen

mehr zur Konstruktion der Zahlen in Anhang A im Skript

# Russell-Paradoxon

Die sehr freie Definition einer Menge nach Cantor lässt es zu,  $X$  als die Menge aller Mengen zu definieren. Wählen wir dann  $A(x)$  als die Aussageform „enthält sich nicht selbst als Element“, so ist

$$R := \{x \in X \mid x \notin x\}$$

die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten.

Enthält  $R$  sich selbst?

- Falls  $R$  sich selbst enthält ( $R \in R$ ), dann liegt das daran, dass  $R$  die Komprehensionsbedingung  $R \notin R$  erfüllt.
- Falls  $R$  sich nicht selbst enthält ( $R \notin R$ ), dann erfüllt  $R$  die Komprehensionsbedingung  $R \notin R$  nicht, also gilt  $R \in R$ .

# Ausweg: Axiomatische Mengenlehre nach Zermelo-Fraenkel

- Die Auflösung in der **axiomatischen Mengenlehre** nach Zermelo und Fraenkel (**ZF-Mengenlehre**, 1930) besteht darin, den Mengenbegriff geeignet einzuschränken. Konstruktionen wie die „Menge aller Mengen“ sind dann nicht mehr möglich.

In dieser Lehrveranstaltung können wir das aber nicht behandeln.

- Die **Mengenkomprehension** als Konstruktionsprinzip  $Y := \{x \in X \mid A(x)\}$  bleibt in der ZF-Mengenlehre erhalten. Der Grundbereich  $X$  der Aussageform  $A$  muss aber bereits eine Menge sein, damit wieder eine Menge herauskommt.
- Es gibt allgemeinere Objekte als Mengen, sogenannte **Klassen**, wie zum Beispiel die **Klasse aller Mengen**.

# Intervalle in $\mathbb{R}$

Intervalle werden mittels Mengenkompensation definiert:

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad \text{abgeschlossen}$$

$$(a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \quad \text{links offen, rechts abgeschlossen}$$

$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad \text{links abgeschlossen, rechts offen}$$

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad \text{offen}$$

$$[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\} \quad \text{rechts unendlich, abgeschlossen}$$

$$(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} \quad \text{rechts unendlich, offen}$$

$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\} \quad \text{links unendlich, abgeschlossen}$$

$$(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\} \quad \text{links unendlich, offen}$$

$$(-\infty, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid \top\} = \mathbb{R} \quad \text{beidseitig unendlich}$$

$$\llbracket a, b \rrbracket := [a, b] \cap \mathbb{Z} \quad \text{ganzzahliges Intervall}$$



## Definition 4.2

- $X$  ist eine **Teilmenge** von  $Y$ , kurz:  $X \subseteq Y$ ,  
wenn jedes Element von  $X$  auch ein Element von  $Y$  ist:

$$\forall x \in X (x \in Y).$$

$Y$  ist dann eine **Obermenge** von  $X$ , kurz:  $Y \supseteq X$ .

- $X$  ist eine **echte Teilmenge** von  $Y$ , kurz:  $X \subsetneq Y$ ,  
wenn  $X \subseteq Y$  und  $X \neq Y$  gilt:

$$\forall x \in X (x \in Y) \quad \wedge \quad \exists y \in Y (y \notin X).$$

$Y$  ist dann eine **echte Obermenge** von  $X$ , kurz:  $Y \supsetneq X$ .

- Die leere Menge  $\emptyset$  hat keine Elemente.  
Sie ist Teilmenge jeder Menge.

## Definition 4.3

**Schnittmenge** einer ...

- nichtleeren Menge  $\mathcal{A}$  von Mengen

$$\bigcap \mathcal{A} := \{x \mid \forall A \in \mathcal{A} (x \in A)\}$$

- indizierten Menge von Mengen  $A_i$

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}$$

- Menge von zwei Mengen  $A_1, A_2$

$$A_1 \cap A_2 := \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2\}$$

# Vereinigungsmenge von Mengen

## Definition 4.3

**Vereinigungsmenge** einer ...

- (evtl. leeren) Menge  $\mathcal{A}$  von Mengen

$$\bigcup \mathcal{A} := \{x \mid \exists A \in \mathcal{A} (x \in A)\}$$

- indizierten Menge von Mengen  $A_i$

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}$$

- Menge von zwei Mengen  $A_1, A_2$

$$A_1 \cup A_2 := \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2\}$$

# Disjunkte Vereinigungsmenge von Mengen

## Definition 4.3

**Disjunkte Vereinigungsmenge** einer ...

- (evtl. leeren) Menge  $\mathcal{A}$  paarweise disjunkter Mengen

$$\bigcup \mathcal{A} := \{x \mid \exists A \in \mathcal{A} (x \in A)\}$$

- indizierten Menge paarweise disjunkter Mengen  $A_i$

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}$$

- Menge von zwei disjunkten Mengen  $A_1, A_2$

$$A_1 \cup A_2 := \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2\}$$

## Definition 4.4

**Differenzmenge** von  $Y$  in  $X$

$$X \setminus Y := \{x \in X \mid x \notin Y\}$$

**symmetrische Differenz** von  $X$  und  $Y$

$$X \Delta Y := (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$$

# Komplement einer Menge in einer Menge

## Definition 4.4

**Komplement** von  $Y \subseteq X$  in  $X$ :

$$Y^c := X \setminus Y = \{x \in X \mid x \notin Y\}$$

Die Menge  $X$  taucht im Symbol  $Y^c$  nicht auf. Sie muss aus dem Zusammenhang klar sein.

# Eigenschaften von Schnitt und Vereinigung

## Lemma 4.5

$$X \cap Y = Y \cap X$$

**Kommutativität von  $\cap$**

$$X \cup Y = Y \cup X$$

**Kommutativität von  $\cup$**

$$(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$$

**Assoziativität von  $\cap$**

$$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$$

**Assoziativität von  $\cup$**

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$$

**Distributivität**

$$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

**Distributivität**

$$X \setminus Y = X \setminus (X \cap Y)$$

$$X \cap Y = X \quad \Leftrightarrow \quad X \subseteq Y$$

$$X \cup Y = Y \quad \Leftrightarrow \quad X \subseteq Y$$

## Lemma 4.5

Sind  $Y$  und  $Z$  Teilmengen einer Menge  $X$ , bzgl. der wir das Komplement nehmen, so gilt weiter:

$$(Y \cap Z)^c = Y^c \cup Z^c$$

De Morgansches Gesetz

$$(Y \cup Z)^c = Y^c \cap Z^c$$

De Morgansches Gesetz

$$(Y^c)^c = Y$$

Komplementbildung ist **involutorisch**

$$Y \subseteq Z \quad \Leftrightarrow \quad Z^c \subseteq Y^c$$



# Bindungsregeln

Es bindet ...

$\cdot^c$  stärker als  $\setminus$  stärker als  $\cap$  stärker als  $\cup$

Diese Regeln erlauben uns, auf Klammern zu verzichten. Klammern können jedoch zur Verdeutlichung nicht schaden.

$(X^c) \cap Y$  ist dasselbe wie  $X^c \cap Y$

$X \setminus Y \cup Z$  ist dasselbe wie  $(X \setminus Y) \cup Z$

# Potenzmenge

## Definition 4.6

Die Menge aller Teilmengen einer Menge  $X$

$$\mathcal{P}(X) := \{A \mid A \subseteq X\}$$

heißt die **Potenzmenge** von  $X$ .

## Beispiel 4.7

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

$$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$$

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

# Kartesisches Produkt von endlich vielen Mengen

## Definition 4.8

**kartesisches Produkt** von zwei Mengen  $X, Y$ :

$$X \times Y := \left\{ \underbrace{(x, y)}_{\text{Paar}} \mid x \in X \wedge y \in Y \right\}$$

**kartesisches Produkt** von endlich vielen Mengen  $X_1, \dots, X_n$  für  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\bigtimes_{i=1}^n X_i := \left\{ \underbrace{(x_1, \dots, x_n)}_{n\text{-Tupel}} \mid x_i \in X_i \text{ für } i = 1, \dots, n \right\}$$

Paare und Tupel sind **geordnet**!

# § 5 Relationen

# Relation

## Definition 5.1

Es seien  $X$  und  $Y$  Mengen sowie  $R \subseteq X \times Y$ .


$(R, X, Y)$  heißt eine **Relation** zwischen  $X$  und  $Y$  mit **Graph**  $R$ .

Im Fall  $X = Y$  heißt die Relation **homogen**.

Wenn  $X$  und  $Y$  klar sind, sagt man auch oft,  $R$  selbst sei die Relation.

## Beispiel 5.2

Relation „studiert das Fach“



## Beispiel 5.2

$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$  ist die **Kleiner-Gleich-Relation auf  $\mathbb{R}$** .

# Teilbarkeitsrelation

## Beispiel 5.2

Die Zahl  $x \in \mathbb{Z}$  **teilt** die Zahl  $y \in \mathbb{Z}$ , kurz:  $x \mid y$ , wenn eine Zahl  $n \in \mathbb{Z}$  existiert, sodass  $y = nx$  gilt.

**Teilbarkeitsrelation**  $R := \{(x, y) \mid x \mid y\}$  zwischen  $X \subseteq \mathbb{Z}$  und  $Y \subseteq \mathbb{Z}$

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

## Beispiel 5.2

Es sei  $X$  eine beliebige Menge.

- **Inklusionsrelation**  $R = \{(A, B) \in \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \mid A \subseteq B\}$
- **Gleichheitsrelation** oder **Identitätsrelation** auf  $X$   
 $\text{id}_X := (\Delta_X, X, X)$  mit der **Diagonale** in  $X \times X$  als Graph:

$$\Delta_X := \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\}$$

- **universelle Relation** auf  $X$   
 $U_X := (U, X, X)$  mit Graph  $U = X \times X$

# Darstellungen von Relationen zwischen endlichen Mengen

Tabelle

Graph

Pfeildiagramm

gerichteter Graph



# Komposition von Relationen

Es seien  $X$ ,  $Y$  und  $Z$  Mengen sowie  $(R, X, Y)$  und  $(S, Y, Z)$  zwei Relationen. Dann heißt die Relation  $(S \circ R, X, Z)$  mit

$$S \circ R := \{(x, z) \in X \times Z \mid \exists y \in Y \text{ mit } (x, y) \in R \text{ und } (y, z) \in S\}$$

die **Komposition** von  $R$  und  $S$ .

## Beispiel

# Umkehrrelation

Es seien  $X$  und  $Y$  Mengen und  $(R, X, Y)$  eine Relation. Dann heißt  $(R^{-1}, Y, X)$  die **Umkehrrelation** oder **inverse Relation** von  $R$  mit

$$R^{-1} := \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in R\} \subseteq Y \times X.$$

## Beispiel

## Definition 5.8

Es sei  $X$  eine Menge und  $(R, X, X)$  eine Relation auf  $X$ . Wir definieren die **Potenzen** von  $R$  für  $n \in \mathbb{Z}$  rekursiv durch

$$R^0 := \text{id}_X$$

$$R^{n+1} := R^n \circ R \quad \text{für } n \in \mathbb{N}_0$$

$$R^{-n} := (R^n)^{-1} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

# Eigenschaften homogener Relationen

## Definition 5.9

Es sei  $X$  eine Menge und  $(R, X, X)$  eine Relation auf  $X$ .

$R$  heißt ... wenn gilt:

**reflexiv:**  $(x, x) \in R$  für alle  $x \in X$

**irreflexiv:**  $(x, x) \notin R$  für alle  $x \in X$

**symmetrisch:**  $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$

**antisymmetrisch:**  $(x, y) \in R$  und  $(y, x) \in R \Rightarrow x = y$

**transitiv:**  $(x, y) \in R$  und  $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

**total:**  $(x, y) \in R$  oder  $(y, x) \in R$  für alle  $x, y \in X$

# Eigenschaften homogener Relationen

## Beispiel 5.10

Die Teilbarkeitsrelation  $|$  auf  $\mathbb{Z}$  ist

- ☐ reflexiv
- ☐ irreflexiv
- ☐ symmetrisch
- ☐ antisymmetrisch
- ☐ transitiv
- ☐ total

## Beispiel 5.10

Die Teilbarkeitsrelation  $|$  auf  $\mathbb{N}_0$  ist

- ☐ reflexiv
- ☐ irreflexiv
- ☐ symmetrisch
- ☐ antisymmetrisch
- ☐ transitiv
- ☐ total

# Durchschnitt von Relationen

## Definition 5.11

Es seien  $X$  und  $Y$  Mengen und  $\mathcal{R}$  eine nichtleere Menge von Relationen zwischen  $X$  und  $Y$ . Die Relation

$$\bigcap \mathcal{R} := \{(x, y) \mid \forall R \in \mathcal{R} ((x, y) \in R)\}$$

heißt der **Durchschnitt** der Relationen in  $\mathcal{R}$ .

## Lemma 5.13

Es seien  $X$  und  $Y$  Mengen und  $\mathcal{R}$  eine nichtleere Menge von Relationen zwischen  $X$  und  $Y$ .

- 1 Sind alle  $R \in \mathcal{R}$  **reflexiv**, dann auch  $\bigcap \mathcal{R}$ .
- 2 Sind alle  $R \in \mathcal{R}$  **symmetrisch**, dann auch  $\bigcap \mathcal{R}$ .
- 3 Sind alle  $R \in \mathcal{R}$  **transitiv**, dann auch  $\bigcap \mathcal{R}$ .

# Reflexive Hülle einer homogenen Relation

## Definition 5.14

Es sei  $X$  eine Menge und  $(R, X, X)$  eine Relation auf  $X$ .

Die **reflexive Hülle** von  $R$  ist definiert als

$$R^? := \bigcap \{S \subseteq X \times X \mid S \text{ ist reflexiv und } R \subseteq S\}.$$

## Lemma 5.15

Es sei  $X$  eine Menge und  $(R, X, X)$  eine Relation auf  $X$ .

$R$  ist reflexiv genau dann, wenn  $R^? = R$  gilt.

Beweis.

## Weiteres zur reflexiven Hülle

Per Konstruktion ist die reflexive Hülle  $R^?$  der Relation  $R$  die kleinste reflexive Oberrelation von  $R$ . Sie hat folgende Darstellung:

### Satz 5.17

$$R^? = \bigcup_{n \in \{0,1\}} R^n = R \cup \Delta_X$$

Beweis.



## Weitere Hüllen homogener Relationen

Es sei  $X$  eine Menge und  $(R, X, X)$  eine Relation auf  $X$ .

**reflexive Hülle** von  $R$

$$R^? := \bigcap \{S \subseteq X \times X \mid S \text{ ist reflexiv und } R \subseteq S\}$$

**symmetrische Hülle** von  $R$

$$R^{\text{sym}} := \bigcap \{S \subseteq X \times X \mid S \text{ ist symmetrisch und } R \subseteq S\}$$

**transitive Hülle** von  $R$

$$R^+ := \bigcap \{S \subseteq X \times X \mid S \text{ ist transitiv und } R \subseteq S\}$$

**reflexiv-transitive Hülle** von  $R$

$$R^* := \bigcap \{S \subseteq X \times X \mid S \text{ ist reflexiv \& transitiv und } R \subseteq S\}$$

**reflexiv-symmetrisch-transitive Hülle** von  $R$

$$R^{\sim} := \bigcap \{S \subseteq X \times X \mid S \text{ ist reflexiv, symmetrisch \& transitiv und } R \subseteq S\}$$

# Weitere Hüllen homogener Relationen

Für alle diese Hüllen  $R^?$ ,  $R^{\text{sym}}$ ,  $R^+$ ,  $R^*$ ,  $R^\sim$  gilt:

## Lemma 5.15

Die Hüllenbildung fügt genau dann nichts zu  $R$  hinzu, wenn  $R$  die gewünschten Eigenschaften bereits besitzt.

Es gelten die Darstellungen:

## Satz 5.17

$$R^? = \bigcup_{n \in \{0,1\}} R^n = R \cup \Delta_X$$

$$R^{\text{sym}} = \bigcup_{n \in \{-1,1\}} R^n = R \cup R^{-1}$$

$$R^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^n$$

$$R^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} R^n$$

$$R^\sim = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} (R \cup R^{-1})^n$$

mehr zu Hüllen in Anhang C im Skript