

ATLS · ABCDE do trauma

No politrauma, trate primeiro o que mata primeiro. A ordem ABCDE é rígida na prova: via aérea com proteção cervical !' respiração !' circulação !' neurológico !' exposição.

Âncoras por letra

- A: permeabilidade, corpo estranho, IOT se GCS "d 8 ou ameaça iminente; colar cervical
- B: inspeção, SpO₂, PNTs hipertensivo/aberto, tórax instável — descomprimir antes de RX se tensão
- C: controle de sangramento externo, 2 acessos calibrosos, cristalóide/sangue, pelve/FAST
- D: GCS, pupilas, déficits focais
- E: despir, procurar lesões ocultas, prevenir hipotermia

XABCDE


Dica - XABCDE

Em alguns protocolos, o 'X' (hemorragia exsanguinante externa) vem antes do A — garrote/compressão imediata.

Memorize a sequência; só avance após estabilizar a ameaça atual.

Avaliação primária ATLS

Ordem fixa do que mata primeiro



Ameaças clássicas de B e C

Problema | Conduta imediata

PNT hipertensivo | Descompressão com agulha / toracostomia

PNT aberto | Curativo de 3 pontas + dreno

Tamponamento | Volume prudente + via para pericardiocentese/janela

Choque hemorrágico | Controle da fonte + sangue / protocolo de massa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não leve o instável para TC 'para mapear'. Sangramento interno com choque !' sala / controle de dano, não imagem demorada.