

Sepse · qSOFA e bundle inicial

Sepse é disfunção orgânica ameaçadora por infecção. Em prova, priorize reconhecimento rápido, culturas antes do antibiótico e reposição volêmica precoce no choque.

Definição útil


Lembre - Definição útil

Sepse "H infecção + aumento agudo do SOFA "e 2. Choque séptico: sepsis + vasopressor para PAM "e 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L após volume adequado.

Fluxo clássico de prova: reconhecer !' medir/coletar !' tratar na 1ª hora.

Bundle da 1a hora

Suspeita de sepsis / choque séptico



qSOFA (triagem à beira do leito)

- FR "e 22 irpm
- PAS "d 100 mmHg
- Alteração do nível de consciência
- "e 2 pontos: investigar sepsis e disfunção — não fecha diagnóstico sozinho

Bundle inicial (visão de prova)

Passo | Conduta

Lactato | Dosar e repetir se elevado

Culturas | Hemoculturas ("e 2 pares) antes do ATB, sem atrasar

Antibiótico | EV de amplo espectro na 1ª hora se choque/sepsis grave

Volume | Cristalóide ~30 mL/kg se hipotensão ou lactato alto

Vasopressor | Noradrenalina se PAM < 65 após volume

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não atrase antibiótico para 'esperar o resultado da cultura'. Colete rápido e inicie ATB empírico guiado pelo foco e epidemiologia local.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1