

DIP · doença inflamatória pélvica

DIP é infecção do trato genital superior (endometrite, salpingite, abscesso tubo-ovariano). Diagnóstico é clínico; limiar baixo para tratar reduz sequelas (infertilidade, EEU, dor crônica).

Critérios mínimos (CDC/ideia de prova)

- Dor em baixo ventre em mulher sexualmente ativa +
- Dor à mobilização do colo OU dor anexial OU dor uterina à palpação
- Apoio: febre, leucorreia mucopurulenta, PCR/VHS !', diplococos/Gonococo/Clamídia

Indicações de internação

Critério | Motivo

Abscesso tubo-ovariano | Risco de ruptura / necessidade EV

Gestação | Esquema e vigilância hospitalar

Náusea/vômitos / intolerância VO | Falha de via oral

Sinais de sepse / dúvida diagnóstica | Cirurgia / observação

Falha do tratamento ambulatorial | Reescalonar ATB


Parceiro e IST

Dica - Parceiro e IST

Trate parceiros, oriente abstinência até cura e teste outras IST (HIV, sífilis, hepatites conforme protocolo).

Escolha o cenário pelo critério de gravidade e capacidade de adesão.

DIP - local de tratamento



Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Atraso no tratamento aumenta infertilidade tubária e gravidez ectópica. Com critérios mínimos, trate empiricamente — não espere 'cultura positiva'.