

Queimaduras · regra dos 9 e Parkland

Calcule a superfície corporal queimada (SCQ), proteja via aérea e inicie reposição volêmica precoce nas queimaduras maiores.

Regra dos 9 no adulto (Wallace) — valores aproximados para prova.



Regra dos 9 (adulto)

- Cabeça e pescoço: 9%
- Cada membro superior: 9%
- Face anterior do tronco: 18% · face posterior: 18%
- Cada membro inferior: 18%
- Períneo/genital: 1%
- Palma da mão do paciente "H 1% (útil em áreas irregulares)

Parkland (clássica de prova)

Dica - Parkland (clássica de prova)

Volume nas primeiras 24 h = 4 mL × peso (kg) × % SCQ. Metade nas primeiras 8 h a partir da queimadura; metade nas 16 h seguintes. Em geral com Ringer lactato.

Sinais de via aérea / inalação

- Queimadura em face, vibrissas chamuscadas, escarro carbonáceo
- Estridor, rouquidão, confusão, ambiente fechado com fumaça
- Antecipe via aérea definitiva precocemente — edema progride

Critérios frequentes de transferência / gravidade

- SCQ elevada (em adulto, atenção a partir de ~20% em 2º/3º grau — seguir protocolo local)
- Queimadura circunferencial de tórax ou membro
- Envolvimento de face, mãos, pés, genitália, grandes articulações
- Queimadura elétrica, química ou associada a trauma

Armadilha

Atencao - Armadilha

A regra dos 9 da criança é diferente (cabeça proporcionalmente maior). Em lactentes, não aplique a tabela do adulto sem ajuste.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Queimaduras em R1: calcular SCQ (Wallace), reanimar com Parkland, proteger via aérea e reconhecer critérios de transferência.

Metade do volume nas primeiras 8 h a partir da queimadura; o restante nas 16 h seguintes. Ajuste pela diurese.

Parkland (reanimacao)

Primeiras 24 h - cristaloides

4 mL x kg x %SCQ (SF 0,9% / Ringer)

1/2 em 8h + 1/2 em 16h; alvo tipico diurese ~0,5 mL/kg/h adulto

Lembrete clássico de SCQ no adulto; criança: cabeça maior e membros menores — use tabela/Lund-Browder se cair.

Wallace - regra dos 9s

SCQ adulto (ASCII)

- 1 Cabeça + pescoco = 9%
- 2 Cada membro superior = 9%
- 3 Face anterior do tronco = 18%
- 4 Face posterior do tronco = 18%
- 5 Cada membro inferior = 18%
- 6 Perineo / genitais = 1%

Palma da mao do pcte ~1% SCQ

O que entra no %SCQ

Lembre - O que entra no %SCQ

Conte 2º e 3º graus. Eritema isolado de 1º grau não entra no cálculo de Parkland.

Prioridades iniciais

- ABC: via aérea se queimadura facial, fuligem, rouquidão, espaço fechado
- Remover roupas/jóias; resfriar com água morna (evitar hipotermia)
- Dois acessos calibrosos; aquecer fluidos se grande superfície
- Analgesia, profilaxia tétano, curativo limpo; criteriar centro de queimados

Sinais de alerta / transferência

Situação | Por quê

Face, mãos, pés, genitais, articulações | Função e risco alto

Circunferencial / tórax | Síndrome compartimental / ventilação

Elétrica / química / inalação | Lesão oculta e via aérea

Grande %SCQ ou criança/idoso | Reanimação e suporte especializado

Armadilha

Atenção - Armadilha

Parkland é ponto de partida — não ‘fixe’ o volume se oligúria ou sobrecarga. Elétrica: SCQ externa subestima dano profundo.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1