

Abortamento · tipos e conduta

Abortamento é a interrupção da gestação antes de 20–22 semanas (definição clássica de prova). O tipo clínico define: expectante/misoprostol/AMIÚ e, no infectado, ATB + esvaziamento.

Classificação rápida

Lembre - Classificação rápida

Ameaça: colo fechado, útero compatível, embrião vivo. Inevitável: colo dilatado, bolsa rota/sangramento. Completo: útero vazio após expulsão. Retido: óbito sem expulsão.

Triagem: colo fechado + vitalidade = ameaça; colo aberto + restos = incompleto; febre/dor = infectado — urgência.



Condutas-chave

- Tipagem ABO/Rh — imunoglobulina anti-D se Rh negativo conforme protocolo
- USG para vitalidade e restos
- Incompleto/retido: expectante, misoprostol ou AMIÚ/curetagem conforme estabilidade e preferência
- Infectado/séptico: ATB amplo + esvaziamento; UTI se choque

Quadro clínico

Tipo | Colo | USG / nota

Ameaça | Fechado | Embrião vivo

Inevitável | Aberto | Expulsão iminente

Incompleto | Aberto | Restos intracavitários

Completo | Fechado/fechando | Cavidade vazia

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Abortamento infectado não se resume a antitérmico. Antibiótico EV e esvaziamento uterino são pilares — atraso aumenta risco de sepse e lesão reprodutiva.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Tipos de abortamento (ameaça ! infectado) são classificados por colo, eliminação de restos e infecção — tabela clássica de prova.

Tipos de abortamento

Colo / restos / clínica

Ameaca - colo fechado, útero viável	repouso
Inevitável - colo dilatado, sangramento	esvaziar
Incompleto - restos + colo aberto	curetagem
Completo - esvaziado, colo fechado	observar
Retido - ovo morto, colo fechado	esvaziar
Infectado - febre + restos/colo	ATB+esvaz

Colo fechado + vitalidade = ameaca

Comparativo clássico

Tipo | Colo | Conteúdo uterino | Conduta-ideia

Ameaça | Fechado | Embrião/feto viável | Repouso relativo, observação, ;\$,4rõU0

Inevitável | Dilatando/aberto | Gestação em vias de expulsão | Esvaziamento

Incompleto | Aberto | Restos | Esvaziamento (AMIÚ/curetagem)

Completo | Fechado após | Vazio | Observação + orientação

Retido | Fechado | Produto morto retido | Esvaziamento programado

Infectado | Variável | Restos + infecção | ATB + esvaziamento urgente

Definição de prova

Lembre - Definição de prova

Abortamento: interrupção espontânea antes de 20–22 semanas (ou peso < 500 g, conforme protocolo local citado na banca).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1