

Isoimunização Rh · profilaxia com anti-D

Mulher Rh" não sensibilizada recebe imunoglobulina anti-D para prevenir aloimunização. Se já sensibilizada, o foco muda para monitorar anemia fetal.

Quando dar anti-D também

Lembre - Quando dar anti-D também

Abortamento, gestação ectópica, mola, procedimentos invasivos, sangramento, versão cefálica externa e trauma abdominal — além do esquema de 28 semanas e pós-parto.

Coombs indireto negativo = elegível à profilaxia; positivo = acompanhar aloimunização.

Gestante Rh negativo

Coombs -> profilaxia -> RN

Tipagem + Coombs

pai/RN se preciso

Anti-D 28 sem

se não sensibilizada

Pos-parto 72h

se RN Rh+

Aloimunização estabelecida

- Títulos/anticorpos e Doppler da ACM para anemia fetal
- Transfusão intrauterina em anemia grave
- Parto em centro com neonatologia; fototerapia/exsanguíneo no RN
- Anti-D não reverte sensibilização já instalada

Cenários de profilaxia

Situação | Anti-D?

Rh" , Coombs" , 28 sem | Sim

Pós-parto RN Rh+ | Sim ("d72 h)

Rh" , Coombs+ (sensibilizada) | Não (não previne)

Mãe Rh+ | Não

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Esquecer a dose pós-parto quando o RN é Rh+ é erro clássico. Se tipagem do RN atrasar, não perca a janela de 72 h — profila-se se indicado.


Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Isoimunização Rh: Coombs indireto na gestante Rh" e profilaxia anti-D nos momentos clássicos evitam aloimunização.

Anti-D - momentos clássicos

Profilaxia na gestante Rh- / Coombs-



Checklist lógico da profilaxia anti-D.

Coombs / logica Rh

Quem recebe anti-D

- 1 Mae Rh negativo
- 2 Coombs indireto negativo
- 3 Pai/RN Rh positivo ou desconhecido
- 4 Evento sensibilizante ou 28 sem / pos-parto

Nao dar se ja aloimmunizada (Coombs+ anti-D)

Testes

Teste | Significado

Tipagem ABO/Rh | Identifica gestante Rh" candidata

Coombs indireto | Detecta anticorpos irregulares na mãe

Coombs direto (RN) | Anticorpos ligados às hemácias do bebê

Anti-D profilático | Imunoglobulina — previne, não trata aloimunização já instalada

Não confundir

Atencao - Não confundir

Se Coombs indireto já positivo para anti-D (aloimmunizada), profilaxia não reverte — monitorar anemia fetal (MCA-PSV etc.).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1