

Trabalho de parto - fases

Trabalho de parto = contrações regulares que promovem dilatação e esvaecimento cervicais.
Distinguir fase latente de ativa evita cesárea precoce por 'parada falsa'.

Fases do 1º período

Fase | Ideia central | Ponto de prova

Latente | Dilatação lenta até ~5–6 cm (definições modernas) | Pode durar horas; não é distocia precoce

Ativa | Dilatação mais rápida até 10 cm | Avaliar progresso; partograma

2º e 3º períodos

- 2º: dilatação completa !' nascimento; duração varia com paridade e analgesia
- Sinais de descida: rotação, coroamento; episiotomia não é rotina
- 3º: dequitação placentária; manejo ativo com ocitocina reduz HPP
- Sinais de dequitação: globo de segurança, jato de sangue, alongamento do cordão

Partograma

Dica - Partograma

Use para detectar parada de progressão e decidir ocitocina vs cesárea com critérios claros.

Linha do tempo clássica cobrada em Ginecologia e Obstetrícia.



Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Diagnosticar 'distocia' ainda na fase latente e indicar cesárea precoce é erro clássico. Espere a fase ativa antes de rotular falha de progressão.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Bishop score prevê sucesso da indução; fases do parto organizam dilatação, expulsão e dequitação.

Componentes do Bishop score para indução do parto.

Bishop score

0-3 pts por item (total 0-13)

Dilatacao cervical (cm)	0-3
Apagamento / shortening (%)	0-3
Estacao da apresentacao	0-3
Consistencia (firme-mole)	0-2
Posicao (post-medio-ant)	0-2

Favoravel: geralmente ≥ 8 | Desfavoravel: ≤ 5

Linha do tempo clássica das fases do trabalho de parto.

Fases do parto

Latente -> ativa -> expulsivo -> dequitacao



Fases — o que a prova quer

Fase | Marco | Ponto-chave

- 1ª — latente | Início das contrações até dilatação acelerada | Pode ser longa; evite cesárea por 'falha' precoce
- 1ª — ativa | Dilatação acelerada (~6 cm em muitos protocolos) | Avaliar progressão e bem-estar fetal
- 2ª — expulsivo | Dilatação completa !' nascimento | Puxos, desproporção, assistência
- 3ª — dequitação | Nascimento !' saída da placenta | Prevenir HPP (ocitocina, tração controlada)

Bishop na prática de prova

Dica - Bishop na prática de prova

Colo favorável !' indução com ocitocina tende a ir melhor. Colo desfavorável !' amadurecimento (misoprostol/sonda) antes de forçar indução.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1