

Sangramento uterino anormal · abordagem

SUA é sangramento fora do padrão normal em volume, regularidade ou duração. Estabilize anemia/hemorragia, classifique por PALM-COEIN e investigue causa estrutural conforme idade e risco de câncer.

PALM-COEIN (resumo)


Dica - PALM-COEIN (resumo)

PALM (estrutural): Pólipo, Adenomiose, Leiomioma, Malignidade/hiperplasia. COEIN (não estrutural): Coagulopatia, Ovulação disfuncional, Endometrial, Iatrogênico, Não classificado.

Fluxo: ABC/hemoglobina !' anamnese e exame !' imagem/biópsia se indicado !' terapia hormonal ou específica.

Abordagem do SUA

Estabilizar -> classificar PALM-COEIN -> tratar causa



Investigação por cenário

- Excluir gravidez em idade fértil
- Hemograma, ferritina; coagulopatia se adolescente / história familiar
- USG pélvico; histeroscopia se pólipo/mioma submucoso suspeito
- Biópsia endometrial: >45 anos, fatores de risco de hiperplasia/câncer, falha terapêutica

Tratamento — ideias

Situação | Opção

Agudo intenso | Ácido tranexâmico, estrogênio/combinações, tamponamento

Crônico sem desejo gestacional | DIU-LNG, progestagênios, combinações

Mioma / pólipo | Histeroscopia / miomectomia / outras

Refratário | Ablação / histerectomia selecionada

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Em perimenopausa/pós-menopausa, não feche 'disfuncional' sem investigar endométrio.

Sangramento pós-menopausa é câncer até prova em contrário.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Sangramento uterino anormal: PALM-COEIN separa causas estruturais (PALM) das não estruturais (COEIN).

PALM-COEIN

FIGO - causas de SUA

- 1 P - Polipo
- 2 A - Adenomiose
- 3 L - Leiomioma (mioma)
- 4 M - Malignidade / hiperplasia
- 5 C - Coagulopatia
- 6 O - Ovulatoria (disfuncao)
- 7 E - Endometrial
- 8 I - Iatrogenica

PALM = estrutural | COEIN = nao estrutural

Como usar na prova

Grupo | Investigação típica | Exemplo

PALM | US / histeroscopia / anatomia | Mioma submucoso, pólipos, câncer

COEIN | História, labs, fármacos | von Willebrand, anovulação, anticoagulante

Primeiro passo

Lembre - Primeiro passo

Sempre excluir gravidez (;\$,,4r' æ Ðulher em idade reprodutiva com sangramento anormal antes de fechar PALM-COEIN.

Red flags de malignidade

- Pós-menopausa com qualquer sangramento
- Sangramento irregular persistente, anemia grave
- Fatores de risco para hiperplasia/câncer de endométrio

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1