

Tocolise · trabalho de parto prematuro

Tocolise ganha tempo para corticoide e transferência — não prolonga gestação indefinidamente. Confirme TPP verdadeiro e exclua contraindicações (infecção, DPP, sofrimento).

Agentes

Dica - Agentes

Nifedipina e atosibana são opções frequentes; indometacina em janelas precoces (<32 sem) com cuidado fetal. ;"Ö vöæ—7F 2 6 × am por efeitos maternos.

Objetivo: 48 h de janela + neuroproteção com MgSO₄, se <32 sem.

TPP com tocolise

Diagnosticar -> corticoide -> tocolítico

TPP verdadeiro

dinâmica + colo

Corticoide

betametasona

Tocolise +/- Mg

48h / <32 sem

Pacote de prematuridade

- Corticosteroide antenatal para maturidade pulmonar
- MgSO₄, para neuroproteção se parto iminente <32 semanas
- ATB se RPM/GBS conforme protocolo — não 'profilaxia cega' em TPP sem RPM
- Transferir para centro com UTI neonatal

Contraindicações à tocolise

Situação | Motivo

Sofrimento fetal | Parto urgente

DPP / sangramento grave | Risco materno

Corioamnionite | Esvaziar útero

Óbito fetal / malformação letal | Sem benefício

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não some nifedipina com MgSO₄, em doses que gerem bloqueio neuromuscular/hipotensão grave sem monitoramento. Tocolise após 34–34+6 sem raramente se justifica.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Tocolise ganha tempo para corticóide/transferência; contraindicações clássicas impedem atrasar o parto.

Tocolise - contraindicacoes

Quando NAO inibir o parto

- 1 Sofrimento / obito fetal
- 2 Corioamnionite / infeccao intra-uterina
- 3 DPP significativo / sangramento grave
- 4 Pre-eclampsia grave / eclampsia
- 5 IG limite a termo / dilatacao avancada
- 6 Malformacao letal / contraindicacao materna ao farmaco

Objetivo: 48h para corticoide / traslado

Agentes — ideia de prova

Classe | Exemplo | Lembrete

Bloqueador Ca | Nifedipina | Muito usado; evitar com MgSO₄ em alguns protocolos

Antagonista ocitocina | Atosibano | Bom perfil; custo/disponibilidade

β₂-agonista | Terbutalina | Efeitos cardíacos maternos

Inibidor COX | Indometacina | Cuidado >32 sem / ducto / oligúria fetal

MgSO₄ | Neuroproteção | Mais neuroproteção fetal que tocolise prolongada

Papel real

Lembre - Papel real

Tocolise não 'segura a gestação por semanas' como objetivo único. Use janela curta para corticóide, MgSO₄ neuroprotetor e transferência in utero.

Pacote prematuridade

- Corticóide antenar se IG elegível
- MgSO₄ para neuroproteção em IG muito prematura
- ATB se RPM; estreptococo B conforme protocolo
- Não tocolisar se contraindicação listada

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1