

Alergia à proteína do leite de vaca · APLV

APLV pode ser imediata (IgE) ou tardia (não IgE/GI). O tratamento é exclusão da proteína com fórmula adequada ou dieta materna orientada — não 'trocar marca de leite'.

Fórmulas

Lembre - Fórmulas

1ª linha na maioria: fórmula extensamente hidrolisada. Falha/anafilaxia grave/malabsorção: aminoácidos livres. Soja: uso restrito (idade, IgE).

Fenótipo guia urgência e teste: anafilaxia " protocolite do lactente.



Conduta

- Aleitamento: mãe exclui leite/derivados com suplementação de cálcio
- Evitar teste de exclusão eterno sem plano de reintrodução
- Provocação oral é padrão para confirmar e avaliar tolerância
- Diferenciar da intolerância à lactose (açúcar, não proteína)

Cenários

Quadro | Conduta-chave

Protocolite do lactente | Exclusão; bom prognóstico

Anafilaxia | Adrenalina IM + fórmula de aminoácidos

Enterocolite (FPIES) | Reanimação; evitar gatilho

Dúvida diagnóstica | Especialista + diário alimentar

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Fórmula parcialmente hidrolisada / 'HA' de supermercado não trata APLV estabelecida. Leite de outros mamíferos (cabra) costuma cruzar — não é alternativa segura.


Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Separar APLV IgE-mediada (imediata/anafilaxia) da não IgE (GI tardia/protocolite) muda teste, fórmula e urgência.

Imediata: urticária/vômito/anafilaxia + IgE/prick. Não IgE: sangue nas fezes, refluxo, enterocolite — exclusão e provocação.


APLV IgE vs não IgE



Extensamente hidrolisada na maioria; aminoácidos se falha/anafilaxia grave.

Manejo alimentar

Exclusão -> fórmula -> provocação



Cenários clássicos

Quadro | Tipo | Conduta-chave

Proctocolite do lactente | Não IgE | Exclusão; bom prognóstico

Urticária/anafilaxia | IgE | Adrenalina IM + AA se grave

FPIES | Não IgE | Reanimação; evitar gatilho

Dúvida | — | Especialista + diário

Fórmulas

- 1ª linha: fórmula extensamente hidrolisada (eHF)
- Falha/anafilaxia grave/malabsorção: aminoácidos livres
- Soja: uso restrito por idade/fenótipo
- Parcialmente hidrolisada / leite de cabra não tratam APLV estabelecida

Armadilha

Atenção - Armadilha

Intolerância à lactose " APLV (açúcar vs proteína). Não troque só a 'marca' do leite integral.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1