

Desnutrição · marasmo e kwashiorkor

Desnutrição grave eleva mortalidade por infecção, hipoglicemia e distúrbios eletrolíticos. Diferencie marasmo (wasting sem edema) de kwashiorkor (edema) e inicie estabilização antes da realimentação agressiva.

Marasmo vs kwashiorkor

Lembre - Marasmo vs kwashiorkor

Marasmo: emagrecimento grave, 'pele e osso', sem edema. Kwashiorkor: edema (membros/face), cabelos ralos, apatia; pode haver formas mistas (marasmo-kwashiorkor).

Fases clássicas: tratar hipoglicemia/hipotermia/infecção !' realimentação cuidadosa !' recuperação e prevenção.

Desnutricao grave - fases

Estabilizar / realimentar / seguir

Estabilizar

Glicemia / temperatura
Volume prudente
ATB se indicado

Primeiras 24-48h

Realimentar

Dieta F75 -> F100
Evitar sobrecarga
Reposar refeeding

Micronutrientes

Seguir

Catch-up ponderal
Estímulo / vínculo
Prevenir recidiva

Alta planejada

Complicações a vigiar

- Hipoglicemia e hipotermia — medir e prevenir
- Desidratação: reidratar com cuidado (evitar sobrecarga no kwashiorkor)
- Infecções ocultas; considerar ATB empírico na desnutrição grave hospitalar
- Refeeding: hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia

Antropometria (ideia)

Indicador | Uso

P/I (peso/idade) | Desnutrição global — menos específico

P/E (peso/estatura) | Wasting / agudo

E/I (estatura/idade) | Stunting / crônico

Perímetro braquial | Triagem rápida em campo/emergência

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não 'enchá de proteína e calorias' no dia 1 da desnutrição edematosa grave. Estabilize e use fórmulas/phase apropriadas — realimentação agressiva mata por refeeding e falência cardíaca.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Z-score OMS (peso/altura, altura/idade, IMC/idade) e a distinção kwashiorkor vs marasmo são linguagem obrigatória de desnutrição pediátrica.

$Z = (\text{valor observado} - \text{mediana de referência}) / \text{DP da referência}$. <-2 = desnutrição; <-3 = grave.

Z-score OMS (ideia)

Desvio em relação a mediana

$$Z = (x - \text{mediana}) / \text{DP}$$

P/A, A/I, IMC/I - curvas OMS

Marasmo: emaciação sem edema. Kwashiorkor: edema + alterações de pele/cabelo ± fígado gorduroso.

Marasmo vs kwashiorkor

Fenotipos clássicos

Marasmo

Emaciação grave

Sem edema

Deficit calórico global

Kwashiorkor

Edema

Pele / cabelo alterados

Deficit proteico marcado

Índices antropométricos (OMS)

Índice | Interpretação clássica

Peso/altura (P/A) | Emaciação / desnutrição aguda

Altura/idade (A/I) | Baixa estatura / crônica

IMC/idade | Sobrepeso/obesidade ou magreza

$Z < -3$ | Desnutrição aguda grave (ideia)

Conduta high-yield

- Estabilizar: hipoglicemia, hipotermia, desidratação (protocolo específico), infecção
- Realimentação cuidadosa — risco de síndrome de realimentação
- Kwashiorkor: edema não é 'só volume' — manejo nutricional protocolado
- Investigar causa: ingestão, absorção, doença crônica, abuso/negligência

Armadilha

Atencao - Armadilha

Não use Plano C 'padrão' agressivo de diarreia no desnutrido grave sem protocolo — risco de sobrecarga e morte.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1