

Exantemas clássicos · sarampo ao roseola

Exantema + febre exige calendário vacinal e cronologia. Diferencie morbiliforme, vesicular e escarlatiniforme — isolamento e notificação importam no sarampo.

Sarampo — lembrar

Dica - Sarampo — lembrar

Tosse, coriza, conjuntivite + Koplik + exantema cefalocaudal. Notificação compulsória e bloqueio vacinal de contactantes.

Atalho clássico: varicela 'em surtos'; sarampo face!'corpo'; rubéola mais brando; roseola rash após defervescência.

Exantemas por tempo

Dia do rash (classicos)



Diferenciais high-yield

- Escarlatina: lixa, sinal de Pastia, língua em framboesa; tratar SGA
- Doença mão-pé-boca: vesículas dolorosas; suporte
- Meningococcemia: púrpura fulminans — ATB imediato
- Kawasaki: febre "e5 dias + critérios mucocutâneos — AAS + IGI

Rash × vacina

Doença | Prevenção

Sarampo/rubéola/caxumba | Tríplice viral

Varicela | Vacina varicela

Escarlatina | Não vacinal — tratar SGA

Hepatite A (não exantema típico) | Vacina HAV

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Púrpura + toxemia " " 'virose exantemática': pense meningococo e trate. Aspirina em criança com viral: risco de Reye — cuidado (exceto protocolos como Kawasaki).

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

O calendário clássico das doenças exantemáticas (dia do rash, Koplik, lixa, defervescência) é memória pura de prova.

Sarampo (Koplik, D3–D7), escarlatina (lixa), rubéola (occipital), roseola (após febre), varicela (polimorfismo).

Exantemas clássicos

Dia do rash / pista

Sarampo

Escarlatina

Rubeola

Roseola

Varicela



D3-D7; Koplik

lixa + SGA

adenopatia

apos defervescencia

surtos / crostas

Associe pródromo + morfologia + cronologia antes de pedir sorologia.

Pistas diagnósticas

Atalhos de prova

Tosse + coriza + conjuntivite

Sarampo

Língua em framboesa / Pastia

Escarlatina

Adenopatia occipital

Rubeola

Rash apos febre alta 3 dias

Roseola

Polimorfismo em crostas

Varicela

Purpura + toxemia = meningococo

Calendário / prevenção

Doença | Marca registrada | Prevenção

Sarampo | Koplik + cefalocaudal | Tríplice viral

Rubéola | Rash brando + occipital | Tríplice viral

Varicela | Surtos de vesículas | Vacina varicela

Escarlatina | Lixa + SGA | Tratar estreptococo

Roseola (HHV-6) | Rash pós-febre | Suporte

Diferenciais perigosos

- Meningococcemia: púrpura fulminans — ATB imediato
- Kawasaki: febre > 5 dias + critérios mucocutâneos
- Doença mão-pé-boca: vesículas orais/extremidades

Armadilha

Atenção - Armadilha

Sarampo é notificação e bloqueio vacinal de contactantes — não trate só como 'virose exantemática'.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1