

Puberdade · precoce, atrasada e Tanner

Puberdade precoce: <8 anos meninas / <9 meninos. Atrasada: ausência de caracteres aos 13 (&@) ou 14 (&B). Tanner + velocidade de crescimento guiam a propedêutica.

Primeiro sinal

Lembre - Primeiro sinal

Meninas: telarca. Meninos: volume testicular "e4 mL. Pelarca isolada pode ser prematura benigna — avalie contexto e progressão.

Central (GnRH-dependente) versus periférica muda exame e imagem.



Propedêutica

- Idade óssea, estradiol/testosterona, LH/FSH ($\pm$ estímulo GnRH)
- RM de SNC se precoce central, especialmente meninos ou progressão rápida
- USG pélvico em meninas; excluir tumores secretores se periférica
- Atraso: pensar constitucional, doenças crônicas, Turner, Kallmann

Marcos

Evento | Idade aproximada

Telarca | ~8–13 anos

Menarca | ~2–2,5 anos após telarca

Volume testicular 4 mL | Início masculino

Estirão | Tanner 3–4

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Puberdade precoce em meninos tem maior chance de patologia de SNC — não 'observe eternamente'. Telarca sob exposições estrogênicas exógenas também existe.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Estágios de Tanner e a distinção telarca vs pubarca (e volume testicular) definem precoce/atrasada e o que investigar.

Tanner 1 = pré-púbere; 2 = início (telarca/volume "e4 mL); 3–4 estirão; 5 adulto.

Tanner - ideia

Progressão puberal



Telarca = início feminino típico. Pubarca isolada pode ser adrenarca prematura benigna — veja progressão e estatura.

Telarca vs pubarca



Cortes clássicos

Situação | Corte

Puberdade precoce &@ | < 8 anos

Puberdade precoce &B | < 9 anos

Atraso &@ | Sem caracteres aos 13 anos

Atraso &B | Sem caracteres aos 14 anos / volume <4 mL

Início masculino | Volume testicular "e 4 mL

Propedêutica

- Idade óssea + LH/FSH ($\pm$ GnRH) + esteroides sexuais
- RM de SNC na precoce central (sobretudo meninos / progressão rápida)
- Central (GnRH-dependente) vs periférica muda imagem e tratamento
- Atraso: constitucional, crônicas, Turner, Kallmann

Armadilha

Atencao - Armadilha

Pubarca isolada "telarca. Em meninos, precoce tem maior chance de patologia de SNC — não observe indefinidamente.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1