

Álcool · rastreio e intervenção breve

Rastreie consumo com perguntas padronizadas e faça intervenção breve no uso de risco. Dependência exige manejo de abstinência e rede de atenção psicossocial.

Abstinência

Lembre - Abstinência

Tremores, taquicardia, HA, convulsão e delirium tremens. Benzodiazepínico + tiamina (antes da glicose se risco de Wernicke).

Triagem define: orientação, intervenção breve ou tratamento especializado.



High-yield

- Gestação: abstinência total — SAF é prevenível
- Intervenção breve: feedback, responsabilidade, menu de opções, empatia
- CAGE/AUDIT: ferramentas clássicas de rastreio
- Comorbidades: trauma, depressão, pancreatite, cirrose

Sinais de gravidade

Achado | Conduta

Convulsão / DT | Internação / BDZ

Wernicke | Tiamina EV

Ideação suicida | Risco + rede

Gestante usuária | Acolhimento sem moralizar

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Glicose sem tiamina em desnutrido etilista pode precipitar Wernicke. Não subestime abstinência em 'cirurgia eletiva' — história alcoólica faz parte do pré-op.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Rastreio de risco alcoólico: ideia do AUDIT-C (frequência, quantidade, binge) e definição operacional de binge/episódio pesado.

AUDIT-C: frequência × dose típica × binge. Pontuação alta !' AUDIT completo / intervenção.


AUDIT-C (ideia)

3 perguntas de rastreio

- 1 Com que frequência bebe?
- 2 Quantas doses em um dia típico?
- 3 Com que frequência $\geq$ 5-6 doses (binge)?

Baixo risco: reforço breve. Alto: avaliação completa e intervenção.

Rastreio alcoólico



AUDIT-C — ideia de prova

Pergunta | O que mede

Frequência de consumo | Com que frequência bebe álcool

Quantidade típica | Doses em um dia típico de consumo

Binge / episódio pesado | Frequência de "e 5–6 doses em uma ocasião

Binge — conceito operacional

- Episódio de consumo pesado em curta janela (ideia: "e 5 doses homens / "e 4 mulheres — valores variam por protocolo)
- Associado a trauma, violência, pancreatite e risco agudo
- Pode existir binge mesmo sem dependência estabelecida
- Intervenção breve na APS reduz consumo de risco

Armadilha

Atenção - Armadilha

Negar 'alcoólismo' não exclui uso de risco. Rastreie padrão (AUDIT-C), não só a autodeclaração de dependência.

