

Atraso diagnóstico · vieses e segurança

Atraso diagnóstico mistura vieses do profissional, falhas de sistema e barreiras de acesso. Segurança do paciente exige checklists, comunicação e follow-up de exames.

Vieses clássicos

Dica - Vieses clássicos

Ancoragem, fechamento prematuro, fadiga de alerta e viés de disponibilidade. Combata com diagnóstico diferencial explícito e 'e se eu estiver errado?'.

Cada elo pode falhar: percepção do paciente, acesso, hipótese, exame e retorno do resultado.



Práticas que reduzem atraso

- Sistema de alerta para resultados críticos
- Handoff estruturado (SBAR) na transferência de cuidado
- Rastreios organizados com busca ativa de faltosos
- Reavaliação quando a evolução não fecha com a hipótese

Exemplos de prova

Cenário | Falha típica

Ca colo sem Papanicolaou | Falha de rastreio/acesso

TEP rotulado como ansiedade | Fechamento prematuro

Rx alterado sem aviso | Falha de comunicação

IAM em mulher/idoso | Viés de representação

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Culpar só o paciente pelo atraso ignora determinantes e falhas do sistema. Resultado crítico sem comunicação é erro de processo — prevenível.


Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Erros e vieses cognitivos atrasam diagnóstico; no outro polo, overdiagnosis encontra 'doença' que não traria benefício ao tratar.

Um polo perde a doença; o outro rotula demais sem benefício líquido.

Dois polos do erro



Checklist dos vieses que mais explicam atraso diagnóstico em prova.

Vieses classicos

Reconheça no enunciado

- 1 Ancoragem: grudar na 1ª hipótese
- 2 Confirmação: buscar só o que confirma
- 3 Disponibilidade: lembrar do caso recente
- 4 Fechamento prematuro: parar de investigar cedo

Vieses × overdiagnosis

Conceito | Definição | Antídoto

Ancoragem | Fixar na primeira hipótese | Reabrir diferencial se evolução atípica

Confirmação | Buscar só o que confirma | Perguntar 'o que fala contra?'

Disponibilidade | Superestimar o recente/marcante | Usar base rates / protocolos

Overdiagnosis | Diagnosticar o que não causaria dano | Rastrear só com critério; shared decision

Overdiagnosis — ideia

- Não é falso-positivo: a 'doença' existe, mas é indolente
- Tratar pode gerar só dano (cirurgia, ansiedade, custo)
- Comum em discussões de rastreamento (ex.: achados subclínicos)
- Difere de overtreatment (tratar em excesso o que talvez não precise)

Para a prova

Lembre - Para a prova

Atraso diagnóstico !" vieses e falhas de sistema. Overdiagnosis !" excesso de detecção sem benefício — princípio da prevenção quaternária.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1