

Níveis de prevenção · Leavell & Clark

Classifique a ação pelo momento na história natural da doença — pergunta clássica de preventiva/SUS.

Linha do tempo da prevenção na história natural.



Níveis e exemplos que caem

Nível | Momento | Exemplo

Primordial | Antes dos fatores de risco | Políticas contra pobreza, urbanismo saudável
Primária | Pré-patogênese (evitar doença) | Vacina, saneamento, educação em saúde
Secundária | Doença pré-clínica / início | Rastreamento (mamografia, Papanicolaou)
Terciária | Doença estabelecida | Reabilitação, evitar sequelas
Quaternária | Excesso de intervenção | Evitar medicalização / overdiagnosis

Como não errar na prova

- Pergunte: a doença já existe? Já há sequela? É só ambiente/determinante?
- Rastreamento de assintomático = secundária (na maioria dos itens clássicos)
- Fisioterapia pós-AVC = terciária
- Lei antitabaco / promoção ampla = primordial ou primária (leia o enunciado)

Truque rápido

Lembre - Truque rápido

Primária evita a doença. Secundária detecta cedo. Terciária limita dano. Quaternária evita o excesso de medicina.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Níveis de prevenção fecham enunciados de APS: memorize primordial !' primária !' secundária !' terciária !' quaternária com exemplos clássicos.

Linha clássica de prova: antes do risco !' evitar doença !' detectar cedo !' limitar dano !' evitar excesso.

Níveis de prevenção

Do risco populacional a iatrogenia



Checklist rápido para classificar a intervenção do enunciado.

Exemplos de prova

Associe nível x conduta

- 1 Primordial: lei antitabaco, saneamento, reducao de pobreza
- 2 Primária: vacina, preservativo, fluor, orientacao alimentar
- 3 Secundária: mamografia, Papanicolau, PA em assintomatico
- 4 Terciária: fisioterapia pos-AVC, reabilitacao cardiaca
- 5 Quaternária: nao rastrear sem criterio; deprescrever

Níveis x foco x exemplo

Nível | Foco | Exemplo clássico

Primordial | Determinantes sociais/ambientais | Política antitabaco, urbanismo saudável
Primária | Impedir o surgimento da doença | Vacinação, uso de cinto, educação em saúde
Secundária | Diagnóstico precoce / rastreamento | Mamografia, glicemia/PA em assintomático
Terciária | Limitar dano e reabilitar | Reabilitação pós-AVC, controle de sequelas
Quaternária | Evitar medicalização excessiva | Não solicitar exame sem indicação; deprescrição

Pegadinha frequente

Lembre - Pegadinha frequente

Tratar HAS já estabelecida é controle/terciária (evitar complicação), não primária. Primária evita a doença; secundária acha cedo; terciária reduz sequela.

Como classificar em 10 segundos

- Ainda não há doença nem fator individual? !' primordial (política/ambiente)
- Há risco, mas sem doença? !' primária
- Busca doença oculta / fase inicial? !' secundária
- Doença estabelecida, evita piora/sequela? !' terciária
- Intervenção desnecessária ou dano do cuidado? !' quaternária

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1