

Tabagismo · abordagem e cessação

Pergunte, aconselhe e ofereça tratamento a todo tabagista. Combinação de aconselhamento + farmacoterapia dobra chances de cessação.

Farmacoterapia


Dica - Farmacoterapia

TSN (adesivo/goma), bupropiona e vareniclina são pilares. Escolha conforme CI (convulsão × bupropiona; humor × vareniclina — individualize).

Fluxo breve da consulta: identificar !' aconselhar !' avaliar prontidão !' ajudar !' agendar retorno.

Abordagem 5As

Ask-Advise-Assess-Assist-Arrange



Pontos de prova

- Carga tabágica: maços-ano = (maços/dia) × anos
- Benefício CV começa cedo após parar; risco de Ca cai com o tempo
- Gestante: aconselhamento intensivo; TSN só se benefício > risco
- Exposição passiva também adoece — ambiente livre de fumo

5As (português)

A | Ação

Avaliar/Ask | Identificar uso

Aconselhar | Pare de forma clara

Apreciar prontidão | Estágio de mudança

Assistir / Agendar | Plano + follow-up

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não diga só 'pare de fumar' sem oferecer método. Narguilé/cigarro eletrônico também são exposição tóxica — não são 'estratégia segura' de cessação na prova.

Para a prova — escalas e macetes


Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Intervenção breve no tabagismo: modelo 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) — roteiro clássico de APS.

Fluxo 5A condensado: perguntar !' aconselhar/avaliar !' ajudar e agendar seguimento.

5A - intervencao breve

Ask -> Advise/Assess -> Assist/Arrange



Cinco passos da intervenção breve baseada em evidência.

Os 5A

Checklist completo

- 1 Ask — perguntar sobre uso em toda consulta
- 2 Advise — aconselhar a parar de forma clara
- 3 Assess — avaliar motivacao/prontidao
- 4 Assist — plano, TRN/farmaco, suporte
- 5 Arrange — agendar seguimento

5A — o que fazer

A | Ação | Frase/conduita

Ask | Perguntar | 'Você fuma ou usa tabaco?' em toda consulta

Advise | Aconselhar | Conselho claro, personalizado e breve

Assess | Avaliar | Quer parar agora? Estágio de mudança

Assist | Ajudar | Data para parar, TRN/bupropiona/vareniclina, gatilhos

Arrange | Agendar | Retorno precoce; reforço e prevenção de recaída

Intervencao breve — ideia

- Mesmo 3–5 minutos aumentam chance de cessação
- Combinar aconselhamento + farmacoterapia quando indicado
- Se não pronto para parar: abordagem 5R (Relevance, Risks, Rewards, Roadblocks, Repetition)

Fagerström (ideia)

Lembre - Fagerström (ideia)

Avalia dependência nicotínica (1º cigarro da manhã e quantidade/dia são itens-chave) e ajuda a escolher intensidade do suporte.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1