

Tipos de estudo · epidemiológicos


Cada desenho responde a uma pergunta e gera uma medida típica. Decore a direção do tempo (exposição!desfecho) e se o investigador aloca a exposição.

Atalho de prova

Dica - Atalho de prova

Doença rara !' pense caso-controle. Exposição rara !' coorte. Causalidade/intervenção !' ensaio clínico randomizado.

Timeline didática de hierarquia de evidência observacional até o experimental (RCT).



Definições curtas

- Transversal: exposição e desfecho no mesmo tempo — prevalência e associação cruzada
- Caso-controle: parte do desfecho (casos/controles) e olha exposição passada — OR
- Coorte: parte da exposição e segue desfecho — incidência e RR
- Ensaio: investigador atribui intervenção — eficácia, NNT, riscos

Medida típica

Estudo | Medida

Transversal | Prevalência / RP

Caso-controle | Odds ratio (OR)

Coorte | Risco relativo (RR), IR

Ensaio clínico | RR/RAR/NNT

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Caso-controle não calcula incidência diretamente e OR só aproxima RR se a doença for rara. Não diga 'RR' automaticamente em caso-controle.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Hierarquia da evidência + quando usar caso-controle vs coorte: raro/desfecho vs exposição !' incidência.

Pirâmide simplificada de prova: sobe qualidade/controla de viés (com nuances).


Hierarquia da evidencia

Do mais fraco ao mais forte (ideia)



Doença rara ou múltiplas exposições !' caso-controle. Exposição rara ou incidência !' coorte.

Caso-controle vs coorte



Desenhos × pergunta

Estudo | Parte de | Medida típica | Uso clássico

Transversal | População em um corte | Prevalência / OR transversal | Carga e associação cruzada

Caso-controle | Doentes × não doentes | OR | Doença rara; múltiplas exposições

Coorte | Expostos × não expostos | RR / incidência | Exposição rara; história natural

ECR | Randomização | RR / NNT | Eficácia de intervenção

Metanálise | Síntese de estudos | Estimativa combinada | Topo da hierarquia (se boa)

Caso-controle vs coorte — regra de ouro

- Caso-controle: eficiente para desfecho raro; cuidado com viés de memória/seleção
- Coorte: permite incidência e RR; mais cara/demorada; perda de seguimento
- OR "H RR só quando a doença é rara (premissa da doença rara)
- ECR responde causalidade de intervenção melhor que observacional

Hierarquia (ideia de prova)

Lembre - Hierarquia (ideia de prova)

Metanálise de ECR bem feitos > ECR > coorte > caso-controle > transversal > relato. Qualidade do estudo individual pode inverter a 'posição na pirâmide'.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1