

Anticoncepção · critérios de elegibilidade

Critérios de elegibilidade médica (MEC/OMS) classificam condições de 1 (sempre usar) a 4 (não usar). Em prova, foque contraindicações dos combinados e segurança do DIU/progestagênio.

Combinados (estrogênio + progestagênio)

Lembre - Combinados (estrogênio + progestagênio)

Cuidado clássico: TVP/TEP prévio, migrânea com aura, tabagismo >35 anos, HAS não controlada, ca de mama, hepatopatia grave, puerpério imediato (risco trombótico).

Memorize a lógica: 1–2 liberado com nuances; 3 riscos superam vantagens usuais; 4 contraindicação inaceitável.

Categorias MEC (OMS)

1 a 4 - ideia de elegibilidade

MEC 1-2 = pode | 3 = riscos > benefícios | 4 = não usar

Aplique ao método (ACO combinado, POP, DIU, implante), não a 'anticoncepção' genérica.

Métodos — pontos R1

- DIU de cobre: alta eficácia; pode sangrar mais; útil quando hormônio é problema
- DIU LNG: reduz fluxo; excelente no sangramento uterino selecionado
- Somente progestagênio: alternativa se estrogênio contraindicado (com nuances)
- Aconselhamento: eficácia típica vs perfeita, início imediato (quick start) e EC

Cenários clássicos de banca

Condição | Ideia de método

Migrânea com aura | Evitar combinado (categoria alta)

Tabagista >35 a | Evitar combinado

Lactação precoce | Preferir progestagênio/DIU conforme tempo

Nulípara | DIU não é contraindicação só por nuliparidade

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

DIU não está contraindicado apenas por ser nulípara ou adolescente. Infecção ativa de canal/útero e gravidez são as restrições que importam — não o 'mito da nuliparidade'.