

Isoimunização Rh · profilaxia com anti-D

Mulher Rh" não sensibilizada recebe imunoglobulina anti-D para prevenir aloimunização. Se já sensibilizada, o foco muda para monitorar anemia fetal.

Quando dar anti-D também

Lembre - Quando dar anti-D também

Abortamento, gestação ectópica, mola, procedimentos invasivos, sangramento, versão cefálica externa e trauma abdominal — além do esquema de 28 semanas e pós-parto.

Coombs indireto negativo = elegível à profilaxia; positivo = acompanhar aloimunização.

Gestante Rh negativo

Coombs -> profilaxia -> RN

Tipagem + Coombs

pai/RN se preciso

Anti-D 28 sem

se não sensibilizada

Pos-parto 72h

se RN Rh+

Aloimunização estabelecida

- Títulos/anticorpos e Doppler da ACM para anemia fetal
- Transfusão intrauterina em anemia grave
- Parto em centro com neonatologia; fototerapia/exsanguíneo no RN
- Anti-D não reverte sensibilização já instalada

Cenários de profilaxia

Situação | Anti-D?

Rh" , Coombs" , 28 sem | Sim

Pós-parto RN Rh+ | Sim ("d72 h)

Rh" , Coombs+ (sensibilizada) | Não (não previne)

Mãe Rh+ | Não

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Esquecer a dose pós-parto quando o RN é Rh+ é erro clássico. Se tipagem do RN atrasar, não perca a janela de 72 h — profila-se se indicado.