

Alergia à proteína do leite de vaca · APLV

APLV pode ser imediata (IgE) ou tardia (não IgE/GI). O tratamento é exclusão da proteína com fórmula adequada ou dieta materna orientada — não 'trocar marca de leite'.

Fórmulas

Lembre - Fórmulas

1ª linha na maioria: fórmula extensamente hidrolisada. Falha/anafilaxia grave/malabsorção: aminoácidos livres. Soja: uso restrito (idade, IgE).

Fenótipo guia urgência e teste: anafilaxia " protocolite do lactente.



Conduta

- Aleitamento: mãe exclui leite/derivados com suplementação de cálcio
- Evitar teste de exclusão eterno sem plano de reintrodução
- Provocação oral é padrão para confirmar e avaliar tolerância
- Diferenciar da intolerância à lactose (açúcar, não proteína)

Cenários

Quadro | Conduta-chave

Protocolite do lactente | Exclusão; bom prognóstico

Anafilaxia | Adrenalina IM + fórmula de aminoácidos

Enterocolite (FPIES) | Reanimação; evitar gatilho

Dúvida diagnóstica | Especialista + diário alimentar

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Fórmula parcialmente hidrolisada / 'HA' de supermercado não trata APLV estabelecida. Leite de outros mamíferos (cabra) costuma cruzar — não é alternativa segura.